



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>











IOHAN. CHRISTOPH. WVLF

MED. DOCT.

# FLORA

## BORVSSICA

DENVO EFFLORESCENS

AVCTOR.



---

Cum Figuris.

---

*REGIOMONTI ET LIPSIAE,*

SVMTIBVS HAER. HARTVNG. ET IO. DAN. ZEISII.

MDCCLXV.





*Lectori Beneuolo S. et O!*



Nemo nisi in Republica  
Litteraria hospes, infi-  
ciabitur, - uellissimum  
jucundissimumque Rei  
Herbariae studium ex-  
teras apud Nationes et in hisque quo-  
que regionibus Borussicis praeterito et  
praesente seculo jam viguisse; extant  
enim Italorum, Gallorum, Batauorum,  
Brittannorum, Germanorum et Sue-  
corum consummatissima, a Viris in  
Botanicis exercitatissimis, volumina ty-

pis exarata; existunt itidem nonnulli Nostratum Catalogi jam pridem et nuper publici juris facti, Plantas praecise Borufficas enumerantes; et ut illorum Auctores et Scriptores huc facientes B. L. consent, haud superfluum eos paucis allegare censui.

Agmen inter hos ducit, *Ioannes Wigandus*, S. S. Theol. Doctor, ultimusque Pomesaniensis Episcopus, Vir scriptis Theologicis et ceu Coryphaeus scriptorum rerum naturalium in Borussia notus, summusque Operum divinarum contemplator, uti ex praefatione Libelli ejus, lectu dignissimi, videre est. Hic veram de Succino Boruffico et Herbis in Borussia nascentibus reliquit historiam, quam post ejus obitum *Ioannes Rosinus*, Pastor Wickerstadiensis in Thuringia publice luci dedit. 1590. In 8vo. Ienae.

Semi-

Semifeculo abhinc effluxo, emisit *Nicolaus Oelbafius*, Medicus Regius et Physicus Gedanensis, Elenchum Plantarum, circa nobile Borufforum Dantiscum, sua sponte nascentium. Dantisci 1643. In 4to. In quo Plantarum 348. Nomina cum Synonymis quibusdam et locis natalibus recensuit.

Huic adjecit appendicem *Christianus Mentzelius*, Serenissimi Electoris Brandenburgici Consiliarius et Archiater cum Titulo: Centuria Plantarum circa nobile Gedanum sponte nascentium, adjecta appendicis loco ad Elenchum Plantarum *Nicolai Oelbafii*, collecta et edita a *Christiano Mentzelio*. 1650. In 4to. *Oelbafii* Elenchum Successor ejus *Laurentius Eichstadius* de novo recensuit et locupletavit anno 1656 numerumque Plantarum ad 384 auxit.



Eodem fere tempore, quo hi Viri clarissimi, in colligendis ac publicandis Gedanensis soli plantis, occupati fuere, excitatus quoque eorum Exemplo *Ioannes Loeselius*, Philos. et Med. Doct. Anatomes, Botanicesque Professor Regiomont. qui anno 1654 cum ipse valetudine minus prospera uteretur, per filium suum, ejusdem nominis, diuulgauit Plantas in Borussia sponte nascentes. Regiom. In 4to. Quarum numerus ad 761 ascendit.

Per id tempus vixit quoque *Michael Titius*, indefessus, celebrisque Botanicus, qui Serenissimi Electoris *Friderici Wilhelmi* jussu, Plantas, per Borussiam sponte nascentes, collegit. De quo Vir maxime Reuerendus, *Dan. Heinr. Arnold*, Doct. et Profess. Theol. Ord. Consiliar. Consist. Samb. ut et Concionator Aulicus in Additamentis  
ad

ad Historiam Academiae Regiomontanae p. 199 sequentia profert: Michael Titius, geboren bey Brandenburg 1614 den 28. Sept. Legte sich allhier auf die Theologie, auch auf die Botanic, und sammlete auf Churfürstl. Befehl alle in Preußen wachsende Kräuter, trug auch mit Erlaubniß der Universität die Kräuter - Wissenschaft allhier öffentlich vor, und war Depositor bey der Academie. Er starb 1658 den 17. Febr. Exinde conjicio probabiliter: *Titium* hunc verum Collectorem, Doct. *Loeselum* autem, ceu perpetuum valetudinarium, Editorem Plantarum Borussicarum fuisse. *Titius* etiam hicce Catalogum Plantarum Horti Electoralis Regiomontani composuit, et edidit Regiom. 1654 in forma 12ma incusum.

Hunc secutus *Jacobus Breynius*, Med. Dod. qui non solum Plantas ra-

riores exoticas, verum etiam Patrias quasdam detexit rarissimas, ut in Ephemeridibus Germanorum Medico-Physicis, hinc inde Prodromisque, praeprimis Centuria Rariorum et Exoticarum Gedani 1678 impressa, conspicitur.

Elapsis ferme decem lustris a prima editione, *Loeselius* prodiit rediuvus, sub Titulo: Flora Borussica, quarum Catalogum et nomina olim disseruit, curante *Ioanne Gottsched*, Phil. et Med. Doct. Phys. Profess. Ord. et Reg. Scient. Soc. Brandenb. Membr. Regiomonti 1703 in 4to. cum multis tabulis aeri incisis. Opus non solum Medicis, sed etiam ceterarum Facultatem cultoribus utile. Pro qua opera, ut omnes boni, ita speciatim Rei Herbariae Antistites et Tyrones Ipsi gratias persolvunt maximas.

Lucem

Lucem post haec vidit Flora Quasi-  
simodogenita Viri Plurimum Reueren-  
di, clari Docti Mag. *Georgii Andreae  
Helwingii*, Praepositi Angerburgensis  
bene meriti, nec non Membri Reg.  
Soc. Scient. Berol. spectabilis, appen-  
diciis loco Florae Borussicae inseruiens,  
aucta ducentis fere et quinquaginta  
Plantis, tum adhuc incognitis. Gedani  
1712 in 4to. Cum praefatione *Ioannis  
Philippi Breynii*, Medic. Doct. operi  
praefixa, in qua Scriptores rerum na-  
turalium Borussicarum una in serie ad-  
ducti, item nonnullae Plantae a *Loe-  
selio* peruerse appellatae ac pro nouis  
venditae, et in Flora Borussica *Gott-  
schediana* non correctae, modeste sunt  
emendatae.

Deinde Tractatus de Pulsatilla,  
a Viro de Re Botanica maxime merito,  
iam dicto M. *Georg. Andr. Helwingio*

a 5

eru-

erudite conscriptus, et Lipsiae in 4to editus.

Denique agmen Botanographorum Borussicorum claudit modo citati Auctoris Supplementum Florae Borussicae Gedani 1727 in 4to editum. Hic Borussicus celebris *Plinius* obiit aetatis 83. et Officii Sacerdotalis 57 ann. Angerburgi 1748. Dolendum insuper summopere, multa Ejus Scripta ex triplici regno Naturae, in scriniis adhuc latitantia, inter quae praecipue *Tournefortius* Borussicus ab Ipso compositus, quod Scriptum quidem in nonnullorum manus, est mutilum corruptumue.

Ego Studium Botanicum ab incunabilis inter praecipuas habui delicias: ex quo factum, ut in excursionibus meis, per non paucissimas Borussiae partes ob scientiam hanc nobilissimam practice addiscendam, susceptis, vari-

as

as obseruarim Plantas, quas aqud neminem Botanographorum Borussicorum allegatas reperire potui. Cum his nouiter detectis in coelo Botanico, ceu Stella nebulosa inter Stellas primae magnitudinis, sub Titulo: Specimen Inaugurale, Plantas XXIII in Borussia repertas et nondum descriptas comprehendens. Regiom. 1744 in 4to. sistere me, ausus sum.

His paucis de Botanicis progressibus Borussorum praelibatis, ad methodum, quam in hoc opere sum secutus, me conuerto. Illud in Ordines seu Sectiones, secundum methodum Gerardianam diuisi. Iste celebris Botanicus viam in Flora sua Gallo-Prouinciali monstrauit. Sectiones, methodo summe erudita, artificiosa, arguta clara, facile comprehensibili, imitabilique Magni Naturae Scrutatoris, Illustris Equi-



Equitis Aurati de Stella Polari, de Linne, Basiliatri Sueciae etc. etc. in Genera et Species subdivisae sunt. Unicuique Generi Plantarum Characterem vel Descriptionem Plantae, secundum Definitionem Summi *Linnaei* in opero-fissimo Opere, Genera Plantarum, dicto, et acutissimi *Gouan*, in horto suo Regio Monspeliensi, descriptam citavi atque apposui. Speciebus Plantarum Denominationes *Linnaei* praepositae, dein nonnulli neoterici et veteres Herbarii, imprimis *C. Baubini Pinax* Theatri Botanici, fere ubique sunt allegati. De *Pinace* hac Illustr. Eqv. Aur. de Linne in sua Bibliotheca Botanica pag. 108. inquit:

Opus est 40 laboriosorum annorum;

Opus est hactenus sine pari;

Opus est quo nullus carere potest.

Praeprimis autem pagina et numerus

merus Scriptorum nostrorum Botanicorum indicta, ubi singulae his in terris crescentes Plantae, et ex parte olim jam detectae, inueniuntur. In disponendis Fungis Methodum Fungorum Famigeratissimi Botanici, et Excellent. Dn. Doct. Med. Berol. *Gleditschii*, strictim secutus sum. Hicce indefessus Scrutator Naturae in ordinandis, classificandis et describendis Fungis palmam omnibus praeripit, hinc merito verus, unicusque Classifier Fungorum nominandus atque venerandus est,

Nunc tenuis hic chartaceus parvus, multis sudoribus et difficilibus laboribus natus, exeat, per mundum Litteratorum vaget et Beneuolos Censores sibi conciliet, inueniatque, quod ex intimo exopto cordis! Si hoc, propediem Ichthyographia Borussica, Ichnographia jam exarata, sequetur.

Inui-

Inuidos Cenfores et maleuolos Zoi-  
los non curo, memor effati aurei Im-  
mortalis Botanici, Equit. Aur. de Stel-  
la Polari de Linne :

Pascitur in viuis liuor, post fata  
quiescit,

Tum fuus ex merito quemque  
tuetur honos.

Ceteroquin Lector humanissime  
vale ! meisque conatibus ulterioribus  
faue !

Postremo, ut intelligas Compen-  
dia citandi, explicata haec in fronte  
operis praefigo, en ! haecce sunt prae-  
cipua.

*Regiomont. Bor.*

*die 6. Martii, 1765.*



**A**grie. de Nat. Fossil. Ge-  
org. Agricolae de Natura  
Fossilium. Basil. 1546.  
In Fol.

**C. B. P. Caspari Bauhini Pi-  
nax Theatri Botanici.** Bas.  
1623. In Quarto.

**Prodr. Ejusd. Prodrromus  
Theatri Botanici.** Franc.  
ad Moen. 1620. cum fig.  
In Quarto.

**In Matth. Caspar. Bauhini  
Commentar.** in Matthio-  
lum. 1598. c. Fig. in Fol.

**Breyn. Cent. I. Iac. Breynii  
Exoticar. ac minus Cogni-  
tarum Plantarum Centu-  
ria.** Gedan. 1678. c. Fig.  
In Folio.

**Brunf. Ott. Brunfelsii Her-  
barium.** Argent. 1532.  
cum Fig. in Folio.

**Boerh. Ind. alt. Plant. Herm.  
Boerhaue Index alter Plan-  
tarum Horti Lugduno-Bat.  
in Quart. 1720. cum Fig.**

**Ejus Historia Plantarum.**  
Romae. 1728. In Oct.

**Buxb. Buxbaum Plantarum  
minus cognitarum. Cen-  
turiae V. Petropoli. 1728  
et seqq. c. Fig. In Quart.**

**Cam. Ep. Ioach. Camerarii  
de Plantis, Epitome P. A.  
Matthioli. Fran. ad Moen.  
1586. cum Fig. In Quart.**

**Hort. Ej. Hortus Medicus  
et Philosophicus.** Fran. ad  
Moen. 1588. cum Figur.  
In Quarto.

**In Matrh. Ej. Comment.  
in P. A. Matthioli Kräuter-  
Buch. Trf. am Mann. c.  
Fig. In Fol.**

**Caesalp. de Pl. Andr. Caesal-  
pini de Plantis, Libri XVI.  
Flor. 1583. in Quart.**

**Clus. H. Car. Clusii Historia  
rariorum Plantarum. Ant.  
1601. cum Fig. in Fol.**

**Cord. H. Valerii. Cordi Hi-  
storia Stirpium. In Folio.  
1561.**

**Dillen. Cat. Giesf. Ioh. Iac.  
Dillenii Catalogus Planta-  
rum circa Gieslam nascenti-  
um. Fr. ad. Moen. 1719.  
cum Fig. in Octav.**

**Dod. Pempt. Remberti Do-  
donaei Stirpium Historia.  
Antwerp. 1616. c. Figur.  
In Folio.**

**Ernsting. Arth. Contr. Eras-  
ting Historische und Physie-  
calische Beschreibung der  
Geschlechter der Pflanzen.  
Iemgo. 1762. cum Figu-  
ris. In Quarto.**

**Fuchf. H. Leonh. Fuchsi Hi-  
storia stirpium. Bas. 1542.  
cum Figur. In Fol.**

**Ger. Fl. Gallo-Pr. Ludouici  
Gerar-**



- Gerardi Flora Gallo-Provincialis. Par. 1761. cum Figuris. In Octauo.
- Gesn. Hort. Conradi Gesneri Horti Germaniae. Arg. 1561. cum Fig. In Fol.
- Gled. Meth. Fung. Ioh. Gottlieb Gleditschii Methodus Fungorum. Berol. 1755. cum Fig. In Octauo.
- Gmel. Sib. Ioh. Ge. Gmelin Florae Sibiricae, Pars I et II. Petropol. 1747. cum Figuris. In Quarto.
- Göüan H. R. M. Ant. Göüan Hortus Regius Monspeliensis. Lugdani 1762. cum Figuris. In Octauo.
- Gronov. Virg. Ioh. Friedr. Gronovii Flora Virginica. Leid. 1762. In Octauo.
- Hall. Op. Bot. Alberti Halleri opera Botanica. Goettingen 1749. cum Figur. In Octauo.
- Hall. Enum. Pl. H. G. Alb. Halleri Enumeratio Plantarum Horti et Agri Goettingensis. Götting. 1753. In Octauo.
- Helw. Fl. Camp. Ge. Andr. Helwingii Flora Campana seu de Pictsatilla. Lips. c. Fig. In Quart.
- Fl. Quasim. Ejusd. Flora Quasimodogenita. Gedani 1712. c. Fig. in Quart.
- Suppl. Fl. Bor. Ejusd. Supplementum Florae Borussicae. Ged. 1727. c. Fig. in Quarto.
- Tourn. Bor. Georg. Andr. Helwingi Tournefortius Borussicus. MS.
- Harnisch. Ioh. Andr. Harnisch de Pimpinella nigra. Lips. 1757. In Quart.
- Herm. Hort. Lugd. B. Pauli Hermanni Hortus Lugduno-Batauus. In Octauo.
- Par. Bat. Ejusdem Paradisus Batauus. Ibid. 1698. cum Figur.
- Kram. El. Veg. Austr. Wilh. Henr. Kramerii Elenchus Vegetabilium et Animalium. Vien. 1756. c. Fig. in Octauo.
- Kyp. in Trag. David Kyperi historia Stirpium. Argent. 1552. c. Figur. in Quart.
- Leyf. Fl. Hall. Frid. Wilh. a Leyser Flora Halensis. Hal. 1761. in Octauo.
- Lind. Alsat. Georg. Erh. von Linderen Hortus Alsaticus etc. Argent. 1747. c. Fig. In Octauo.
- Linn. S. N. Caroli Linnaei Systema Naturae per Regna tria. Halac. 1760. In Octauo.

Linnaei



Linn. Gen. Pl. Linnaei Genera Plantarum. Halae. 1757. In Octauo.

Spec. Pl. Ej. Species Plantarum. Holm. 1753. In Octauo.

Ejusd. Philosophia Botanica. Vienn. 1755. c. Figur. In Octauo.

Ejus. Fundamenta Botanica. Stockholm. 1740. In Octauo.

Ej. Botanica critica. Lugd. Bat. 1737. In Octauo.

Ejus. Amoenitates Academiae. Lugd. Bat. et Holm. Partes VI. In Oct. c. Fig. Fl. Suec. Caroli Linnaei Flora Suecia. Holm. In 8. cum Figuris.

Ej. Elora Zeylanica. ibid. in Octauo. cum Figuris.

Lob. Ic. Matth. de Lobel Icones Advers. Ej. Historia Stirpium cum Ejus Aduersariis. Antwerp. 1576. c. Fig. in Fol.

Loef. Fl. Bor. Ioh. Loefelii Plantae in Borussia sponte nascentes. Reg. 1654. In Quarto.

Ejusd. Flora Borussica, curante Ioh. Gottsched. Regiom. 1703. cum Figur. In Quarto.

Lonic. deutsch. Adam Lo-

niceri Kräuter-Buch. Frf. am Mäyn. 1612. In Fol.

Malp. Op. Marcel. Malpighii Opera. Lond. 1678. cum Figuris. In Fol.

Mapp. H. Pl. Alf. Marci Mappii Historia Plantarum Alsaticarum. Argent. 1742. cum Fig. In Quart.

Matth. deutsch. Petri Andr. Matthioli Kräuter-Buch, durch D. Hantsch verdeutschet. Prag. 1563. cum magnis Figur. In Fol.

Menz. Pug. Rar. Christian. Menzelii Index Plantarum uniuersales, cum Pugillorariorum Plantarum. Ber. 1682. cum Fig. In Fol.

Oelhaf El. Pl. Nicol. Oelhafii Elenchus Plantarum circa Dantiscum nascentium. Dant. 1643. In 4to.

Pancov. Herb. Thomae Pancouii Kräuterbuch. Eöls an der Spree. 1673. cum Figuris. In 4to.

Ruell. Ioh. Ruellii de Natura Stirpium. Basel 1537. In Fol.

Rupp. Fl. Ien. Henr. Bernh. Rupprii Flora Ienensis. Frf. 1726. cum Fig. in Oct.

Schaeffer von den Schwämmen. Regensp. 1763. In 4to. c. Fig. illum.

Scheuch-





Scheuchz. Hist. Gram. Ioh.  
Scheuchzeri Agrostogra-  
phia. Figur. 1719. cum  
Figuris. In 4to.

Schwenckf. Cat. Foss. Siles.  
Casp. Schwenckfeldii Ca-  
talogus Fossilium Silesiae.  
Ligniz. 1601. In 4to.

Seb. in Trag. Melch. Sebi-  
tzii Commentarius in Tra-  
gi Kräuter-Buch. Straß-  
burg 1630. cum Figuris.  
In Folio.

Stoerck. Anton. Störck Ab-  
handlung vom sichern Ge-  
brauch des Stechapfels,  
Wilsen-Kraut, etc. Zürich  
1763. cum Fig. In Oct.

Thal. Sylv. Her. Ioh. Thalii  
Sylva Hercinia. Francof.  
1588. cum Fig. In 4to.

Tab. lac. Theodori Tabernae  
montani Kräuter-Buch.  
1625. cum Fig. In Folio.

Tourn. Inst. Iosephi Pitton

Tournefortii Institutiones  
Rei Herbariae. Lugd. Bat.  
1719. cum Figur. In 4to.  
Vaill. Bot. Par. Sebast. Vail-  
lant Botanicon Parisense.  
à Leide. 1727. c. Figur.  
In Folio maj.

Wigand. de Herb. Ioh. Wi-  
gandi Catalogus Herba-  
rum in Prussia. Ien. 1590.  
In Octavo.

Wulff. Sp. Inaug. Ioh. Chri-  
stoph. Wulff Specimen In-  
augurale, de XXIII Plantis  
in Borussia sponte nascent.  
Regiom. 1744. In Quart.

Zinn. Cat. H. G. Ioh. Gottfr.  
Zinn Catalogus Plantarum  
Horti Academiae Goetting-  
ensis. Goettingen 1749.  
cum Figuris. In Octavo.

Zwing. Kr. B. Theodori  
Zwinger Kräuter-Buch.  
Basel. 1696. cum Figu-  
ris. In Folio.



**DISTRI-**



# DISTRIBVTIO GENERVM.

## I. Fungi.

- 1 Mucor.
- 2 Byffus.
- 3 Spongia.
- 4 Lycoperdon.
- 5 Peziza.
- 6 Clauaria.
- 7 Clathrus.
- 8 Eluela.
- 9 Phallus.
- 10 Hydnum.
- 11 Boletus.
- 12 Agaricus.

p. 1

- p. 1
- p. 3
- p. 4
- p. 5
- p. 6
- p. 8
- p. 9
- p. 10
- p. 10
- p. 11
- p. 12
- p. 14

## II. Algæ.

- 1 Conferua.
- 2 Tremella.
- 3 Fucus.
- 4 Lichen.
- 5 Riccia.
- 6 Marchantia.
- 7 Jungermannia.
- 8 Chara.
- 9 Equisetum.
- 10 Viscum.

p. 35

- p. 35
- p. 35
- p. 36
- p. 37
- p. 42
- p. 42
- p. 43
- p. 45
- p. 45
- p. 47

## III. Musci.

- 1 Hypnum.
- 2 Bryum.
- 3 Mnium.
- 4 Polytrichum.
- 5 Fontinalis.
- 6 Sphagnum.
- 7 Lycopodium.

p. 48

- p. 48
- p. 52
- p. 54
- p. 55
- p. 55
- p. 56
- p. 56

## IV. Filices.

- 1 Ophioglossum.
- 2 Osmunda.

p. 57

- p. 57
- p. 58

- 3 Pteris.
- 4 Polypodium.

p. 58  
p. 59

## V. Fluviatiles.

- 1 Hippuris.
- 2 Ceratophyllum.
- 3 Myriophyllum.
- 4 Sagittaria.
- 5 Hottonia.

p. 60  
p. 60  
p. 61  
p. 61  
p. 62

## VI. Gramina.

- 1 Anthoxanthum.
- 2 Nardus.
- 3 Alopecurus.
- 4 Phalaris.
- 5 Phleum.
- 6 Agrostis.
- 7 Milium.
- 8 Panicum.
- 9 Aira.
- 10 Melica.
- 11 Poa.
- 12 Briza.
- 13 Dactylis.
- 14 Festuca.
- 15 Bromus.
- 16 Avena.
- 17 Lolium.
- 18 Elymus.
- 19 Triticum.
- 20 Secale.
- 21 Hordeum.
- 22 Cynosurus.
- 23 Arundo.
- 24 Holcus.
- 25 Carex.
- 26 Eriophorum.
- 27 Scirpus.
- 28 Cyperus.

p. 62  
p. 62  
p. 63  
p. 63  
p. 64  
p. 64  
p. 65  
p. 66  
p. 66  
p. 67  
p. 68  
p. 68  
p. 69  
p. 70  
p. 70  
p. 71  
p. 72  
p. 73  
p. 73  
p. 73  
p. 74  
p. 75  
p. 75  
p. 76  
p. 76  
p. 77  
p. 80  
p. 81  
p. 81  
29

# DISTRIBVTIO GENERVM.

<p>29 Typha. p. 82</p> <p>30 Sparganium. p. 82</p> <p><b>VII. Piperitae.</b> p. 83</p> <p>1 Lemma. p. 83</p> <p>2 Callitriche. p. 83</p> <p>3 Potamogeton. p. 84</p> <p>4 Triglochin. p. 85</p> <p>5 Scheuchzeria. p. 86</p> <p>6 Calla. p. 86</p> <p>7 Zoster. p. 86</p> <p><b>VIII. Orchideae.</b> p. 87</p> <p>1 Orchis. p. 87</p> <p>2 Satyrium. p. 89</p> <p>3 Ophrys. p. 89</p> <p>4 Serapias. p. 90</p> <p>5 Cypripedium. p. 92</p> <p>6 Tridentalis. p. 92</p> <p><b>IX. Convallariae.</b> p. 92</p> <p>1 Asarum. p. 92</p> <p>2 Asparagus. p. 93</p> <p>3 Convallaria. p. 93</p> <p>4 Tamus. p. 94</p> <p><b>X. Tripetaloidae.</b> p. 95</p> <p>1 Alisma. p. 95</p> <p>2 Butomus. p. 95</p> <p><b>XI. Iuncoidae.</b> p. 95</p> <p>1 Juncus. p. 95</p> <p>2 Paris. p. 97</p> <p><b>XII. Irides.</b> p. 97</p> <p>1 Iris. p. 97</p> <p>2 Gladiolus. p. 98</p> <p>3 Acorus. p. 98</p> <p>4 Lilium. p. 99</p> <p><b>XIII. Coronariae.</b> p. 99</p> <p>1 Ornithogalum. p. 99</p>	<p>2 Allium. p. 100</p> <p>3 Anthericum. p. 100</p> <p><b>XIV. Parasiticae.</b> p. 101</p> <p>1 Cuscuta. p. 101</p> <p><b>XV. Cichoraceae.</b> p. 101</p> <p>1 Tragopogon. p. 101</p> <p>2 Scorzonera. p. 102</p> <p>3 Sonchus. p. 102</p> <p>4 Lapsana. p. 103</p> <p>5 Prenanthes. p. 103</p> <p>6 Leontodon. p. 103</p> <p>7 Hieracium. p. 104</p> <p>8 Crepis. p. 106</p> <p>9 Hypochaeris. p. 107</p> <p>10 Cichorium. p. 108</p> <p><b>XVI. Cinarocephalae</b> p. 108</p> <p>1 Arctium. p. 108</p> <p>2 Serratula. p. 108</p> <p>3 Onopordum. p. 109</p> <p>4 Carlina. p. 109</p> <p>5 Helianthus. p. 110</p> <p>6 Centaurea. p. 110</p> <p><b>XVII. Corymbiferae.</b> p. 113</p> <p>1 Achillaea. p. 113</p> <p>2 Sium. p. 113</p> <p>3 Tanacetum. p. 114</p> <p>4 Eupatorium. p. 114</p> <p>5 Tussilago. p. 115</p> <p>6 Senecio. p. 115</p> <p>7 Inula. p. 117</p> <p>8 Solidago. p. 118</p> <p>9 Erigeron. p. 118</p> <p>10 Bellis. p. 118</p> <p>11 Chrysanthemum. p. 119</p> <p>12 Matricaria. p. 119</p> <p>13 Anthemis. p. 120</p> <p>14 Bidens. p. 121</p> <p style="text-align: right;">15</p>
---	---

# DISTRIBVTIO GENERVM.

15 Gnaphalium.	p. 121
16 Artemisia.	p. 124
17 Xanthium.	p. 125
18 Othonna.	p. 125

## XVIII. Dipsaceae. p. 125

1 Valeriana.	p. 125
2 Scabiosa.	p. 126
3 Dipsacus.	p. 128
4 Viburnum.	p. 129
5 Cornus.	p. 129
6 Sambucus.	p. 129
7 Trapa.	p. 130
8 Lonicera.	p. 130
9 Sanguisorba.	p. 130

## XIX. Rubiaceae. p. 131

1 Asperula.	p. 131
2 Gallium.	p. 131
3 Rubia.	p. 132
4 Crucianella.	p. 132

## XX. Umbelliferae. p. 133

1 Eryngium.	p. 133
2 Panicula.	p. 133
3 Daucus.	p. 133
4 Selinum.	p. 134
5 Conium.	p. 134
6 Athamanta.	p. 134
7 Laserpitium.	p. 134
8 Heracleum.	p. 135
9 Angelica.	p. 135
10 Aethusa.	p. 136
11 Phellandrium.	p. 136
12 Coriandrum.	p. 137
13 Scandix.	p. 137
14 Chaerophyllum.	p. 137
15 Imperatoria.	p. 138
16 Pastinaca.	p. 139
17 Anethum.	p. 139
18 Carum.	p. 139
19 Pimpinella.	p. 140
20 Aegopodium.	p. 141

## XXI. Labiatae. p. 141

1 Lycopus.	p. 141
2 Salvia.	p. 141
3 Prunella.	p. 142
4 Scutellaria.	p. 142
5 Thymus.	p. 143
6 Dracocephalum.	p. 144
7 Origanum.	p. 144
8 Teucrium.	p. 145
9 Clinopodium.	p. 145
10 Leonurus.	p. 145
11 Marrubium.	p. 146
12 Ballota.	p. 146
13 Stachys.	p. 146
14 Lamium.	p. 146
15 Galeopsis.	p. 146
16 Glecoma.	p. 148
17 Mentha.	p. 149
18 Tetrahit.	p. 149
19 Betonica.	p. 150
20 Satureja.	p. 150
21 Nepeta.	p. 151
22 Hyssopus.	p. 151
23 Ajuga.	p. 151
24 Teucrium.	p. 152

## XXII. Personatae. p. 153

1 Verbena.	p. 153
2 Polygala.	p. 153
3 Pedicularis.	p. 154
4 Rhinanthus.	p. 154
5 Melampyrum.	p. 155
6 Euphrasia.	p. 156
7 Digitalis.	p. 156
8 Linnaea.	p. 156
9 Orobanche.	p. 157
10 Lathraea.	p. 157
11 Scrophulariae.	p. 157
12 Anthirrhinum.	p. 158
13 Utricularia.	p. 159
14 Fumaria.	p. 159
15 Impatiens.	p. 160

## XXIII.

# DISTRIBVTIO GENERVM.

## XXIII. Asperifoliae.

	p. 160
1 Myosotis.	p. 160
2 Lithospermum.	p. 162
3 Anchusa.	p. 162
4 Cynoglossum.	p. 163
5 Pulmonaria.	p. 163
6 Symphytum.	p. 164
7 Asperugo.	p. 165
8 Echium.	p. 165

## XXIV. Rotaceae. p. 166

1 Primula.	p. 166
2 Menyanthes.	p. 166
3 Lyfimachia.	p. 166
4 Anagallis.	p. 167
5 Limosella.	p. 167
6 Swertia.	p. 168
7 Gentiana.	p. 168

## XXV. Solanaceae. p. 169

1 Verbascum.	p. 169
2 Drosera.	p. 170
3 Datura.	p. 171
4 Hyoscyamus.	p. 171
5 Solanum.	p. 171

## XXVI. Volubiles. p. 172

1 Convolvulus.	p. 172
2 Anthyllis.	p. 173

## XXVII. Biloculares.

	p. 173
1 Fraxinus.	p. 173
2 Ligustrum.	p. 173
3 Verronica.	p. 174
3 Glaux.	p. 176

## XXVIII. Contortae.

	p. 177
1 Peruinca.	p. 177
2 Afclepias.	p. 177

## XXIX. Oleraceae. p. 177

1 Chenopodium.	p. 177
2 Salfosa.	p. 179
3 Plantago.	p. 180
4 Hernicaria.	p. 181
5 Amaranthus.	p. 181
6 Statice.	p. 181

## XXX. Tetrapetalae.

	p. 182
1 Myagrum.	p. 182
2 Draba.	p. 182
3 Thlaspi.	p. 182
4 Lunaria.	p. 183
5 Cochlearia.	p. 183
6 Alyssum.	p. 183
7 Lepidium.	p. 184
8 Dentaria.	p. 184
9 Cardamine.	p. 184
10 Sisymbrium.	p. 185
11 Erysimum.	p. 186
12 Cheiranthus.	p. 187
13 Hesperis.	p. 187
14 Arabis.	p. 188
15 Turritis.	p. 188
16 Brassica.	p. 188
17 Sinapis.	p. 189
18 Raphanus.	p. 189

## XXXI. Rheades. p. 189

1 Chelidonium.	p. 189
2 Papauer.	p. 190
3 Actaea.	p. 190
4 Nymphaea.	p. 190

## XXXII. Senticosae. p. 191

1 Berberis.	p. 191
-------------	--------

## XXXIII. Melanideae.

	p. 191
1 Viola.	p. 191
2 Reseda.	p. 192

## XXXIV.

# DISTRIBVTIO GENERVM.

## XXXIV. Ranunculaceae.

p. 193

- |    |             |        |
|----|-------------|--------|
| 1  | Thalictrum. | p. 193 |
| 2  | Anemone.    | p. 194 |
| 3  | Adoxa.      | p. 197 |
| 4  | Caltha.     | p. 197 |
| 5  | Myofurus.   | p. 198 |
| 6  | Ranunculus. | p. 198 |
| 7  | Trollius.   | p. 201 |
| 8  | Nigella.    | p. 201 |
| 9  | Isopyrum.   | p. 202 |
| 10 | Delphinium. | p. 202 |
| 11 | Aconitum.   | p. 203 |
| 12 | Aquilegia.  | p. 203 |
| 13 | Stratioros. | p. 203 |

## XXXV. Helioscopiae.

p. 204

- |   |            |        |
|---|------------|--------|
| 1 | Cistus.    | p. 204 |
| 2 | Hypericum. | p. 204 |

## XXXVI. Caryophyllae.

p. 205

- |    |              |        |
|----|--------------|--------|
| 1  | Arenaria.    | p. 205 |
| 2  | Cerastium.   | p. 206 |
| 3  | Centunculus. | p. 207 |
| 4  | Stellaria.   | p. 207 |
| 5  | Gypsophylla. | p. 207 |
| 6  | Dianthus.    | p. 208 |
| 7  | Saponaria.   | p. 209 |
| 8  | Cucubalus.   | p. 210 |
| 9  | Silene.      | p. 210 |
| 10 | Agrostemma.  | p. 210 |
| 11 | Lychnis.     | p. 211 |
| 12 | Spergula.    | p. 212 |
| 13 | Linum.       | p. 213 |

3 Geum. p. 215

4 Ribes. p. 216

5 Sedum. p. 217

6 Sempervivum. p. 217

7 Parnassia. p. 217

## XXXVIII. Gruinales.

p. 218

1 Oxalis. p. 218

2 Geranium. p. 218

## XXXIX. Tiliaceae.

p. 220

1 Tilia. p. 220

## XL. Bicornes.

p. 221

1 Vaccinium. p. 221

2 Erica. p. 222

3 Pyrola. p. 222

4 Hedera. p. 223

5 Ledum. p. 223

6 Acer. p. 223

## XLI. Chameleae.

p. 224

1 Daphne. p. 224

## XLII. Vaginales.

p. 224

1 Rumex. p. 224

2 Polygonum. p. 225

## XLIII. Calyciflorae.

p. 227

1 Hippophae. p. 227

## XLIV. Campanaceae.

p. 227

1 Campanula. p. 227

2 Phyteuma. p. 230

3 Iasion. p. 230

4 Samolus. p. 231

5 Polemonium. p. 231

XLV.

## XXXVII Succulentae.

p. 214

- |   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| 1 | Saxifraga.      | p. 214 |
| 2 | Chrysosplenium. | p. 214 |



# DISTRIBVTIO GENERVM.

## XLV. Corniculatae.

p. 232

- |              |        |
|--------------|--------|
| 1 Circaea.   | p. 232 |
| 2 Epilobium. | p. 232 |

## XLVI. Glaucophyllae.

p. 234

- |            |        |
|------------|--------|
| 1 Peplis.  | p. 234 |
| 2 Lythrum. | p. 234 |

## XLVII. Sepiariae. p. 234

- |             |        |
|-------------|--------|
| 1 Evonymus. | p. 234 |
| 2 Rhamnus.  | p. 235 |

## XLVIII. Rosaceae. p. 235

- |                |        |
|----------------|--------|
| 1 Alchimilla.  | p. 235 |
| 2 Agrimonia.   | p. 236 |
| 3 Spiraea.     | p. 236 |
| 4 Rosa.        | p. 236 |
| 5 Rubus.       | p. 237 |
| 6 Potentilla.  | p. 238 |
| 7 Fragaria.    | p. 240 |
| 8 Tormentilla. | p. 240 |
| 9 Comarum.     | p. 241 |

## XLIX. Pomiferae.

p. 241

- |              |        |
|--------------|--------|
| 1 Prunus.    | p. 241 |
| 2 Crataejus. | p. 241 |
| 3 Sorbus.    | p. 242 |
| 4 Pyrus.     | p. 242 |

## L. Columniferae. p. 242

- |            |        |
|------------|--------|
| 1 Malua.   | p. 242 |
| 2 Alcea.   | p. 243 |
| 3 Althaea. | p. 243 |

## LI. Papilionaceae. p. 244

- |               |        |
|---------------|--------|
| 1 Genista.    | p. 244 |
| 2 Ononis.     | p. 244 |
| 3 Anthyllis.  | p. 245 |
| 4 Astragalus. | p. 245 |
| 5 Orobus.     | p. 246 |
| 6 Lathyrus.   | p. 246 |
| 7 Coronilla.  | p. 247 |
| 8 Vicia.      | p. 247 |
| 9 Ervum.      | p. 248 |
| 10 Trifolium. | p. 248 |
| 11 Medicago   | p. 250 |

## LII. Lupulinae. p. 251

- |             |        |
|-------------|--------|
| 1 Ulmus.    | p. 251 |
| 2 Urtica.   | p. 252 |
| 3 Cannabis. | p. 252 |
| 4 Humulus.  | p. 252 |

## LIII. Amentaceae. p. 253

- |             |        |
|-------------|--------|
| 1 Salix.    | p. 253 |
| 2 Populus.  | p. 255 |
| 3 Quercus.  | p. 256 |
| 4 Fagus.    | p. 256 |
| 5 Carpinus. | p. 256 |
| 6 Corylus.  | p. 257 |
| 7 Betula.   | p. 257 |

## LIV. Tricoccae. p. 258

- |                |        |
|----------------|--------|
| 1 Euphorbia.   | p. 258 |
| 2 Mercurialis. | p. 258 |

## LV. Coniferae. p. 259

- |              |        |
|--------------|--------|
| 1 Taxus.     | p. 259 |
| 2 Juniperus. | p. 259 |
| 3 Pinus.     | p. 259 |

Addenda. p. 260 et seqq.



# FUNGI.



## F U N G I.

**MUCOR.** Unächte Staub-Schwämme. Schäffer.

*Linn. Gen. Pl. 976.*

**1.**  
**M**ucor cespitosus, capsula globosa. Linn. Sp. Pl. p. 1185.  
Mucor cespitosus, capitulo sphaerico, petiolo setaceo, longissimo. Gled. Meth. Fung. p. 161.

Mucedo capitulo diaphano, deinde viridi et postremo nigerrimo. Malpigh. de Plant. in aliis vegetant. Tab. 28. Fig. 108.

Ein grauer Nasenartiger Schimmel, auf einem sehr hohen Haarförmigen Stielchen.

In pane, farina, aliisque putrescentibus esculentis.

**2.**  
Mucor albus minimus. Gled. Met. Fung. p. 162.

**3.**  
Mucor minimus, cespitosus, candidus. Gl. Met. F. p. 162.  
Saepius hi bini occurrunt in fimetis, tectis stramineis, stabulis boum, eqvorumve.

**4.**  
Mucor stipitatus, capitulo subrotundo, aggregato. Linn. Spec. Pl. p. 1186.

Byssus petiolata, fructificationem lineolis in capitulum radiatum dense congestis. Gl. Met. Fung. p. 24.

Ein weißgrauer Haar-Schimmel, dessen Früchte in ein Sternförmiges Knopschen dicht zusammen gesetzt sind.

In ulni et carpini corticibus, variisque radicibus et corticibus.

A

Mucor

5.

*Mucor stipite ramoso, spicis ternatis.* Linn. Sp. Pl. p. 1186.  
*Byssus petiolata cespitosa, fructificationibus in spicam decompositam digestis.* Gled. M. F. p. 24.

Ein weisser rasenartig wachsender Haar:Schimmel, dessen Früchte in einer doppelt zusammengesetzten Spitze hervorkommen.

Oritur in foliis semiputridis, hortis, etc.

6.

*Mucor stipite ramoso capitulis oblongis, paniculatis.* Gerardi Fl. Gallo-Prov. p. 2.

*Byssus petiolata, grysea, fructificationibus in petiolo ramississimo spicatum digestis.* Gl. M. F. p. 24.

Ein grauer Haar:Schimmel, dessen Früchte auf einem sehr ästigen Stielchen spizenweise hervorkommen.

Fungus est fugacissimus colore lacteo et aliquando viridi.  
 Ad arborum et fruticum radices, in ambulacris umbrosis.

7.

*Mucor stipitatus, capsula clavata.* Ger. Fl. Gallo-Pr. p. 2.

*Mucor petiolatus, capitulo clavato, cortice in pulverem fatiscente.* Gled. M. F. p. 159.

Ein ganz kleiner schimmelartiger und keilsförmiger weisser Schwamm auf einem Stielchen, dessen Rinde in ein sehr zartes Meel ganz zerstäubet.

Sero autumnno in ulmi foliis, et salicibus, prunisque emortuis.

8.

*Mucor subglobosus et sessilis, fructificationes in liquamine continens.* Gl. M. Fung. p. 161.

Ein runder grauer, schleimichter Baum:Schwamm, dessen Saamen in einer gallerichten Feuchtigkeit eingeschlossen ist.

In truncis et lignis emortuis, autumnno pluuioso, utet in cariosis columnis hybernaculorum septentrionem versus crescit.

Byssus.

## BYSSUS.

*Linn. Gen. Pl. Nr. 975.*

9.

*Byssus capillacea*, pulverulenta, fructificationibus sparsis, filamentis simplicibus et ramosa. Gl. M. F. p. 18.

Ein goldgelber staubigter Haar: Schwamm, mit theils einfachen, theils ästigen Fasern.

In muris subhumidis septentrionem versus. Linn. Sp. Pl. p. 1168.

*Byssus petraea crocea*. Rupp. Fl. Jen. p. 300.

10.

*Byssus capillacea viridis* fructificationibus sparsis, filamentis brevibus, tenuissimis, simplicibus et ramosis. Gled. Meth. Fung. p. 19.

*Byssus filamentosa*. Linn. Sp. Pl. p. 1168.

Ein sehr rauher grüner Haar: Schwamm, mit kurzen und überaus zarten, theils einfachen, theils ästigen Fasern.

In pascuis argillofis et arborum corticibus.

Arborum caudex hac bysso obductus, corticem viridem reddit.

11.

*Byssus capillacea miniata* fructificationibus sparsis, filamentis integris, tenuissimis et brevissimis. Gl. M. F. p. 23.

Ein staubigter, purpurfarbner Staub: Schwamm, mit den aller kürzesten und einfachen Fasern.

Lignis putridis, loco umbroso, autumnino increscit.

12.

*Byssus capillacea*, fructificationibus sparsis, filamentis integris et productionibus, basi latissima. Gl. M. F. p. 21.

Ein weißer Haar: Schwamm, mit etwas längern, zarteren und einfachen Fasern, auf einem überaus breiten Grunde.

Amat loca subterranea, maxime ex parte clausa, uti sunt canales, cellae vino cerevisiaeque dicatae.

13.

*Byssus capillacea* fructificationibus sparsis, filamentis brevibus,

A 2

bus,

bus, integris et tenuissimis, basi crassa reptante. Gled. Meth. Fung. p. 22.

Ein Aschgrauer oder blauer Haar: Schwamm, mit kurzen zarten und einfachen Fasern, auf einem fleischichten umb sich kriechenden Grunde.

Verno tempore crescit in dejectis et putrefactis coryli et aliorum lignis emortuis, in umbrosis locis.

14.

Byssus capillacea, puluerulenta, violam redolens, fructificationibus sparsis, filamentis aureis et brevibus, partim simplicibus, partim ramosis. Gl. M. F. p. 18.

Ein goldgelber, staubichter Haar: Schwamm, mit einem Merz Viole Geruch, und kurzen, theils einfachen, theils ästigen Fasern.

In locis glareosis, duris, circa Officinas carbonarias crescit. Herbula muscosa, Violae. Odorem spirans. Agric. de Nat. Fossil. lib. V.

Jolithus seu lapis violaceus. Schwenkf. Cat. Foss. Siles. p. 382.

15.

Byssus farinacea, virescens, aquae inspersa Linnaei. Gled. Meth. Fung. p. 25.

Ein staubigter grüner Haar: Schimmel, welcher sich über das Wasser in Gestalt einer Haut ausbreitet.

In vasis aqua putrida per aliquot tempus repletis et in umbra locatis crescit copiose, ut et in aquis stagnantibus et ramis arborum dense tectis. Borussis das Wasser blühet.

16.

Byssus puluerulenta (candelaris) flava, lignis adnascens. Linn. Spec. Pl. p. 1169.

Agaricus lichenosus, nocte serena lampyridis instar lucens. Germ. Mäuschchen: Feuer. Helw. Tournef. Boruss.

## SPONGIA.

17.

Spongia erecta fragilis, ramis teretiusculis. Linn. Sp. Pl. p. 1171.

Spongia

*Spongia fluuiatilis ad Confervam accedens.* Rup. Fl. Jen.  
p. 308.

*Muscus aquaticus ceratoides.* Loef. Fl. Bor. p. 172.

Gehörnter Wasser: Moß.

Im Teich bey der Kupfer: Mühlen.

**LYCOPERDON. Stamb: Schwamm. Schäffer.**

*Linn. Gen. Pl. Nr. 974. Gouan H. R. M. p. 542.*

18.

*Lycoperdon subrotundum, laceratodehiscens.* Linnaei Ger.  
Fl. Gallo- Prov. p. 3.

*Lycoperdon globosum.* Gl. M. F. p. 143.

*Lycoperdon vulgare.* Tourn. Inst. p. 563.

*Fungus rotundus orbicularis.* C. B. P. p. 374.

*Fungus non vescus XII.* Loef. Fl. Bor. p. 90.

In pascuis pratisue. Am Kneiphöfischen Walle auf dem  
Haberberge. Bovist. *Crepitus Lupi.* J. Bauh.

Gemeiner Bovist sonder Stiel. Gleditschii.

19.

*Lycoperdon globosum et sessile, volua radiata, patente,*  
*ore acuminato, dentato.* Gl. M. F. p. 151.

*Fungus non vescus IX.* Loef. Fl. Bor. p. 90.

*Fungus stellatus carnei coloris.* Bocc. Mus. P. 1. Tab. 305.

Ein Stern: Bovist, sonder Stiel mit einer zackichten Mündung.  
*Crescit ad pini et betulae radices autumnö.*

20.

*Lycoperdon sphaericum, sessile, ore in apice vel integro,*  
*vel inaequali et radiato.* Gl. M. F. p. 150.

*Lycoperdon Epidendron, miniatum, puluerem fundens*  
*Buxbaum.* Cent.

*Fungus non vescus XXXI.* Loef. Fl. B. p. 69.

Doggen: Aug. Ein kugelrunder kleiner Blutrother Bovist  
sonder Stiel. *Vetustis lignis adnascitur.*

21.

*Lycoperdon aggregatum, tuberculosum, flauescens, basi*  
*et radice carens.* Gl. M. F. p. 154.

A 3

Ein

Ein knollichter und vielfach zusammen wachsender gelblicher  
Bovist, sonder Wurzel und Stiel.

Circa radices abietum in musco habitat.

22.

*Lycoperdon solidum*, subterraneum laeve, subrotundum,  
radice destitutum. Ger. Fl. Gallo-Pr. p. 5.

*Tubera subterranea*, testiculorum forma. Mentz. Pug. tab. 6.  
Tourn. Inst. p. 565.

Fungus non vescus. XXVIII. Gemeine Hirschbrunst. Loef.  
Fl. Bor. p. 95.

Crescit sub terra, ut plurimum in sylvis.

23.

*Lycoperdon solidum subterraneum*, muricatum, radice de-  
stitutum. Linn. Sp. Pl. p. 1183.

*Tubera Matthioli*, p. 544. Trufes. Tourn. Inst. p. 565.

*Tubera subterranea*, testiculorum forma. Mentz. Pug. Tab. 6.

*Lycoperdon subterraneum* ovato-oblongum, glabrum, basi  
et radice carens. Falsche Hirschbrunst; Schweintrüffel;  
Untermaß. Gled. Meth. Fung. p. 156.

24.

*Lycoperdon globosum*, subterraneum, solidum et scabrum,  
basi ac radice carens, capsulis feminalibus magnis.

Eine weiße Trüffel. Gl. M. F. p. 157.

Fungus castaneiformis. Wulff. Spec. Jnaug. p. 14.

In sylva bey Löwenhagen.

*Lycoperdon solidum* Linnaei.

**PEZIZA.** Ein Becher-Schwamm. Schäffer.

Linn. Gen. Pl. Nro. 937.

25.

*Peziza campanulata lentifera*. Linn. Sp. Pl. p. 1180.

*Peziza sessilis*, corpore campanulato; integerrimo. Gl. M.  
F. p. 137.

Fungus pyxioides feminifer. Loef. Fl. Bor. p. 98.

Fungoides infundibili forma, semine foetum. Tourn. Inst.  
p. 560. Vaill. Bot. Par. Tab. 2. Fig. 6. 7.

Fungus

*Fungus minimus ligneis tabulis arcolarum hortorum adnascens.* C. B. P. p. 514.

**Becher: Schwamm.**

*Fungus minimus, anonymus.* Clus. H. p. 287.

26.

*Peziza sessilis, campanulata, extus pilosa et fusca, intus striata, plumbea, glabra.* Gled. M. F. p. 138.

*Fungoides infundibili forma, semine foetum, interne striatum externe hirsutum.* Vaill. Bot. Par. Tab. XI. fig. 4. 5.

**Ein haarichter brauner Becher: Schwamm, welcher inwendig glat, bleifarbigt, gestreift und glänzend ist.**

*In ambulacris hortorum, locis umbrosis, pluviosa tempestate.* Helw. Suppl. Fl. B. p. 24. nr. 138.

27.

*Peziza, sessilis, campanulata, aurea, et glabra.* Gl. M. F. p. 138.

*Fungoides coriaceum aurantii coloris.* Helw. Tourn. Bor. Ej. Suppel. Fl. Bor. p. 24. nr. 139.

**Ein ganz kleiner gelber Becher: Schwamm. Gleditsch. Auf dem Angerburgschen Kirchhoff in montosis.**

28.

*Peziza sessilis, campanulata, exigua, intus aurea, extus sanguinea, scabra.* **Ein ganz kleiner Becher: Schwamm, welcher inwendig glat und goldgelb ist, auswendig aber blutroth und rauch ist.** Gl. M. F. p. 139.

*In musco circa radices betularum.*

29.

*Peziza stipitata, haemisphaerica.* Gled. M. F. p. 6.

*Elvela haemisphaerica, excavata, intus coccinea, extus alba, petiolo longissimo, concolore.* **Ein halb kugelförmiger ausgehöhlter Schwamm, auf einem hohlen und weißen Stiele, inwendig Scharlachfarben, außen aber weiß.** Gled. M. F. p. 47.

*Fungoides, seu Fungus Pezizae.* Helw. Suppl. Fl. B. p. 24. nr. 137.

**Crescit in umbrosis super putrida ramenta arborum.**

A 4

CLAVARIA.



**CLAUARIA. Keulen-Schwamm. Schäffer.***Linn. Gen. Plaut. Nr. 171. Gouan H. R. M. p. 542.*

30.

*Clauaria clauata*, integerrima, obtusa, erecta. Linnæi. Ger. Fl. Gallo. Pr. p. 7.

*Clauaria erecta*, corpore simplici, obtuso, integra. Ein gelber Keulen-Schwamm. Gled. M. F. p. 26.

*Agaricus clauatus flauescens*. Rupp. Fl. Jen. p. 306.

*Fungoides clauatum majus*. Dillen. Cat. Giesl. p. 189.

*Fungus non vescus* XXVI. Loefl. Fl. Bor. p. 95.

Hinter Lattenwalde im Gebürge, habitat.

*Clauaria militaris crocea*. Vaillant. B. Par. Tab. VII. Fig. 4.

31.

*Clauaria ramis confertis, ramosissimis, inaequalibus*. Linnæi. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 7.

*Coralloides flauum*. Tourn. Inst. p. 562.

*Coralla-fungus flauus*. Vaill. Bot. Par. Tab. 8. Fig. 4.

*Clauaria*, corpore multifido, inaequali et ramosissimo, in apices graciles, terminato. Corallen-Schwamm. Händling. Boeck. Bart. Ziegen-Bärtchen. Gled. Met. Fung. p. 31.

*Fungoides coralliformis*. Pancov. Herb. p. 79.

*Fungi digitelli*. Schwenckf. Cat. St. Siles. p. 79.

32.

*Clauaria siue Coralloides albidum*. Tourn. Inst. p. 562.

*Fungus ramosus*. C. B. P. p. 371.

*Fungus vescus* XXI. Vielstöpsichter grauer Boeck. Loefl. Fl. Bor. p. 85.

33.

*Clauaria siue Coralloides album, corniculis dilute purpureis*. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 8.

*Fungus vescus* XX. Eich. Boeck. Hasel. Boeck. Loefl. Fl. Bor. p. 84.

*Fungorum esculentorum genus* XIX. Clus. H. p. 274.

*Clauaria candida*, corpore multifido, inaequali et ramosissimo,

fissimo, in apices graciles dilute purpureos terminato.  
Gled. Meth. Fung. p. 32.

34.

Clauaria siue Coralloides dilute rufescens. Ger. Fl. Gallo-  
Pr. p. 8.

Fungus vescus XIX. Nestiger Ziegenbart. Loef. Fl. Bor. p.  
In quercetis.

Clauaria purpurea corpore multifido, inaequali et ramosissi-  
mo, in apices graciles terminato. Gled. Meth. Fung. p. 32.

35.

Clauaria ignei coloris, corpore crasso, inaequali et multi-  
fido, in breuiore et latiore apices determinato. Ein  
feuerrother und dicker Corallen-Schwamm, mit ganz kur-  
zen und breiten Spizen. Gl. M. F. p. 33.

In ericetis inter muscos et locis umbrosis.

36.

Clauaria candida parua, corpore multifido, cristato, ra-  
mulis rarius incis. Ein kleiner weisser kammförmig ge-  
wachsender und sehr wenig zertheilter Corallen-Schwamm.  
Gled. M. F. p. 34.

Crescit fere ubique super ligna putrida, inprimis in alnetis.

## CLATHRUS.

Linn. Gen. Pl. nr. 972. Götting. H. R. M. p. 542.

37.

Clathrus acaulis, subrotundus Linnæi. Ger. Fl. G. Pr. p. 8.

Clathrus sessilis, ovato turbinatus. Ein Ensförmiger, ro-  
ther, gegitterter und hohler Schwamm, sonder Stiel.  
Gled. Meth. Fung. p. 140.

Boleros cancellatus purpureus. Tourn. Inst. p. 561.

Fungus, quem ignem syluestrem vocant. Caesalp. de Plan-  
tis. p. 619.

Fungus rotundus cancellatus. C. B. P. p. 375.

Im fichtenen Bruch, wenn man von Hohenbagen nach  
Ottenbagen fährt.

**ELVELA. Ein Falten-Schwamm. Schäffer.***Linn. Gen. Pl. Nr. 970.*

38.

*Elvela pileo deflexo, adnato, lobato, difformi Linnæi*  
*Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 9.*

*Elvela petiolata, lamina informam capituli deorsum plicato-laciniata et crispa, petiolo fistuloso, striato et ramoso. Ein Morchelartiger Schwamm, dessen herunterwärts gezogene und krausfaltig zerschnittene Haut ein Hüttlein vorstellet, auf einem hohen gestreiften und risichten Stieble. Gled. Meth. Fung. p. 36.*

*Fungus autumnalis, bisulcus, veluti apex flaminis Plinii.*  
*Mentz. Pug. rar. Pl. Tab. 6.*

*Crescit in pratis post imbres.*

**PHALLUS. Gicht-Schwämme. Schäffer.***Linn. Gen. Pl. Nr. 969. Gouan H. R. M. p. 541.*

39.

*Phallus voluatus, stipitatus, pileo celluloso. Linn. Sp. Pl.*  
*p. 1179.*

*Phallus volua exceptus, capituli apice parulo. Die rechte Hirschbrunst über der Erde. Gled. Meth. Fung. p. 55.*

*Fungus non vescus XIII. Pintchen; Erdschmer. Loef. Fl.*  
*Bor. p. 91.*

*Boletus phalloides. Tourn. Inst. p. 562.*

*Fungus foetidus, penis imaginem referens. C. B. P. p. 374.*  
*In sylvis passim crescit.*

40.

*Phallus pileo ovato, stipite nudo, rugoso Linnæi. Ger. Fl.*  
*Gallo-Prov. p. 10.*

*Fungus vescus I. Morcheln. Loef. Fl. Bor. p. 79.*

*Phallus capitulo fastigiato, longiore, fuliginoso e candido-rubente, subtrus lamina alba operculato, petiolo nudo. Eine lange weißröthlichte Spitz; Morchel. Gled. Meth. Fung. p. 60.*

Fungus

*Fungus porosus, rugosus, albicans, quasi fuligine infectus.*  
C. B. P. p. 370.

*Fungorum esculentorum primi generis, Spec. I. Clus. Hist.*  
rar. p. 263.

*Morchella minor, oblonga, fuligine quasi infecta. Dillen.*  
Fl. Gieff. p. 188. In sylvis caeduis passim.

41.

*Phallus capitulo oblongo et obtuso, longius reticulato, sub-*  
*tus operculato; petiolo nudo breuissimo. Eine Spiß-*  
*Morchel mit einem kolbichten und länglich gegitterten Hüt-*  
*lein und einem sehr kurzen Stiegle. Gled. M. F. p. 61.*

*Fungus porosus in longitudinem metae excrefcens. C. B. P.*  
p. 370.

*Spiß-Morcheln. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 4. nro. 21.*  
In incultis.

42.

*Phallus seu Boletus porosus communis intestinorum gy-*  
*ros referens. Mentz. Pug. rar. Helw. Suppl. Fl. Bor.*  
p. 5. nro. 22.

*Krause groffe Morcheln. In sylvis umbrosis.*

## HYDNUM. Stachel-Schwamm. Schäffer.

*Linn. Gen. Pl. nr. 963.*

43.

*Hydnum pileo convexo, laevi, flexuoso. Linnæi. Gerar.*  
Fl. Gallo-Prov. p. 11.

*Boletus pileo pulvinato, integerrimo, tubulis connexis,*  
*echinato denticulatis. Ein gelber fleischichter Püß, mit*  
*einem platten gepolsterten Hütlein, dessen Röhrchen un-*  
*terwärts zahnförmig zerschnitten sind. Gl. M. F. p.*

*Erinaceus coloris pallide lutei. Dill. Cat. Giff. p. 188.*  
In pinastretis ordinarie habitat.

44.

*Hydnum stipitatum, pileo dimidiato. Linn. Ger. Fl. Gallo.*  
Pr. p. 11.

*Boletus pileolo semi-orbiculari, leuiter fastigiato, tubulis*  
conne-

connexis, echinato-denticulatis, petiolo praecalro et tenui. Ein kleiner harter gelbbrauner Baum: Pülz, mit einem halbrunden, etwas zugespitzten rauhen Hütlein, auf einem hohen und dünnen Stiele, und zahnförmig zerschnittenen Röhrchen. Gled. Meth. Fung. p. 74.

Fungus erinaceus, parvus, in conis abietis nascens. Buxb. Cent. 2. Fig. I. Pinis et abietis conis semiputridis innascitur.

### BOLETUS. Ein Löcher-Schwamm. Schäffer.

Linn. Genn. Pl. nr. 967. Gössan H. R. M. p. 540.

45.

Boletus Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Pr. p. 11.

Boletus subrotundus, petiolo horizontali breuissimo, tubulis subtilissimis. Ein halbrunder weißgrauer unterwärts platter Baum: Pülz, mit denen allerzartesten Röhrchen, und einem sehr kurzen seitwärts gesetzten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 78.

Agaricus pedis equini facie. Tourn. Inst. p. 562.

Agaricus auritus betularum. Birken Holz: Schwamm. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 1. nr. 2.

Fungus non vescus XXXVIII. Loef. Fl. Bor. p. 98.

Zunder: Schwamm. Helw. Tournefort. Bor. Class. XVII.

Fungi igniarii Tragi p. 943.

In sylvis ad betulas habitat.

46.

Boletus coriaceus, squamosus, sessilis et multiplex, lobis varie diuisis et expansis, tubulis tenuissimis, connexis, angulosis. Ein buntgestreifter, schuppenartig und vielfach wachsender Baum: Pülz, sonder Stiel mit denen allerzartesten eckichten Röhrchen. Gled. M. F. p. 70.

Fungus cerasorum imbricatim alter alteri innatus, variegatus. C. B. P. p. 272.

Agaricus varii coloris squamosus. Tourn. Inst. p. 562.

Fungus non vescus XXXIX. Kästcher Holz: Schwamm. Loef. Fl. Bor. p. 98.

In

In sylvis, pomariis, hortis, in lignis putridis etc. per totum fere annum crescit.

47.

*Boletus*, pileolo haemisphaerico, tubulis angulatis, petiolo ventricoso. Ein grosser dunkelgelber Püßk, mit einem halb kugelförmigen Hütlein, und einem sehr dicken Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 63.

*Boletus stipitatus*, pileolo glabro, pulvinato, marginato, poris compositis, acutis, porulis angulatis, brevioribus. Linn. Sp. Pl. p. 1177.

*Fungus vescus* XII. Loef. Fl. B. p. 83.

Bradt: Püßk.

48.

*Boletus*: pileolo latissimo, haemisphaerico desuper ferrugineo, rubente; inferne cum crasso petiolo subflavo. Ein sehr grosser und fleischichter braunrother Püßk, welcher unterwärts zusammen mit seinem starken Stiele dunkelgelb ist. Gled. Meth. Fung. p. 64.

*Fungus Augusti mensis*. C. B. P. p. 171.

*Fungus vescus* XIV. Stein: Püßke. Loef. Fl. Bor. p. 83.

*Fungus porosus maximus*. Rupp. Fl. Jen. p. 302.

In sylvis muscosis passim.

49.

*Boletus* pileolo haemisphaerico, superne viscido et fulvo, inferne luteo, petiolo candido flauescente, punctis et lituris nigricantibus distincto. Ein dunkelgelber flebrichter Püßk, mit einem plattrunden und in der Mitte etwas erhabenen Hütlein, unterwärts gelb, auf einem gelb und weißbunten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 65.

*Boletus laevis et viscidus*, obscure flauescens. Dill. Cat. Giff. p. 188.

*Fungus vescus* XVI. Kofzelarke. Loef. Fl. B. p. 84.

Locis muscosis et udis oblectatur.

50.

*Boletus*; pileolo rotundo, plano, in vertice elato, desuper rubro spadiceo, inferne flavo; petiolo ex albo et fulvo

*fuluo variegato.* Ein roth brauner Püßk, mit einem plattrunden und in der Mitte etwas erhabenen Hüttlein, unterwärts gelb, auf einem gelb- und weißbunten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 65.

*Fungus vescus* XVII. *Kohlköpfchen.* Loef. Fl. Bor. p. 84. *Graminosum eligit solum.*

51.

*Boletus; pileolo haemisphaerico, superne sub-obscuro, inferne flauo; petiolo ventricoso, spadiceo, in tenuem et longissimum mucronem desinente.* Ein dunkelbrauner grosser Püßk, unterwärts blasgelb, mit einem dicken gleichsam aufgeblasenen und sehr dünnen und lang zugespitzten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 67

*Fungus vescus* XIX. *Ziegen-Püßken.* Loef. Fl. Bor. p. 84. *Ericeta et muscosa amat.*

52.

*Boletus; coriaceus, cespitosus, tubulis tenuissimis, connexis, pileolo plano, crenato, et lineis concentricis variegato; centro subfusco, petiolo breui.* Ein lederhafter haufenweise wachsender Henne-Püßk, mit einem platten ausgezackten und schwärzlichen Hüttlein, welches oberwärts einen dunkelbraunen Wirbel hat, und mit vielen gleichen Circeln durchzogen ist. Gled. Meth. Fung. p. 68. *Ad areolas carbonarias frequens.*

53.

*Boletus; tubulis connexis, pileolo inuerso, infundibili formi, petiolo continuo.* Ein dunkelgelber lederhafter Baum-Püßk, mit einem umbgekehrten und in Gestalt eines Trichters über sich ausgebreiteten Hüttlein. Gled. Meth. Fung. p. 72. *In pinastretis et ericetis.*

## AGARICUS. Ein Blätter-Schwamm. Schäffer.

*Linn. Gen. Pl. nr. 966. Gouan H. R. M. p. 39.*

54.

*Agaricus stipitatus, lamellis dimidiaris, solitariis, stipite voluato, apice dilatato, basi ouato.* Linn. Sp. Pl. p. 1172. *Agaricus*

*Agaricus volva exceptus*, pileolo conico, in margine striato, petiolo anulato in basim squamoso-tuberosam desinente. *Fliegen:Schwamm. Rother Mücken:Schwamm.* Gled. Meth. Fung. p. 82.

*Fungus non vescus* II. Loef. Fl. Bor. p. 88.

*Fungi muscas interficientis* III. Species aut varietas. C. B. P. p. 373.

*Fungorum perniciosorum* Genus XII. Clus. H. l. 2. p. 280.

*Amanita muscaria miniata*. Dill. Fl. Giss. p. 181.

Habitat in pratis siccioribus.

55.

*Agaricus volva exceptus*, pileolo miniato, maculoso ouato turbinato, et in margine striato; petiolo annulato, in basim tuberosam desinente. Ein Zinnober:rother weiß gefleckter *Fliegen:Schwamm* mit einem kegelförmigen gegen den Rand zu gestrichelten Hütchen, und einem unterwärts knollichten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 83.

*Amanita muscaria, turbinata, miniata*. Dil. Cat. Giss. p. 181.

In ericetis circa frutices juni perinas.

56.

*Agaricus volva exceptus*, pileolo orbiculari, rufo-aureo, margine tenuissime striato, lamellis candidis, petiolo annulato, in basim tuberosam innuente. Ein hochrothgelber, und plattrunder *Fliegen:Schwamm*, sonder Flecken, und am Rande zart gestreift, mit einem geringelten, unterwärts knollichten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 83.

Inter betulas copiose.

57.

*Agaricus volva exceptus*, pileolo orbiculari, fusco maculato, in margine striato, petiolo annulato, in basim tuberosam desinente. Ein brauner, weißgefleckter *Fliegen:Schwamm*, mit einem platten und am Rande gestrichelten Hütchen, auf einem unterwärts knollichten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 83.

*Fungus non vescus* VI. Heide: *Fliegen:Schwamm*. Loef. Fl. Bor. p. 89.

58.



Ein knollichter und vielfach zusammen wachsender gelblicher  
Bovist, sonder Wurzel und Stiel.

Circa radices abietum in musco habitat.

22.

*Lycoperdon solidum*, subterraneum laeve, subrotundum,  
radice destitutum. Ger. Fl. Gallo-Pr. p. 5.

Tubera subterranea, testiculorum forma. Mentz. Pug. tab. 6.

Tourn. Inst. p. 565.

Fungus non vescus. XXVIII. Gemeine Hirschbrunst, Loef.  
Fl. Bor. p. 95.

Crescit sub terra, ut plurimum in sylvis.

23.

*Lycoperdon solidum subterraneum*, muricatum, radice de-  
stitutum. Linn. Sp. Pl. p. 1183.

Tubera Matthioli, p. 544. Trufes. Tourn. Inst. p. 565.

Tubera subterranea, testiculorum forma. Mentz. Pug. Tab. 6.

*Lycoperdon subterraneum* ouato-oblongum, glabrum, basi  
et radice carens. Falsche Hirschbrunst; Schweintrüffel;  
Untermast. Gled. Meth. Fung. p. 156.

24.

*Lycoperdon*, globosum, subterraneum, solidum et scabrum,  
basi ac radice carens, capsulis feminalibus magnis.

Eine weiße Trüffel. Gl. M. F. p. 157.

Fungus castaneiformis. Wulff. Spec. Jnaug. p. 14.

In sylva bey Löwenhagen.

*Lycoperdon solidum* Linnaei.

**PEZIZA.** Ein Becher-Schwamm. Schäffer.

Linn. Gen. Pl. Nro. 937.

25.

*Peziza campanulata* lentifera. Linn. Sp. Pl. p. 1180.

*Peziza sessilis*, corpore campanulato; integerrimo. Gl. M.  
F. p. 137.

Fungus pyxioides feminifer. Loef. Fl. Bor. p. 98.

Fungoides infundibili forma, semine foetum. Tourn. Inst.  
p. 560. Vaill. Bot. Par. Tab. 2. Fig. 6. 7.

Fungus

*Fungus minimus ligneis tabulis areolarum hortorum adnascens.* C. B. P. p. 514.

*Becher: Schwamm.*

*Fungus minimus, a nonymus.* Clus. H. p. 287.

26.

*Peziza sessilis, campanulata, extus pilosa et fusca, intus striata, plumbea, glabra.* Gled. M. F. p. 138.

*Fungoides infundibili forma, semine foetum, interno striatum externe hirsutum.* Vaill. Bot. Par. Tab. XI. fig. 4. 5.

Ein haarichter brauner Becher: Schwamm, welcher inwendig glat, bleyfarbicht, gestreift und glänzend ist.

*In ambulacris hortorum, locis umbrosis, pluviosa tempestate.* Helw. Suppl. Fl. B. p. 24. nr. 138.

27.

*Peziza, sessilis, campanulata, aurea, et glabra.* Gl. M. F. p. 138.

*Fungoides coriaceum auranti coloris.* Helw. Tourn. Bor. Ej. Suppl. Fl. Bor. p. 24. nr. 139.

Ein ganz kleiner gelber Becher: Schwamm. Gleditsch. Auf dem Angerburgschen Kirchhoff in montosis.

28.

*Peziza sessilis, campanulata, exigua, intus aurea, extus sanguinea, scabra.* Ein ganz kleiner Becher: Schwamm, welcher inwendig glat und goldgelb ist, auswendig aber blutroth und rauch ist. Gl. M. F. p. 139.

*In musco circa radices betularum.*

29.

*Peziza stipitata, haemisphaerica.* Gled. M. F. p. 6.

*Elvela haemisphaerica, excavata, intus coccinea, extus alba, petiolo longissimo, concolore.* Ein halb kugelförmiger ausgehöhlter Schwamm, auf einem hohlen und weissen Stiele, inwendig Scharlachfarben, aussen aber weiß. Gled. M. F. p. 47.

*Fungoides, seu Fungus Pezizae.* Helw. Suppl. Fl. B. p. 24. nr. 137.

*Crescit in umbrosis super putrida ramenta arborum.*

A 4

CLAVARIA.

**CLAUARIA. Keulen: Schwamm. Schäffer.***Linn. Gen. Plaps. Nr. 171. Gouan H. R. M. p. 542.*

30.

*Clauaria clauata*, integerrima, obtusa, erecta. Linnæi. Ger. Fl. Gallo. Pr. p. 7.

*Clauaria erecta*, corpore simplici, obtuso, integra. Ein gelber Keulen: Schwamm. Gled. M. F. p. 26.

*Agaricus clauatus flavescent.* Rupp. Fl. Jen. p. 306.

*Fungoides clauatum majus.* Dillen. Cat. Giesl. p. 189.

*Fungus non vescus* XXVI. Loef. Fl. Bor. p. 95.

Hinter Lattenwalde im Gebürge, habitat.

*Clauaria militaris crocea.* Vaillant. B. Par. Tab. VII. Fig. 4.

31.

*Clauaria ramis confertis, ramosissimis, inaequalibus.* Linnæi. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 7.

*Coralloides flavum.* Tourn. Inst. p. 562.

*Coralla-fungus flavus.* Vaill. Bot. Par. Tab. 8. Fig. 4.

*Clauaria*, corpore multifido, inaequali et ramosissimo, in apices graciles, terminato. Corallen: Schwamm. Händling. Bock's: Bart. Ziegen: Bärtchen. Gled. Met. Fung. p. 31.

*Fungoides coralliformis.* Pancov. Herb. p. 79.

*Fungi digitelli.* Schwenckf. Cat. St. Siles. p. 79.

32.

*Clauaria siue Coralloides albidum.* Tourn. Inst. p. 562.

*Fungus ramosus.* C. B. P. p. 371.

*Fungus vescus* XXI. Bielsköpfichter grauer Bock. Loefel. Fl. Bor. p. 85.

33.

*Clauaria siue Coralloides album*, corniculis dilute purpureis. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 8.

*Fungus vescus* XX. Eich: Bock. Hasel: Bock. Loef. Fl. Bor. p. 84.

*Fungorum esculentorum genus* XIX. Clus. H. p. 274.

*Clauaria candida*, corpore multifido, inaequali et ramosissimo,

fissimo, in apices graciles dilute purpureos terminato.  
Gled. Meth. Fung. p. 32.

34.

Clauaria siue Coralloides dilute rufescens. Ger. Fl. Gallo-  
Pr. p. 8.

Fungus vescus XIX. Nestiger Ziegenbart. Loef. Fl. Bor. p.  
In quercetis.

Clauaria purpurea corpore multifido, inaequali et ramosissi-  
mo, in apices graciles terminato. Gled. Meth. Fung. p. 32.

35.

Clauaria ignei coloris, corpore crasso, inaequali et multi-  
fido, in breuiore et latiore apices determinato. Ein  
feuerrother und dicker Corallen-Schwamm, mit ganz kurz-  
zen und breiten Spitzen. Gl. M. F. p. 33.

In ericetis inter muscos et locis umbrosis.

36.

Clauaria candida parua, corpore multifido, cristato, ra-  
mulis rarius incis. Ein kleiner weißer kammförmig ge-  
wachsender und sehr wenig zertheilter Corallen-Schwamm.  
Gled. M. F. p. 34.

Crescit fere ubique super ligna putrida, inprimis in alnetis.

## CLATHRUS.

Linn. Gen. Pl. nr. 972. Götting. H. R. M. p. 542.

37.

Clathrus acaulis, subrotundus Linnaei. Ger. Fl. G. Pr. p. 8.

Clathrus sessilis, ouato turbinatus. Ein Enzförmiger, ro-  
ther, gegitterter und hohler Schwamm, sonder Stiel.  
Gled. Meth. Fung. p. 140.

Boletus cancellatus purpureus. Tourn. Inst. p. 561.

Fungus, quem ignem syluestrem vocant. Caesalp. de Plan-  
tis. p. 619.

Fungus rotundus cancellatus. C. B. P. p. 375.

Im fichtenen Bruch, wenn man von Hohenhagen nach  
Ottenhagen fährt.

**ELVELA. Ein Falten-Schwamm. Schäffer.***Linn. Gen. Pl. Nr. 970.*

38.

Elvela pileo deflexo, adnato, lobato, difformi Linnaei  
Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 9.

Elvela petiolata, lamina informam capituli deorsum plicato-laciniata et crispa, petiolo fistuloso, striato et ramoso. Ein Morchelartiger Schwamm, dessen herunterwärts gezogene und krausfaltig zerschnittene Haut ein Hüttlein vorstellt, auf einem hohen gestreiften und risichten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 36.

Fungus autumnalis, bifidus, veluti apex flaminis Plinii, Mentz. Pug. rar. Pl. Tab. 6.

Crescit in pratis post imbres.

**PHALLUS. Gicht-Schwämme. Schäffer.***Linn. Gen. Pl. Nr. 969. Gössan H. R. M. p. 541.*

39.

Phallus voluatus, stipitatus, pileo celluloso. Linn. Sp. Pl. p. 1179.

Phallus volua exceptus, capituli apice patulo. Die rechte Hirschbrunst über der Erde. Gled. Meth. Fung. p. 55.

Fungus non vescus XIII. Pintchen; Erbschmer. Loef. Fl. Bor. p. 91.

Boletus phalloides. Tourn. Inst. p. 562.

Fungus foetidus, penis imaginem referens. C. B. P. p. 374.

In sylvis passim crescit.

40.

Phallus pileo ovato, stipite nudo, rugoso Linnaei, Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 10.

Fungus vescus I. Morcheln. Loef. Fl. Bor. p. 79.

Phallus capitulo fastigiato, longiore, fuliginoso e candido-rubente, subtus lamina alba operculato, petiolo nudo.

Eine lange weißröthliche Spitz; Morchel. Gled. Meth. Fung. p. 60.

Fungus

*Fungus porosus, rugosus, albicans, quasi fuligine infectus.*  
C. B. P. p. 370.

*Fungorum esculentorum primi generis, Spec. I. Clus. Hist.*  
rar. p. 263.

*Morchella minor, oblonga, fuligine quasi infecta. Dillen.*  
Fl. Gieß. p. 188. In sylvis caeduis passim.

41.

*Phallus capitulo oblongo et obtuso, longius reticulato, sub-*  
*tus operculato; petiolo nudo breuissimo. Eine Spiß-*  
*Morchel mit einem kolbichten und länglich gegitterten Hüt-*  
*lein und einem sehr kurzen Stiele. Gled. M. F. p. 61.*  
*Fungus porosus in longitudinem metae excrescens. C. B. P.*  
p. 370.

*Spiß-Morcheln. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 4. nro. 21.*  
In incultis.

42.

*Phallus seu Boletus porosus communis intestinorum gy-*  
*ros referens. Mentz. Pug. rar. Helw. Suppl. Fl. Bor.*  
p. 5. nro. 22.

*Krause-grosse Morcheln. In sylvis umbrosis.*

## HYDNUM. Stachel-Schwamm. Schäffer.

*Linn. Gen. Pl. nr. 963.*

43.

*Hydnum pileo convexo, laevi, flexuoso. Linnæi. Gerar.*  
Fl. Gallo-Prov. p. 11.

*Boletus pileo pulvinato, integerrimo, tubulis connexis,*  
*echinato denticulatis. Ein gelber fleischichter Pülz, mit*  
*einem platten gepolsterten Hütlein, dessen Röhrchen un-*  
*terwärts zahnförmig zerschnitten sind. Gl. M. F. p.*

*Erinaceus coloris pallide lutei. Dill. Cat. Gieß. p. 188.*  
In pinastretis ordinarie habitat.

44.

*Hydnum stipitatum, pileo dimidiato. Linn. Ger. Fl. Gallo.*  
Pr. p. 11.

*Boletus pileolo semi-orbiculari, leuiter fastigiato, tubulis*  
conne-

connexis, echinato-denticulatis, petiolo praecalto et tenui. Ein kleiner harter gelbbrauner Baum: Pülz, mit einem halbrunden, etwas zugespitzten rauhen Hütlein, auf einem hohen und dünnen Stiele, und zahnförmig zerschnittenen Röhrchen. Gled. Meth. Fung. p. 74.

Fungus erinaceus, parvus, in conis abietis nascens. Buxb. Cent. 2. Fig. I. Pinis et abietis conis semiputridis innascitur.

### BOLETUS. Ein Löcher-Schwamm. Schäffer.

Linn. Genn. Pl. nr. 967. Goëan H. R. M. p. 540.

45.

Boletus Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Pr. p. 11.

Boletus subrotundus, petiolo horizontali brevissimo, tubulis subtilissimis. Ein halbrunder weißgrauer unterwärts platter Baum:Pülz, mit denen allerzartesten Röhrchen, und einem sehr kurzen seitwärts gesetzten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 78.

Agaricus pedis equini facie. Tourn. Inst. p. 562.

Agaracus auritus betularum. Birken Holz: Schwamm. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 1. nr. 2.

Fungus non vescus XXXVIII. Loef. Fl. Bor. p. 98.

Zunder: Schwamm. Helw. Tournefort. Bor. Class. XVII.

Fungi igniarii Tragi p. 943.

In sylvis ad betulas habitat.

46.

Boletus coriaceus, squamosus, sessilis et multiplex, lobis varie diuisis et expansis, tubulis tenuissimis, connexis, angulosis. Ein buntgestreifter, schuppenartig und vielfach wachsender Baum: Pülz, sonder Stiel mit denen allerzartesten eckichten Röhrchen. Gled. M. F. p. 70.

Fungus ceraforum imbricatim alter alteri innatus, variegatus. C. B. P. p. 272.

Agaricus varii coloris squamosus. Tourn. Inst. p. 562.

Fungus non vescus XXXIX. Kästcher Holz: Schwamm. Loef. Fl. Bor. p. 98.

In

In sylvis, pomariis, hortis, in lignis putridis etc. per totum fere annum crescit.

47.

*Boletus*, pileolo haemisphaerico, tubulis angulatis, petiolo ventricoso. Ein grosser dunkelgelber Pülz, mit einem halb kugelförmigen Hütlein, und einem sehr dicken Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 63.

*Boletus stipitatus*, pileolo glabro, pulvinato, marginato, poris compositis, acutis, porulis angulatis, brevioribus. Linn. Sp. Pl. p. 1177.

*Fungus vescus* XII. Loef. Fl. B. p. 83.

Bradt: Pülz.

48.

*Boletus*: pileolo latissimo, haemisphaerico desuper ferrugineo, rubente; inferne cum crasso petiolo subflavo. Ein sehr grosser und fleischichter braunrother Pülz, welcher unterwärts zusammen mit seinem starken Stiele dunkelgelb ist. Gled. Meth. Fung. p. 64.

*Fungus Augusti mensis*. C. B. P. p. 171.

*Fungus vescus* XIV. Stein: Pülzke. Loef. Fl. Bor. p. 83.

*Fungus porosus maximus*. Rupp. Fl. Jen. p. 302.

In sylvis muscosis passim.

49.

*Boletus* pileolo haemisphaerico, superne viscido et fulvo, inferne luteo, petiolo candido flauescente, punctis et lituris nigricantibus distincto. Ein dunkelgelber flebrichter Pülz, mit einem plattrunden und in der Mitte etwas erhabenen Hütlein, unterwärts gelb, auf einem gelb und weissbunten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 65.

*Boletus laevis et viscidus*, obscure flauescens. Dill. Cat. Giff. p. 188.

*Fungus vescus* XVI. Kozzellarke. Loef. Fl. B. p. 84.  
Locis muscosis et udis oblectatur.

50.

*Boletus*; pileolo rotundo, plano, in vertice elato, desuper rubro spadiceo, inferne flavo; petiolo ex albo et fulvo



*fuluo variegato.* Ein roth brauner Püßz, mit einem plattrunden und in der Mitte etwas erhabenen Hüttlein, unterwärts gelb, auf einem gelb- und weißbunten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 65.

*Fungus vescus XVII. Kopfköpfchen.* Loef. Fl. Bor. p. 84. *Graminosum eligit solum.*

51.

*Boletus; pileolo haemisphaerico, superne sub-obscuro, inferne flauo; petiolo ventricoso, spadiceo, in tenuem et longissimum mucronem desinente.* Ein dunkelbrauner grosser Püßz, unterwärts blasgelb, mit einem dicken gleichsam aufgeblasenen und sehr dünnen und lang zugespitzten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 67

*Fungus vescus XIX. Ziegen-Püßken.* Loef. Fl. Bor. p. 84. *Ericeta et muscosa amat.*

52.

*Boletus; coriaceus, cespitosus, tubulis tenuissimis, connexis, pileolo plano, crenato, et lineis concentricis variegato; centro subfusco, petiolo breui.* Ein lederhafter haufenweise wachsender Henne-Püßz, mit einem platten ausgezackten und schwärzlichen Hüttlein, welches oberwärts einen dunkelbraunen Wirbel hat, und mit vielen gleichen Circeln durchzogen ist. Gled. Meth. Fung. p. 68. *Ad areolas carbonarias frequens.*

53.

*Boletus; tubulis connexis, pileolo inuerso, infundibili formi, petiolo continuo.* Ein dunkelgelber lederhafter Baum-Püßz, mit einem umbgekehrten und in Gestalt eines Trichters über sich ausgebreiteten Hüttlein. Gled. Meth. Fung. p. 72. *In pinastretis et ericetis.*

## AGARICUS. Ein Blätter-Schwamm. Schäffer.

*Linn. Gen. Pl. nr. 966. Gouan H. R. M. p. 330.*

54.

*Agaricus stipitatus, lamellis dimidiaribus, solitariis, stipite voluato, apice dilatato, basi ouato.* Linn. Sp. Pl. p. 1172.

*Agaricus*

*Agaricus volua exceptus*, pileolo conico, in margine striato, petiolo anulato in basim squamoso-tuberosam desinente. Fliegen:Schwamm. Rother Rücken:Schwamm. Gled. Meth. Fung. p. 82.

*Fungus non vescus* II. Loef. Fl. Bor. p. 88.

*Fungi muscas interficientis* III. Species aut varietas. C. B. P. p. 373.

*Fungorum perniciosorum* Genus XII. Clus. H. l. 2. p. 280.

*Amanita muscaria miniata*. Dill. Fl. Giff. p. 181.

Habitat in pratis siccioribus.

55.

*Agaricus volua exceptus*, pileolo miniato, maculoso ouato turbinato, et in margine striato; petiolo annulato, in basim tuberosam desinente. Ein Zinnober:rother weiß gefleckter Fliegen:Schwamm mit einem kegelförmigen gegen den Rand zu gestrichelten Hütchen, und einem unterwärts knollichten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 83.

*Amanita muscaria, turbinata, miniata*. Dil. Cat. Giff. p. 181.

In ericetis circa frutices juni perinas.

56.

*Agaricus volua exceptus*, pileolo orbiculari, rufo-aureo, margine tenuissime striato, lamellis candidis, petiolo annulato, in basim tuberosam innuente. Ein hochrothgelber, und plattrunder Fliegen:Schwamm, sonder Flecken, und am Rande zart gestreift, mit einem geringelten, unterwärts knollichten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 83.

Inter betulas copiose.

57.

*Agaricus volua exceptus*, pileolo orbiculari, fusco maculato, in margine striato, petiolo annulato, in basim tuberosam desinente. Ein brauner, weißgefleckter Fliegenschwamm, mit einem platten und am Rande gestrichelten Hütchen, auf einem unterwärts knollichten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 83.

*Fungus non vescus* VI. Heide:Fliegen:Schwamm. Loef. Fl. Bor. p. 89.

58.

58.

*Agaricus colore croceo.**Fungus non vescus III. Loef. Fl. Bor. p. 88.**Geeler Fliegen: Schwamm. Eichen: Fliegen: Schwamm. Inter abietes et quercus.*

59.

*Agaricus colore murino, inferne albo.**Fungus non vescus IV. Loef. Fl. Bor. p. 88.**Hasel: Fliegen: Schwamm. Grauer Fliegen: Schwamm.*

60.

*Agaricus amplissima volua exceptus, pileolo sub-rufa orbiculari, in margine striato; lamellis cum cylindraceo et annulato petiolo candidis. Ein dunkelrother Heide: Schwamm, mit einem platrunden, und um den Rand gestrichelten Hütchen, welches unterwärts zusammt dem hohlen und geringelten Stiele weiß ist. Gled. Meth. F. p. 84.**Fungus vescus VII. Süßling. Loef. Fl. B. p. 81.**Inter fruteta.*

61.

*Agaricus, amplissima volua exceptus, aureus, pileolo haemisphaerico, in margine striato, petiolo annulato, crasso annulo latissime cincto. Eyer: Schwamm. G. M. F. p. 85.**Fungus planus, orbiculatus, aureus. C. B. P. p. 371.**Fungus Caesareus. Helw. Tourn. Bor.**Fungus non vescus, XV. Heide Stein: Püßke. Loef. Fl. Bor. p. 83.*

62.

*Agaricus, amplissima volua exceptus, pileolo plano, spadiceo, verrucoso, in margine striato, lamellis candidis petiolo anulato et fistuloso. Ein brauner, blaßgelber, oder rosenfarbener Heide: Schwamm, mit einem platrunden und mit weißen Flecken gesprengelten Hütchen, auf einem hohlen geringelten Stiele und einer knollichten Wurzel. Gled. Meth. Fung. p. 85.**In aridis pinaestretis.*

63.

63.

*Agaricus, volva minore exceptus, pileolo orbiculati integerrimo, petiolo annulato, radice tuberosa.* Ein weißer Wiesen: Schwamm, mit einem plattrunden glatten Hütchen, und einer knollichten Wurzel. Gl. M. F. p. 86.

In pascuis aridioribus.

64.

*Agaricus volva exceptus, candidus, pileolo orbiculari integerrimo, petiolo annulato, tuberoso, crassissimo.* Ein ganz weißer Wiesen: Schwamm, mit einem plattrunden glatten Hütlein, und einem geringelten knollichten sehr starken Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 87.

In sulcis aruensibus aratro factis.

65.

*Agaricus, volva exceptus, pileolo pulvinato, griseo, lamellis candidis, petiolo annulato, inferius crasso, radice tuberosa.* Ein grauer Heide: Schwamm nebst einem unterwärts weißen und ausgepolsterten Hütchen auf einem etwas starken Stiele, und einer knollichten Wurzel. Gl. Meth. Fung. p. 87.

In montosis inter abietes.

66.

*Agaricus, volva exceptus, pileolo orbiculari, sub-obscuro, lamellis cum annulato et praecalto petiolo candidis, radice bulbosa.* Ein dunkelbrauner Feld: Schwamm, mit einem fast plattrunden Hütchen, unterwärts zusammen, dem sehr hohen und geringelten Stiele, weiß, nebst einer knollichten Wurzel. Gled. Meth. Fung. p. 88.

In campestribus gramineis circa betulas.

67.

*Agaricus, volva exceptus, pileolo campanulato, striato, verrice laevi, petiolo annulato, cylindraceo, fistuloso, in basin rostratam desinente.* Ein bleifarbener Mist: Schwamm, dessen glockenförmiges und gestreiftes Hütchen mit einem glatten Wirbel und runden, hohlen, glatten, weißen, geringelten Stiel versehen ist, der sich unterwärts

B

werts in eine Schnabelförmige Spitze endiget. Gled.  
Meth. Fung. p. 89.  
In fimoetis faecillime.

68.

Agaricus, volua magna et persistente exceptus, pileolo haemisphaerico, lamellis compactis, denticulatis, petiolo annulato, et crasso. Ein ganz weisser Heide-Schwamm, mit einem halbkugelförmigen Hütchen, sehr dicht gesetzten und ausgezackten Saamen-Häutchen, und einem starken geringelten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 91.  
In ericetis et pinastretis.

69.

Agaricus, volua magna et persistente exceptus, pileolo obruso, fastigiato, obscure viridi, lamellis subfulvis, petiolo cylindraceo, annulato, praealto, griseo. Ein grüner Heide-Schwamm, dessen stumpf zugespitztes Hütchen unterwärts dunkelgelb ist, mit einem sehr hohen, runden, geraden, geringelten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 91.  
In siccioribus sylvis passim.

70.

Agaricus, volua magna et persistente exceptus, pileolo haemisphaerico glabro, sordide purpureo, petiolo cylindrico, annulato. Ein ganz rother Heide-Schwamm, mit einem halbkugelförmigen glatten Hütchen und einem geringelten Stiele. Gl. M. F. p. 91.  
Sub betulis crescit.

71.

Agaricus, volua magna et persistente exceptus, parvus, pileolo haemisphaerico, griseo, lamellis cum fistuloso et annulato petiolo candidis. Ein kleiner lichtgrauer Fels-Schwamm, dessen halbrundes Hütchen unterwärts zusammen dem hohlen und geringelten Stiele weiß ist. Gled. Meth. Fung. p. 92.

Autumno pluuioso in gramineis locis circa vias.

72.

Agaricus volua persistente exceptus, pileolo fornicato, cylindrico.

lindrico. Ein gelber Wiesen-Schwamm, mit einem glatten, gewölbten Hütchen, welches unterwärts nebst seinem Stiel weiß ist. Gled. Meth. Fung. p. 92. Circa margines sylvarum locis graminosis,

73.

Agaricus, parvus, volva persistente exceptus, pileolo fornicato, sericeo et candido, lamellis rufescentibus, petiolo fistuloso, cylindraceo, albo. Ein kleiner, weißer, seidenshafter unterwärts röthlichter Schwamm, mit einem gewölbten Hütchen und runden, hohlen und weißen Stiele. Gl. M. F. p. 39.

Ibidem cum priori persaepe crescit.

74.

Agaricus, volva persistente exceptus, pileolo fastigiato, griseo, lamellis rufescentibus, petiolo cylindraceo, albo. Ein grauer und unterwärts röthlichter Schwamm, mit einem zugespitzten Hütchen und einem weißen Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 39.

In pascuis siccioribus.

75.

Agaricus, volva persistente exceptus, pileolo rotundo spadiceo, squamoso, lamellis candidis, petiolo cylindraceo, sub-obscuro. Ein kleiner dunkelbrauner Wiesen-Schwamm, mit einem runden oberwärts schuppichten Hütchen, unterwärts weiß, mit einem dunkelbraunen Stiel. Gl. Meth. Fung. p. 93.

In pascuis siccioribus passim.

76.

Agaricus, volva exceptus, pileolo integerrimo, plano, petiolo anulato, in basi tumido. Ein kleiner weißer Heu-Schwamm, mit einem plattrunden Hütchen, und einem geringelten nach unten zu etwas starken Stiele. Gled. M. Fung. p. 94.

In pascuis.

77.

Agaricus, volva exceptus, pileolo haemisphaerico, integerrimo,

rimo, petiolo gracili, praecalto fistuloso. Ein kleiner gelbbrauner Wiesen-Schwamm, dessen halbkugelrundes Hütchen unterwärts zusammt dem hohlen, dünnen und sehr hohen Stiele, und weit auseinander gesetzten Saamen: Häutchen. Gled. Meth. Fung. p. 95.

In sylvis caeduis ficcioribus.

78.

*Agaricus parvus, pileolo haemisphaerico, carneo-fulvescente, vertice sub-fusco, lamellis amplis, carneis laxe dispositis, petiolo breui, fistuloso et concolore.* Ein kleiner Heide-Schwamm, dessen halb kugelrundes und rothgelbes Hütchen einen dunkelbraunen Wirbel hat, mit breiten, auseinander stehenden Saamen: Häutchen, und einem hohlen kurzen Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 96.

Inter Ericam.

79.

*Agaricus pileolo orbiculari, ad oras fornicato, fulvescente, vertice cauo, lamellis amplis, carneis, laxioribus, petiolo compresso, striato, rubente.* Ein gelber Heide-Schwamm, mit einem plattrunden, am Rande hin etwas gewölbten Hütchen, hohen Wirbel, breiten, fleischfarbenen, auseinander stehenden Saamen: Häutchen, und einem platten, röthlichen, gestreiften Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 96.

Ad arborum truncos emortuos.

80.

*Agaricus pileolo arbutulari, squamoso, dilute spadiceo, vertice papillato nigricante, lamellis laxis, luteo spadiceis. petiolo longissimo, è candido fulvo et subfusco variegato.* Ein hellbrauner schuppichter Heide-Schwamm, mit einem warzenförmigen schwärzlichen Wirbel, gelbbraunen von einander stehenden Saamen: Häutchen, und einem aus weiß, dunkelgelb und dunkelbraun variirten, sehr langem Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 97.

In dejectis et putridis ramis pinorum.

81.

*Agaricus pileolo pulvinato, integerrimo, et in centro profundius*

fundius depresso, lamellis connexis, angustis et compactis, petiolo continuo, cylindrico et crasso. Ein weißer Pfeffer: Schwamm, welcher sehr viel Milch von sich giebet. Der rechte wahre Käyser: Schwamm. Gled. M. Fung. p. 97.

Fungus albus acris. C. B. P. p. 371.

Fungus piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens. Tourn. Inst. p. 558.

Fungus vescus IX. Bitterling. Loef. Fl. Bor. p. 82.

In pratis, pascuis, sylvis.

82.

Agaricus, candidus, lactescens, pileolo haemisphaerico, umbilicato, lamellis perangustis et compactis. Ein kleiner weißer Pfeffer: Schwamm, mit einem halbkugelförmigen und nabelförmigen Hütchen, und schmalen sehr dichte zusammengezogenen Saamen: Häutchen. Gl. Meth. Fung. p. 98.

Fungus non vescus X. Herbstling. Loef. Fl. Bor. p. 82.

83.

Agaricus, albus, acris, pileolo turbinato, centro depresso, lamellis angustis, undulatis, ramosis et saepius conjunctis. Ein grosser, weißer, giftiger Pfeffer: Schwamm, ohne Milch: Saft, mit schmalen, krausen, ästigen und öfters zusammenhängenden Saamen: Häutchen. Gl. Meth. Fung. p. 99.

Fungus non vescus. V. Weißer Fliegen: Schwamm. Loef. Fl. Bor. p. 99.

Fungus infundibili formis, maximus, albus. Buxbaum Cent. IV. Tab. I.

In locis sylvarum declivibus.

84.

Agaricus albus, acris, pileolo turbinato, anguloso, in centro depresso, et in margine striato, lamellis ramosis, undulatis, saepius conjunctis. Ein weißer Pfefferling, oder Pfeffer: Schwamm, sonder Milch: Saft, mit krausen, ästigen, und öfters zusammenhängenden Saamen: Häutchen. Gled. Meth. Fung. p. 99.

B 3

Fungus



*Fungus albus, perniciosus, instar fungi lutei; Chanterelle dicti, se contorquens.* Buxb. Cent. IV. Tab. 32.

85.

*Agaricus, acris, pileo (variorum colorum) pulvinato, in centro depresso, et in margine rugoso et striato, lamellis rarioribus, crassis, diuisis, saepius conjunctis, cum breui petiolo, candidis.* Ein kleiner Pfeffer; Schwamm mit einem gepolsterten, auf dem Wirbel vertieften und am Rande gekrausten und gestreiften Hütchen, von vielerley Farbe, mit wenigern, stärckern, ästigen und öfters zusammenhangenden Saamen-Häutchen, welche nebst dem kurzen Stiele allezeit weiß sind. Gled. Meth. Fung. p. 100.

*Fungus piperatus non lactescens.* Vaill. B. P. p. 62. nr. 11.

*Fungus viridis, capitulo umbilicato.* Buxbaum Cent. V. Tab. 47.

*Crescit in pinastretis fere ubique.*

86.

*Agaricus pileolo haemisphaerico, in centro depresso, et in margine fornicato, petiolo breui et crasso.* Reisker. Gled. Meth. Fung. p. 101.

*Fungus vescus II.* Reisker. Loef. Fl. Bor. p. 79.

87.

*Agaricus, pileolo haemisphaerico, lateritii coloris dilutioris, margine fornicato, lanuginoso, lamellis, cum longiore petiolo, candidis.* Ein Birken-Reiske. Gled. Meth. Fung. p. 101.

*Fungus vescus XI.* Birkling. Loef. Fl. Bor. p. 82.

*Ad betularum radices.*

88.

*Agaricus, haemisphaerico, rufescente, hirsuto, in centro superne excauato, et lineis concentricis saturatoribus distincto, margine fornicato, lamellis, cum breui petiolo, fuscis.* Ein röthlichter Reisker, dessen rundes, und auf dem Mittelpuncte ausgehöhltes Hütlein mit etlichen dunkelrothen Circeln umbzogen, und mit einem gewölbtem Rande

Rande versehen ist, unterwärts zusamt seinem kurzen Stiele ganz braun. Gled. Meth. Fung. p. 102.

Fungus pileolo lato et rotundo liuido. Helw. Tourn. Bor.

Fungus vescus. V. Loef. Fl. Bor. p. 80.

In muscosis, humidis fyluis.

89.

Agaricus pileolo haemisphaerico, amplo. margine non nihil subverso, in vertice concauo et subfusco, reliqua parte, lineis concentricis alternis lateritii dilutioris et saturationis coloris distincto, lamellis cum petiolo albis. Ein grosser dunkelbrauner Reiske, dessen Hütchen mit einem ausgehöhlten Wirbel und auswärts gebogenem Rande versehen, im übrigen aber mit verschiedenen bald blässern, bald dunklern, abwechselnden ziegelfarbenen Circeln umzogen ist, unterwärts zusamt seinem Stiele ganz weiß. Gled. Meth. Fung. p. 102.

Fung vescus III. Steinreiske. Loef. Fl. Bor. p. 80.

90.

Agaricus, pileolo haemisphaerico, in margine fornicato, spadiceo, lamellis cum breui petiolo luteo-fuscis. Ein dunkelbrauner Wiesen-Reiske, mit einem Runden am Rande hin gewölbten Hütchen, unterwärts zusamt seinem kurzen Stiel gelbbraun. Gled. Meth. Fung. p. 103.

Fungus vescus IV. Stein-Reiske. Loef. Fl. Bor. p. 80.

91.

Agaricus, luteus, pileolo turbinato, in margine anguloso, laciniato et varie contorto, lamellis crassis, venosis, ramosis et crispis. Gelber Pfifferling. Gl. M. F. p. 103. Fungus angulosus et velut in lacinias dissectos. C. B. P. p. 558.

Amanita lutea, oris contortis. Dill. Cat. Giff. p. 179.

92.

Agaricus vitellini coloris, pileolo turbinato, margine anguloso, varie laciniato, fimbriato et expanso, lamellis crassis, venosis, ramosis et crispis. Ein dotter-gelber Pfifferling, mit einem spitzigen Hütchen und eckigten, fastigzerschnitt-

B 4

zerschnittenen und ausgebreitetem Rande. Gled. Meth. Fung. p. 104.

93.

*Agaricus*, pileolo pulvinato, in margine striato, petiolo anulato, ad radicem tuberoso. Ein Kremling, Grünling. Bratling. Gled. Meth. Fung. p. 105.

*Amanita kremlinga*, magna, aspera, virescens. Dill. Cat. Giff. p. 178.

In sylvis muscosis.

94.

*Agaricus*, petiolo lato, pulvinato, viridi et glabro, lamellis cum anulato petiolo albis. Ein grosser Kremling.

95.

*Agaricus*, pileolo cucullato, glabro, viridi, splendente et viscido, lamellis cum petiolo candidis. Ein grüner Kremling mit einem fappenförmigen und glänzendem Hütchen. Gled. Meth. Fung. p. 105.

In fruticetis.

96.

*Agaricus*, pileolo orbiculari, in margine rugoso et striato, vertice tumido, petiolo breui. Ein fleischfarbener Heide-Schwamm, mit einem plattrunden und am Rande faltigten und gestreiften Hütchen und erhabenem Wirbel, auf einem kurzen Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 106.

Crescit circa betulae et pini radices.

97.

*Agaricus*, pileolo striato, haemisphaerico, paruo, lamellis angustissimis, paucis, petiolo capillaceo, altissimo. Ein sehr zartes und kleines Schwämmchen, mit einem weißgelblichen halb kugelförmigen Hütchen, und einem überaus langen, schwarzen, haarförmigen, zähen Stiel. Gled. Meth. Fung. p. 108.

*Amanita minima muscosa*. Dill. Cat. Giff. p. 182.

*Fungus pileolo etc.* Vaill. Bot. P. Tab. 2. F. 21. 22. 23.

*Ex lignis putrescentibus, locis umbrosis enascens.*

98.

*Agaricus*, pileolo in conum acutum fastigiato, piloso, petiolo

10

lo in bassum humidum. Ein kleiner, weisser Schwamm, mit einem sehr spitzigen kegelförmigen und zottichten Hütchen, unterwärts schwarz, auf einem hohen, weissen und nach unten zu etwas dicken Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 108.

Amat loca humida et umbrosa. Non solum in sylvis, sed etiam in vasculis aliquando plantarum ligneis hybernaculo et caldario contentis, habitat.

99.

Agaricus, pileolo cucullato, viscido et nigro, petiolo fistuloso, candido. Ein schwarzer flebrichter Mist-Schwamm, mit einem kappenförmigen Hütchen, und einem hohlen weissen Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 109.

In locis limosis et stercoreis.

100.

Agaricus, pileolo campanulato et striato, parvo, lamellis rariis, petiolo cylindrico. Ein kleiner, rother Wiesen-Schwamm, mit einem glockenförmigen gestreiften Hütchen, und blassen, weit von einander stehenden Saamen Häutchen. Gled. Meth. Fung. p. 109.

Amanita exigua, sanguinei coloris. Dill. Cat. Giss. p. 181. In pascuis, pratis et pomariis.

101.

Agaricus, pileolo plano, viscido, citrino et splendente, vertice in conum acutum, fastigiato, lamellis rariis. Ein kleiner, citronengelber, flebricht und glänzender Wiesen-Schwamm, mit einem plattrunden Hütchen, dessen Wirbel kegelförmig zugespizet ist, mit weit von einander stehenden Saamen-Häutchen. Gl. Meth. F. p. 110.

102.

Agaricus pileolo integerrimo, vertice elato, aut depresso, lamellis angustissimis. Ein kleiner rother Dorn-Schwamm, mit einem runden auf dem Mittelpunct etwas erhabenen oder eingedruckten Wirbel, unterwärts weis, und am Stiele röthlicht. Gled. Meth. Fung. p. 110.

Ein Mouceron. Idem.

*Fungus pileolo rotundiori, Mouceron dictus. Tourn. Inst. p. 557.*

Mouceron, oder Moß; Schwämme, weilen sie unter dem Moß wachsen. Helw. Tourn. Bor. nr. IX.

103.

*Agaricus, parvus, pileolo umbilicato, rufescente, lamellis candidis, petiolo fistuloso, longiore et rufo. Ein kleiner Mouceron, mit einem röthlichten, nabelformigen Hütchen, unterwärts weiß, auf einem langen, rothen und hohen Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 110.*

104.

*Agaricus parvus, pileolo haemisphaerico, fuluo, in vertice tumido, lamellis candidis, petiolo longiore luteo. Ein kleiner dunkelgelber Mouceron mit einem halbkugelförmigen und auf dem Wirbel etwas erhabenen Hütchen, unterwärts weiß, auf einem blaßgelben langen Stiele. Gl. Meth. Fung. p. 111.*

In pascuis.

105.

*Agaricus parvus, pileolo integerrimo, minore et rubicundo, lamellis densioribus, angustissimis, cum petiolo candidis. Ein kleiner Mouceron, mit einem rothen, schmalen Hütchen, unterwärts zusammt dem Stiele weiß. Gl. Meth. Fung. p. 111.*

106.

*Agaricus parvus, pileolo haemisphaerico, ex albo et eoccineo vario, viscido, lamellis albis, petiolo tenui et luteo, ad basin fusco. Ein kleiner fleckichter Mouceron, mit einem halb kugelförmigen, roth und weiß gefleckten Hütchen, unterwärts weiß, auf einem dünnen, gelben und nach unten zu ganz braunen Stiele. Gled. Meth. F. p. 117.*

107.

*Agaricus, pileolo haemisphaerico, griseo, lamellis angustis, cum petiolo, albis. Ein kleiner grauer Mouceron, mit einem runden Hütchen, unterwärts zusammt dem Stiele weiß. Gled. Meth. Fung. p. 111.*

Fungus

Fungus pileolo rotundiore, Mouceron dictus. Tourn. Inst.  
P. 557.

108.

Agaricus pileolo plano, lacero, angusto, petiolo cylindraceo, tenui. Ein dunkelgrauer Heide-Schwamm, dessen plattrundes Hütchen, zusammt dem dünnen Stiele weiß ist. Gl. M. F. p. 112.

Amanita, pileolo plano orbiculari fusco, cinereo, angusto, pediculo et lamellis albis, Dill. Cat. Giff. p. 180.

In ericetis et sylvis habitat.

109.

Agaricus, pileolo haemisphaerico, contracto, plumbeo, et squamoso, lamellis cum crasso et breui et fistuloso petiolo candidis. Ein bleifarbener Schwamm, mit einem schuppichten halb kugelförmigen, etwas zusammen gezogenen Hütchen, unterwärts zusammt dem kurzen und starcken Stiele ganz weiß. Gled. Meth. Fung. p. 113.

Fungus pileolo conico, maculato. Vaill. B. P. p. 63. nr. 19.  
Circa betulas et pinos.

110.

Agaricus, pileolo papillari, amplissimo, in margine fornicato, lacero et filamentoso, petiolo anulato procero, inferius tumido, pilei acetabulo inserti. Ein weißer rotht und braunsprecklichter Heide-Schwamm, dessen rund zugespitzter grosser Hut auf dem Wirbel mit einer Warze versehen und am Rande hingespalten und fasericht ist, auf einem überaus hohen mit einem Ringe umgebenen Stiele, welcher oberwärts in einer besondern runden Vertiefung des Hutes befestiget wird. Gl. M. F. p. 114.

Fungus pileolo lato, longissimo pediculo, variegato. C. B. P. p. 371.

111.

Agaricus, pileolo amplo, haemisphaerico, fornicato, petiolo breui, anulo permanente cincto. Ein gemeiner Champignon. Gled. Meth. Fung. p. 115.

Fungus pileolo lato et rotundo. C. B. P. p. 370.

Tourn.

<sup>1</sup>Tourn. Inst. p. 556.

Fungus vescus XXIII. Ruchmilchen. Loef. Fl. Bor. p. 85.

Amanita campestris, alba superne, inferne rubens. Dill. Cat.

Giss. p. 117.

In locis saepe stercorosis equorum culpa.

112.

Agaricus pileolo haemisphaerico, candido, lamellis subrubentibus, petiolo longiore, crasso, anulo amplo et permanente cincto. Ein grosser Champignon, unterwärts dunkelroth, dessen starker und hoher Stiel mit einem viel breiteren und dauerhaftern Ringe versehen ist. Gled. Meth. Fung. p. 116.

113.

Agaricus parvus, pileolo haemisphaerico, candido, lamellis roseis, pediculo anulato, tenui. Ein kleiner Champignon, mit einem schneeweissen und rundgewölbtem Hütchen, rosenfarben Saamen-Häutchen und einem dünnen geringelten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 116.

114.

Agaricus candidus, pileolo fornicato, squamoso, petiolo anulato, cylindraceo et crasso. Ein ganz weisser, falscher, schuppichter Champignon, mit einem rundgewölbtem Hütchen, und einem sehr dicken, geringelten Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 117.

In fimetis.

115.

Agaricus pileolo orbiculati, puluinato, pallido vel candido, margine hirsuto, aureo, striato, lamellis albis, petiolo breui, crasso et villosa. Mün: Schwamm. Weissling. St. Georgen: Schwamm. Gl. M. F. p. 117.

Amanita diui Georgii. Dill. Cat. Giss. p. 178.

Fungus orbicularis exalbidus, pratensis. C. B. P. p. 370.

116.

Agaricus pileolo puluinato, magno, petiolo breui et tenui. Ein weisser Wiesen-Schwamm, mit einem plattrunden Hütchen,

Hütchen, auf einem dünnen und kurzen Stiele. Gled. M.  
Fung. p. 118.

In ericetis passim.

117.

Agaricus, pileolo haemisphaerico, petiolo tenuissimo. Ein ganz kleiner weisser Wiesen-Schwamm, mit einem halbkugelrunden Hütchen, auf einem hohen und dünnen Stiele. Gled. M. F. p. 119.

In sylvis, hortis, pascuis.

118.

Agaricus perpusillus, niveus, pileolo haemisphaerico, petiolo setaceo, longissimo et tenuissimo. Ein überaus kleines weisses Schwämmchen, mit einem halb kugelrunden Hütchen, auf einem sehr hohen und haarförmigen Stiele. Gl. M. F. p. 121.

Crescit gregatim in quiscuiliis et rejectaneis putrescentibus et arborum foliis congestis.

119.

Agaricus exiguus, candidus, pileolo galericulato, petiolo tenuissimo et longissimo. Ein ganz kleines, weisses Baumschwämmchen, mit einem helmförmigen Hütchen, und einem überaus dünnen und hohen Stiele. Gled. Meth. F. p. 121.

Ad alnos senio moribundas.

120.

Agaricus exiguus, pileolo lobata, limbo superne parte rumpando, petiolo breui. Ein ganz kleines, weisses Schwämmchen, mit einem eckichten Hütchen und einem nach oben zu auswärts getriebenen Rande und einem kurzen Stielchen. Gl. M. F. p. 121.

Fungus fugacissimus Tournefortii.

In hortis circa carpinos saepissime vidi.

121.

Agaricus per exiguus, niveus, pileolo superius in formam infundibili conuerso. Ein überaus kleines und in Gestalt



stalt eines Trichters über sich gekrümmtes Schwämmchen.  
Gled. Meth. Fung. p. 122.

In muscis et graminibus emortuis, vere.

122.

*Agaricus pileolo campanulato, contracto, striato et villoso, lamellis tenuissimis, petiolo cylindraco, anulo fugaci, distincto vel nullo* Ein Krotten-Schwamm. Padden-Stuhl, Mist-Schwamm. Gl. M. F. p. 122.

Fungus non vescus XX. Großer Krottenstuel. L. F. B. p. 93.

*Amanita obtuse coniformis, cinerea aut ex liuido nigricans.*  
Dill. Cat. Giss. p. 182.

Fungus in fimetis crescens, vulgo Padden-Stuhl. Panc. Herb. p. 185. Fig. 14.

123.

*Agaricus pileolo campanulata, sulcato, sericeo et griseo, in margine obtuse denticulato, lamellis cinereis, petiolo ex una basi multiplici, cylindraco, fistuloso et albo.* Ein blenfarbener, aus einer Wurzel vielfach herfür wachsende Krotten-Schwamm, mit einem tief gestreiften Hütchen und ausgezacktem Rande, aschgrauen Saamen Häutchen und einem weissen hohen Stiele. Gl. M. F. p. 123.

Fungus non vescus XXI. Klein Krottenstuel. Loef. Fl. B. p. 93.

In cellis, subterraneis locis et ambulacris hortorum umbrosis crescit.

124.

*Agaricus pileolo haemisphaerico, amplo, desuper a centro versus peripheriam striato, petiolo cylindraco, fistuloso.* Ein grauer Feld- und Garten-Schwamm, mit einem halb kugelförmigen, gestreiften Hütchen, auf einem hohlen und weissen Stiele. Gl. M. Fung. p. 124.

Fungus non vescus XXII. Großer Doggenstuel. Loef. Fl. B. p. 94.

In fimetis et agris.

125.

*Agaricus, pileolo galericulato, cinereo, lanuginoso, desuper*

a

a centro versus peripheriam striato, petiolo cylindraceo, fistuloso, longiore et candido. Ein grauer Mist-Schwamm, mit einem halmförmigen, wölbichten und gestreiften Hütchen, auf einem hohlen, weissen und gestreiften Stiele, Gl. M. Fung. p. 124.

Fungus non yescus XXIII. Klein Doggenstuel. Loef. Fl. B. p. 94.

In fimetis.

126.

Agaricus tenerimus, exiguus et subcinereus, pileolo plano, desuper a centro depressus, peripheriam versus striato, lamellis fuscis, petiolo fistuloso, candido, tenuissimo. Ein sehr kleiner, zarter, dunkelgrauer Schwamm, mit einem plattrunden, oberwärts von seinem hohen Wirbel an bis gegen den Rand zu gestreiften Hütchen, unterwärts braun, auf einem zarten, hohen, weissen und hohlen Stiele. Gl. M. Fung. p. 125.

In pratis spongiosis.

127.

Agaricus exiguus, glauco, cinereus, pileolo haemisphaerico, a centro versus peripheriam striato, petiolo breui. Ein sehr kleines und zartes schimmelgraues Baum-Schwammchen, mit einem runden gestreiften Hütchen und kurzen Stielchen. Gled. Meth. Fung. p. 124.

In truncis alnorum et abietum putridis.

128.

Agaricus cinereus, parvus, pileolo galericulato, a centro versus peripheriam striato, petiolo lacero. Ein kleiner aschgrauer Feld-Schwamm, mit einem gestreiften Hütchen, und mit einem röhrichtigen Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 125.

In agris et pascuis detonsis.

129.

Agaricus parvus, fuscus, pileolo galericulato, e medio versus peripheriam striato. Ein kleiner brauner Schwamm, mit

mit einem helmförmigen, nur von der Helfte bis auf den Rand gestreiften Hütchen. Gl. M. Fung. p. 127.

*Amanita parva, fusci ubiuis colore.* Dill. Cat. Giff. p. 182.

130.

*Agaricus, ex una basi multiplex, pileolo rufo-fuluo galericulato, in vertice lacui, reliqua parte striato, lamellis nigris, petiolo candido et fistuloso.* Ein rothgelber, aus einer Wurzel vielfach hervor wachsender Schwamm, mit einem helmförmigen, auf seinem Wirbel ganz glatten, übrigens aber gestreiften Hütchen, unterwärts schwarz, auf einem weissen und hohlen Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 128.

*In arborum truncis, humectatis et putrescentibus.*

131.

*Agaricus pileolo fastigiato, superne lacero, petiolo anulato, cylindraceo, in basi tumido.* Ein kleiner dunkelgrauer Schwamm, mit einem schupptichten, zugespitzten Hütchen, und einem geringelten Stiele, welcher am untersten Ende etwas stark ist. Gled. Meth. Fung. p. 129.

*In sylvis abietum passim.*

132.

*Agaricus pileolo campanulato, in centro depresso, lamellis tenuibus, petiolo sulcato, gracili.* Ein ganz weisser flebrichter Schwamm, mit einem glockenförmigen Hütchen, eingedrücktten Wirbel und sehr zarten Saamen-Häutchen, auf einem sehr schlanken ripigten Stiele. Gled. Meth. F. p. 130.

*In dumetis et virgultis saepissime.*

133.

*Agaricus, candidus et viscidus, ex una basi multiplex, pileolo campanulato, in centro depresso, petiolo cylindraceo, gracili.* Ein weisser, glänzender und flebrichter Schwamm, welcher aus einer Wurzel vielfach hervor wächst, mit einem glockenförmigen, auf dem Wirbel eingedrücktten Hütchen, und einem schlanken Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 130.

Fungus

*Fungus albidus, splendens, ex uno pediculo, multiplex.*  
Vaillant. Bor. Par. p. 64.

*Fungus non vescus XXIV. Vielsköpfigter Voggen: Stuel.*  
Loef. Fl. Bor. p. 94.

*Fungi albi lucentes.* Helw. Tourn. Bor. nr. 32.

*In pagis, sylvis, hortis; ad ligna cariola.*

134.

*Agaricus candidus, ex una basi multiplex, pileolo umbilicato.* Ein weisser, aus einer Wurzel hervor wachsender Schwamm, mit einem platten nabelformigen Hüthen.  
Gled. Meth. Fung. p. 131.

*Amanita fasciculosa alba ad arborum radices.* Dill. Cat. Giff. p. 131.

135.

*Agaricus, ex una basi multiplex, pileolo plano, petiolo anulato, cylindraceo.* Ein ganz gelber, aus einer Wurzel vielfach hervorkommender Schwamm, mit einem plattrunden Hüthen und geringeltem Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 131.

*Fungus in Borussia esculentus.*

*Ad radices arborum in silvis, inprimis abietum.*

136.

*Agaricus croceus, parvus, ex una basi multiplex, pileolo haemisphaerico, lamellis cum anulato et fistuloso petiolo candidis.* Ein kleiner Safran-gelber und aus einer Wurzel vielfach hervor wachsender Schwamm, mit einem halbkugelrunden Hüthen, welches unterwärts, zusamt dem geringelten hohlen Stiele, weiß oder blaßgelb ist.  
Gled. Meth. Fung. p. 132.

*Fungi luteoli.* Helw. Tourn. Bor. nr. 36.

*In alnetis circa ramos arborum putridos.*

137.

*Agaricus ex una basi multiplex, pileolo croceo, plano, maculis spadiceis, vario, lamellis viridibus, densis, petiolo cylindrico, anulato et fistuloso, dilutis flavescente.* Ein gelber und braun gefleckter, vielfach aus einer Wurzel hervor:  
C

hervorkommender Baum-Schwamm, mit einem ungleich platten Hüthen, und Meer-grünen Saamen-Häutchen, auf einem hohlen, geringelten blasgelben Stiele. Gled. Meth. Fung. p. 132.

Post pluuias in lignis cariosis.

138.

*Agaricus flabelliformis*, villosus, pileoli margine fornicato. Ein schmaler, zottichter und dunkelbrauner Baum-Schwamm, mit einem gewölbten Rande unterwärts gelb oder weiß. Gl. Meth. Fung. p. 133.

Ad ligna emortua et arbores in syluis densis et udis.

139.

*Agaricus coriaceus*, durus, sessilis, squamosus et multiplex, lamellis ramosis, sinuosis et sibi inuicem implexis. Ein schuppenartig wachsender, vielfacher, glatter und lederhafter Baum-Schwamm, sonder Stiel, mit harten, in einander liegenden und geschlungenen Saamen-Häutchen. Gled. Meth. Fung. p. 134.

*Agaricus quernus*, lamellatus, coriaceus, albus. Dill. Cat. Plant. Gissensf. p. 191.

*Agaricus acaulis*, Gerardi Fl. Gallo-Prov. p. 20.

In arboribus et variis lignis emortuis.

140.

*Agaricus*, sessilis, squamosus, lobatus et villosus, lamellis dissectis. Ein rauher, weißer, gestreifter und schuppenartig wachsender Baum-Schwamm, sonder Stiel, von Gestalt einer Kamm-Muschel. Gl. Meth. Fung. p. 134.

In arborum corticibus et truncis fatiscentibus.

141.

*Agaricus sessilis*, squamosus, laciniatus et villosus. Ein weißer, schuppenartig wachsender, haarichter und zertheilter Baum-Schwamm, sonder Stiel, unterwärts dunkelroth. Gled. Meth. Fung. p. 135.

In syluis umbrosis ad quercus putridas.

ALGAE,



# ALGAE.

## CONFERUA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 965. Gouan. H. R. M. p. 538.*

**C**

142

*Conferua Linnaei Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 21.*

*Conferua filamentis aequalibus, ramosis, bullas aereas includens. Linn. Spec. Pl. p. 1194.*

*Conferua Plinii. Lob. Ic. p. 257.*

*Musculus aquaticus bombycinus, tenuissimis filamentis. Loef. Fl. Bor. p. 173.*

Wasser; Moß von ganz zarten Fädemchen.  
In fossis nach dem Bretter; Krüge zu.

143.

*Conferua filamentis reticulatim coadunatis. Linn. Sp. Pl. p. 1165.*

*Musculus, aquaticus bombycinus retiformis. Subtiler Netzförmiger Wasser; Moß. Loef. Fl. Bor. p. 173.*

In fossis nach dem Bretter; Krüge zu.

144.

*Conferua filamentis simplicibus, aequalibus, longissimis. Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 23.*

*Musculus marinus capillaceus. Langer See; Moß. Loef. Fl. Bor. p. 172.*

In littore maris crescit.

## TREMELLA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 1090. Gouan H. R. M. p. 535.*

145.

*Tremella, plicata, undulata. Linnaei. Ger. Fl. Gall-Pr. p. 24.*

*Musculus fugax membranaceus. Magnoli.*

*Nostoc Paracelsi. Act. Par.*

*Nostoc ciniflonum. Toura. Inst. p.*

*Nostoc luteum mesenterii forma Vaill. Bot. Par. Tab. IV. videlicet Mappi H. Pl. Alf. p. 177.*

C 2

Lichen

Lichen gelatinosus fugax major. Rupp. Fl. Jen. 299.

Stern: Schneuke. Borussis.

Oritur in pratis siccioribus post pluuias autumnales.

146.

Tremella subrotunda, sipoosa, difformis, gelatinosa. Linn.  
Sp. Pl. p.

Tremella fluuiatilis, gelatinosa et uterculosa. Dillen, musc.  
p. 54.

Ad riuulorum margines, ut et in pratis siccioribus, etiam in  
lignis putridis.

147.

Tremella unctuosa, buryri colore et figura.

Fungus non vescus XXX. Flos arborum, fungo affinis.

Zauber: Butter. Loef. Fl. Bor. p. 96.

Crescit ex putrido ligno, abietino inprimis, tam in syluis,  
quam ad domicilia ex ligno fabrefacto abietum.

148.

Tremella sessilis, membranacea, auriformis, cinerea. Linn.  
Sp. Pl. p.

Eluela sessilis, membranacea, rugosa et crispa, in formam  
gyrosam et concavam, varie complicata. Judas:

Schwamm. Ohren: Schwamm. Hollunder: Schwamm.

Gled. Meth. Fung. p. 39.

Fungus non vescus. XIV. Flederschchen. Loef. Fl. Bor. p. 21.

## FUCUS.

Linn. Gen. Pl. nr. 963. Gouan H. R. M. p. 536.

149.

Fucus fronde dichotoma, integra, caule medium folium  
transcurrente, vesiculis verrucosis, terminalibus. Lin-  
naei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 25.

Quercus marina. Meer: oder See: Eich mit Blasen. Loef.  
Fl. Bor. p. 216.

Fucus maritimus, vel Quercus maritima, vesiculas habens.  
C. B. P. p. 365.

Fucus, Tourn. Inst. p. 566. Boerhaave Ind. alt. Pl. p. 9.

150.

150.

*Fucus marinus polyschides.* Rundblattriges und in der  
Spiz zweispaltiges Meer: Graß. Loef. Fl. Bor. p. 77.  
Circa littora maris passim.

LICHEN.

Imbricati.

*Linn. Gen. Plant. n. 958. Gouan H. R. M. p. 533.*

151.

*Lichen imbricatus*, foliolis sinuatis, scabris, lacumosis, scu-  
tellis folio concoloribus. Linn. Sp. Pl. p. 1142.

*Lichen opere phrygio ornatus.* Vaill. Bot. P. Tab. 23. F. 5.  
Arborum truncis et faxis ubique adhaeret.

152.

*Lichen imbricatus*, foliolis multifidis, glabris, obtusis, inca-  
nis, punctis vagis, emineptibus. Linnaei, Ger. Fl. Gallo-  
Prov. p. 27.

*Lichen nigricans omphalodes.* Vaill. B. P. Tab. 20. F. 10.  
In faxis.

153.

*Lichen imbricatus*, foliolis lobatis, nitidis, liuidis. Lin-  
naei. Ger. Fl. Gallo - Prov. p. 27.

*Lichen crustae modo arboribus adnascens, oliuaceus.* Vaill.  
Bot. Par. Tab. 20. Fig 8.

Habitat in faxis et arboribus.

154.

*Lichen imbricatus*, laciniis obtusis, sub inflatis. Linnaei,  
Spec. Pl. p. 1144.

*Lichen crustae modo arboribus adnascens, tenuiter diuifus.*  
Tourn. Inst. p. 548. Buxb. Cent. III. Tab. 14. Fig. 1.  
Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 48. nr. 248.

155.

*Lichen imbricatus*, foliolis oblongis, angustis, cinereis,  
scutellis pullis. Linnaei, Ger. Fl. Gallo-Pr. p. 28.

*Muscus pulmonarius*, corpusculis fuscis papillatus. Loef.  
Fl. Bor. p. 172.



## Foliacei.

156.

Lichen foliaceus, erecti usculus, laciniis linearibus, ciliatis, scutellis pedunculatis, crenatis. Linnaei. Ger. Fl. Gallo-  
Prov. p. 28.

Lichen cinereus, latifolius aculeatus, umbilicis nigrican-  
tibus. Tourn. Inst. p. 549.

Lichen cinereus, arboreus, marginibus pilosis, major. Vaill.  
Bot. Par. Tab. 20. Fig 4.

Muscus arboreus, pyxioides pilosus. Loef. Fl. Bor. p. 271.  
In quercubus.

157.

Lichen foliaceus, laciniatus, obtusus, glaber, supra lacu-  
nosus. Linnaei Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 29.

Muscus pulmonarius. C.B.P. p. 361. Loef. Fl. B. p. 172.

Pulmonaria. Tab.L. II. p. 259. Fuchf. H. p. 631. Dod.  
Pempt. p. 474.

Lungen-Kraut. Tabern. Eichen-Lungen-Kraut.  
Passim in sylvis.

158.

Lichen foliaceus, erectus, compressus, ramosus, farinace-  
us, lateribus verrucosis. Linn. Ger. Fl. Gall. Bor. p. 29.

Lichen cinereus, ramosus, verrucosus. Vaill. Bot. P. T.  
20. Fig. 13. 14. 15.

In truncis arborum opacarum sylvarum.

159.

Lichen foliaceus, erectus, linearis, ramosus, lacunosus, con-  
vexus, mucronatus. Linn. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 30.

Lichen cinereus, latifolius, ramosus. Tourn. Inst. p. 550.  
Vaill. Bot. Par. Tab. 20. Fig. 6.

Ad arborum truncos.

160.

Lichen foliaceus, erectus, oblongus, lanceolatus, sublaci-  
niatus, lacunosus, glaber, scutellis subpectunculatis.  
Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 30.

Lichen

*Lichen pulmonarius*, cinereus, mollior, in amplas lacini-  
as diuisus. Tourn. Inst. p. 325.

Ad truncos arborum.

161.

*Lichen foliaceus repens*, lobatus, peltis marginalibus posticis. Linn. Spec. Pl. p. 1148.

*Lichenoides fuscum*, peltis posticis, ferrugineis Dillenii.  
Oritur in arboribus vetustis.

162.

*Lichen foliaceus*, repens, lobatus, obtusus, planus, sub-  
tus venosus, villosus, pelta marginali adscendente. Lin-  
naei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 31.

*Lichen pulmonarius*, saxatilis, digitatus. Vaill. Bot. Par.  
Tab. 21. Fig. 16.

*Lichen pulmonarius saxatilis*, rufescens, superne planus, in-  
ferne reticulatus. Tourn. Inst. p. 549.

*Lichenoides peltatum*, terrestre cinereum, majus, foliis di-  
uisis. Dill. Fl. Giff. p. 208.

In fyluis, muscosis, et aucerosis.

163.

*Lichen foliaceus*, umbilicatus, undique laevis. Linn. Ger.  
Fl. Gallo-Prov. p. 32.

*Lichen pulmonarius*, saxatilis, e cinereo fuscus, mini-  
mus. Tourn. Inst. p. 549. Vaill. Bot. Par. Tab. 21.  
Fig. 14.

## Scyphiferi.

164.

*Lichen scyphifer*, integer, stipite cylindrico, tuberculis  
coccineis. Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 32.

*Lichen pyxidatus*, oris coccineis et tumentibus. Vaill. Bot.  
Par. Tab. 21. Fig. 4. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 42. nr. 245.  
Oritur in sterilibus, muscosis, arenoso solo.

165.

*Lichen scyphifer*, simplex, crenulatus, tuberculis fuscis.  
Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 32.

C 4

Lichen

*Lichen pyxidatus major.* Tourn. Inst. p. 549. Tab. 325.  
Vaill. Bot. Par. Tab. 21. Fig. 8.

*Musculus pyxioides terrestris.* C. B. P. p. 361. Loef. Fl. B.  
p. 171.

In sterilibus.

166.

*Lichen scyphifer simplex, denticulatus, stipite cylindrico.*  
Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 22.

*Lichen pyxidatus saxatilis.* C. B. P. p. 371. Ej. Prodr. Th.  
Bot. Büchsenformiger Stein-Moß. Loef. Fl. B. p. 468.

Vaill. Bot. Par. Tab. 21. Fig. 6.

In saxis et apricosis passim.

167.

*Lichen pyxidatus, corniculis aduncis.* Tourn. Inst. p. 549.  
Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 42. nr. 241.

168.

*Lichen pyxidatus prolifer.* Tourn. Inst. p. 549.

Vaill. Bot. Par. Tab. 21. Fig. 5.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 42. nr. 242.

169.

*Lichen pyxidatus damae cornu diuisura, acetabulorum  
oris crispis.* Tourn. Inst. p. 243.

Vaill. Bot. Par. Tab. 21. Fig. 2. Helw. Suppl. Fl. B. p. 42.  
nr. 243.

### Fruticulosi.

170.

*Lichen fruticulosus, perforatus, ramosissimus, ramulis  
nutantibus.* Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 33.

*Coralloides corniculis candidissimis.* Tourn. Inst. p. 565.

*Musculus coralloides, siue cornutus montanus.* C. B. P. p. 361.

Gerader Corallen Moß mit röthlichten Hörnern. Loef. Fl.  
Bor. p. 17.

In locis aridioribus, inter ericeta passim.

171.

*Lichen fruticulosus, sub-dichotomus, ramis simplicibus,  
subularis.* Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 34.

Musculus

*Muscus corniculatus.* Tab. I. p.

*Muscus terrestris Coralloides, erectus incanus.* C. B. Prodr.

Th. Bot. p. 152.

*Gerader grauer Corallen-Moß.* Loef. Fl. Bor. p. 171.

172.

*Lichen fruticulosus, solidus, tectus foliolis crustaceis.*

Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 34.

*Muscus cupressi-formis ramosus.* Loef. Fl. Bor. p. 168.

*Nestiger Enpressen-Moß.* Ejusd.

Ben dem Löbenichtschen Walde.

## Filamentosi.

173.

*Lichen filamentosus, pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis.* Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 35.

*Muscus arboreus, usnea Officinarum.* C. B. P. p. 361.

Loefel. Fl. Bor. p. 171.

In sylvis passim obuius.

174.

*Lichen filamentosus, pendulus, subarticulatus, ramis pendentibus.* Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 35.

*Muscus capillaceus longissimus.* C. B. P. p. 361.

*Sehr langer aschfarber Baum-Moß.*

In sylvis passim. Longitudinem duarum ulnarum excedit.

175.

*Lichen filamentosus, ramosus, erectus, scutellis radiatis.*

Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 35.

*Muscus arboreus cum orbiculis.* C. B. P. p. 361.

*Muscus arboreus floridus.* Tab. L. II. p. 487.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 43. nr. 250.

Ad arbores in sylvis.

176.

*Lichen filamentosus, articulatus, ramulis tenuissimis, punctatis.* Linnaei. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 36.

*Muscus arboreus nodosus.* C. B. P. p. 361.

In sylvis.

C 5

177.

177.

Lichen leprosus, candidus, tuberculis incarnatis. Linnæi.

Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 36.

Lichen terrestris ericetorum, basi muscosa, capitibus fungoidibus, carnei coloris. Rupp. Fl. Jen. p. 350.

Lichenioides fungi forme, crusta leprosa, candida, capitulis et pediculis incarnata. Dill. Fl. Giss. p. 205.

Fungilli incarnati coloris, minuti, musco insidentes. Menzel. Pug. Rar. Tab. VI.

In ericetis humidis,

### RIC CIA.

Linn. Gen. Pl. nr. 759.

178.

Riccia frondibus, superficie papillofis. Linn. Sp. Pl. p. 1138.

Hepatica palustris lobis cristatis. Vaill. Bot. Par. T. 19. F. 2.

In inundatis et Exsiccatis. Viget præcipue hyeme. Vid. a

Leyseri Fl. Hall. p. 205.

### MARCHANTIA.

Linn. Gen. Pl. nr. 954. Gouan. H. R. M. p. 332.

179.

Marchantia calyce communi subdecem fido. Linnæi. Ger.

Fl. Gallo-Prov. p. 37.

Lichen petraeus, siue hepatica fontana. C. B. P. p. 361.

Lichen. Fuchf. Hist. p. 476.

Stein-Leber-Kraut. Moß-Flechten. Loef. Fl. Bor. p. 140.

180.

Marchantia calyce communi octo-partito, laciniis è plano conuexis. Linnæi. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 38.

Lichen petraeus umbellatus. C. B. P. p. 362.

Hepatica 3. Tab. L. II. p. 492.

Leber-Kraut mit runden, breiten Köpfchen. Helw. Suppl.

Fl. Bor. p. 41. nr. 239.

181.

Marchantia calyce communi quadripartito, laciniis tubulosis. Linnæi. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 38.

Lichen

Lichen petraeus, muscosus, ramosus. C. B. P. p. 362.  
 Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 42. nr. 249. Boerh. Ind. II, Pl.  
 p. 17.

Oritur in humidis et fossis.

182.

Marchantia siue

Lichen petraeus stellatus. C. B. P. p. 362.

Gestirnt Leber: Kraut. Suppl. Fl. Bor. p. 41. nr. 238.

Hepatica. 2da. Tab. L. 2. p.

## I U N G E R M A N N I A.

Linn. Gen. Pl. p. 955.

183.

Iungermannia frondibus pinnatis, foliolis ouatis, subciliatis. Linn. Sp. Pl. p. 1131.

Hepaticoides polytrichi facie. Vaill. Bot. Par. Tab. 19. F. 17.

Muscus nummulariae foliis, dense positus. Tourn. Inst.

p. 555.

Hepaticoides polytrichi facie. Vaill. Bot. Par. Tab. 19. F. 7.

Muscus bifolius procumbens foliis subrotundis. Loef. Fl.

Bor. p. 167.

Im Lebenichtschen Walde.

184.

Iungermannia frondibus simpliciter pinnatis, foliolis subulatis. Linn. Sp. Pl. p. 1131. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 40.  
 nro. 3.

In sylvis umbrosis, muscosis.

185.

Iungermannia frondibus pinnatis, lanceolatis, apice floriferis, foliolis integris. Linn. Sp. Pl. p. 1131.

In saxis, cauernulis, umbrosis, aqua irrigatis.

186.

Iungermannia frondibus simpliciter pinnatis, apice floriferis, foliolis bidentatis. Linn. Sp. Pl. p. 1132.

Hepaticoides polytrichi facie, foliis bifidis, major. Vaill. Bot. Par. Tab. XIX. nr. 8.

Muscus

*Muscus pennatus*, foliis subrotundis, bifidis major. Tourn. Inst. p. 555.

Ad radices arborum, et in fossis humidis.

187.

*Iungermannia* frondibus supra bipinnatis, apice floriferis, foliolis subrotundis, integris. Linn. Spec. Pl. p. 1131.

*Hepatica saxatilis*, undulata, seminifera. Vaill. Bot. Par. Tab. 19. Fig. 6.

In sterilibus glareosis.

188.

*Iungermannia* frondibus supra bipinnatis, apice floriferis, foliolis linearibus, recurvatis. Linn. Sp. Pl. p. 1133.

*Hepaticoides albescens*, foliis pinnatis. Vaill. Bot. Par. Tab. XIX. nr. 5.

*Muscus nummulariae* folio, fructu, pediculo carente. Tourn. Inst. p. 555.

In sylvis muscosis.

189.

*Iungermannia* frondibus subtus bipinnatis, foliolis quadratis, obsolete trilobis. Linn. Sp. Pl. p. 1133.

In sylvis umbrosis, ericetis.

190.

*Iungermannia*, furculis repentibus, foliis inferne auriculatis, duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. Linn. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 42.

*Hepaticoides* furculis et foliis, thylae instar compressis, minor. Vaill. Bot. Par. Tab. XIX. Fig. 10.

*Muscus saxatilis*, nummulariae folio minor. Tourn. Inst. p. 555.

In caudicibus arborum.

191.

*Iungermannia* furculis procumbentibus, subtus imbricatis foliolis cordatis, acutis. Linn. Sp. Pl. p. 1134.

*Muscus subrotundus*, foliis densissimis, squamosus. Tourn. Inst. p. 554.

Hepati-

*Hepaticoides furculis et foliolis thyaë instar compressis.*

Vaill. Bot. Bar. Tab. XIX. Fig. 9.

Oritur in sylvis ad arborum caudices.

192.

*Iungermannia acaulis, foliolo frondi innato.* Linn. Ger.

Fl. Gallo-Prov. p. 44.

*Lichen petraeus caliculo calceato.* C. B. P. p. 362.

193.

*Iungermannia, acaulis, fronde lineari-ramosa, extremitatibus furcatis, obtusiusculis.* Linn. Ger. Fl. Gallo-Prov.

p. 44.

*Hepatica arborea glandulifera.* Vaill. Bot. Par. T. 23. F. 11.

In arborum caudicibus, sylvis et muscosis.

## CHARA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 962. Göttan. H. R. M. p. 335.*

194.

*Chara caulibus laevibus, frondibus interne dentatis.* Linn.

Sp. pl. p. 1156.

*Equisetum foetidum sub aqua repens.* C. B. P. p. 16.

Ej. Prodr. Th. Bot. p. 25. Vaill. Bot. Par. Tab. III. Fig. 1.

Stinkend Schaafstey, so unter dem Wasser kreucht. Loef.

Fl. Bor. p. 66.

Wey Osterrode in fundo lacus Schilling.

195.

*Chara caulibus asperis, siue*

*Equisetum granulofum, sub aquis repens.* Helw. Suppl.

Fl. Bor. p. 31.

Ej. Fl. Quasimod. p. 31. nr. 89.

An der Angerburgschen See, an der Uebersahrt in fundo.

## EQUISETUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 937. Göttan. H. R. M. p. 322.*

196.

*Equisetum caule spicato, frondibus compositis.* Linn. Sp.

Pl. p. 1061.

Equiset-



*Equisetum tenuissimis fetis.* C. B. P. p. 16. T. Inst. p. 533.

*Equisetum sylvaticum.* Tab. I. I. p. 551.

Klein Schaafstreu oder Ragen; Schwanz. L. Fl. B. p. 65.  
In locis umbrosis.

197.

*Equisetum caule angulato, frondibus simplicibus.* Linnaei.  
Spec. Plant. p. 1061.

*Equisetum palustre breuioribus fetis.* C. B. P. p. 16. Tourn.  
Inst. p. 553. C. B. Th. Bot. Prodr. p. 24.

Vielsaamichter Wasser; Röß Schwanz mit kleinen Blättern  
Thannen; Wedel. Loef. Fl. Bor. p. 75.

In locis uliginosis Bey der Altstadtischen Klapper; Wiese.

198.

*Equisetum caule striato, frondibus sub-simplicibus.* Linn.  
Sp. Pl. p. 1061.

*Equisetum palustre longioribus fetis.* C. B. P. p. 15. Ej.  
Prodr. Th. Bot. Tourn. Inst. p. 533.

Wasser; Röß; Schwanz mit sehr dünnen langen Blättern.  
Loef. Fl. Bor. p. 65.

In palustribus bey Königsberg.

199.

*Equisetum scapo fructificante nudo, sterili frondoso.*  
Linn. Sp. Pl. p. 1061.

*Equisetum aruense longioribus fetis.* C. B. P. p. 16.

*Equisetum minus* Fuchs. Hist. p. 323.

Röß; oder Ragen; Schwanz mit langen Blättern. Helw.  
Suppl. Fl. Bor. p. 20.

In agris argillosis.

200.

*Equisetum radice glandifera, siue*

*Equisetum aruense, Glandiferum.* Helw. Fl. Quasim. p. 31.

nr. 88. Erbmisse. Ej.

In agris arenosis.

201.

*Equisetum caule nudo, scabro, basi sub-ramoso.* Linnaei.  
Spec. Pl. p. 1062.

Equis-

*Equisetum foliis nudum ramosum.* C. B. P. p. 16.

*Equisetum* 3. Matth. deutsch. p. 441.

*Equisetum nudum minus variegatum* Basiliense. C. B. Pr. p. 25.

*Equisetum* Cam. Epit. p. 770.

*Viel ästiger Ragen; Jagel ohne Blätter.* Heermos. Loef. Fl. Bor. p. 66.

In pratis humidis, torffosis.

202.

*Equisetum foliis tractu aetatis nudum.* Loef. Fl. B. p. 159.

*Equisetum foliis nudum, non ramosum siue junceum,*  
*ἑπὶ πρὸς ἄφυλλος.* C. B. P. p. 16.

*Hippuris major.* Tragi Seb. in Trag. p. 458.

*Schaaſtheu ohne Blätter.* Drunkelſalm ruſticis.

In locis paluſtribus bey Königsberg paſſim.

203.

*Equisetum caule nudo, scabro, basi subramoso.* Linnæi. Sp. pl. p. 1062.

*Equisetum nudum, majus, variegatum,* Basiliense. C. B. P. p. 16. Tourn. Inst. p. 533.

*Equisetum.* Cam. Epit. p. 770. Wulff. Spec. Inaug. p. 13.

*Schachtel; Salm* Scrinariis nostris.

Solo crescit arenoso Bey Worienen im Ottenhagenschen Kirchen; Spiele, abundanter.

## VISCUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 895. Gouan. H. R. M. p. 502.*

204.

*Viscum foliis lanceolatis, obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus.* Linn. Sp. Pl. p. 1023.

*Viscum baccis albis.* C. B. P. p. 423.

*Viscum* Kyp. in Trag. p. 949.

*Wispel.* Loef. Fl. Bor. p. 287.

## MUSCL



## M U S C I.

## HYPNUM.

*Linn. Gen. Plant. nro. 950.*

**H**ypnum furculis ramosissimis, ramis subulatis, utrimque attenuatis, teretibus. Linn. Sp. Pl. p. 1130.  
 Muscus squamosus minor, myosuroides, capsulis incurvis.  
 Vaill. Bot. Par. Tab. XXVII. Fig. 6.  
 In sylvis, arborumque truncis.

206.

Hypnum furculo repente, ramis confertis, erectis, foliis subulatis, antheris subnutantibus. Linn. Sp. Pl. p. 1129.  
 Muscus ramosus, squamosus, tenuior, capitulis incurvis.  
 Vaill. Bot. Par. Tab. XXVI. Fig. 9. Tourn. Inst. p. 553.  
 Muscus terrestris minor, omnium vulgarissimus. Buxb. Cent. IV. Tab. LXII. Fig. 3.  
 Muscus terrestris vulgaris, minor, adianthi aurei capitulis  
 Raji. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 48.  
 In sylvis, herbidis, caudicibus arborum.

207.

Hypnum furculo repente, ramis confertis, erectis, foliis subulatis, antheris erectis. Linn. Sp. Pl. p. 1129.  
 Muscus capillaceus ramosus, minor, capitulo angustissimo.  
 Tourn. Inst. p. 552.  
 Muscus arboreus, splendens, sericeus. Vaill. Bot. Par. Tab. 27. Fig. 3.  
 Ad truncos arborum, muros, in campis ficcioribus.

208.

Hypnum furculis, ramisque vagis, teretibus, erectiusculis, obtusis. Linn. Sp. Pl. p. 1129.  
 Muscus terrestris, furculis kali, aut illecebrae aemulis, foliis subrotundis, squamatim incumbentibus. Vaill. Bot. Par. Tab. XXV. Fig. 7.  
 In locis herbosis, humidis.

209.

*Hypnum furculis pinnatis-sparsis, subulatis, foliis ovatis, obtusis, conniventibus.* Linn. Sp. Pl. p. 1128.

*Muscus squamosus cupressi-formis.* Tourn. Inst. p. 554. Vaill. Bot. Par. Tab. 28. Fig. 3.

In pratis uliginosis.

210.

*Hypnum furculo erecto, ramis fasciculatis, terminalibus, subdivisis, antheris subnutantibus.* Linnaei. Spec. Plan. p. 1128.

*Muscus ramosus repens, veluti spicatus.* C. B. Pr. p. 151.

*Muscus squamosus, alopecuroides, flagellis recurvis.* Vaill. Bot. Par. Tab. 23. Fig. 5.

*Muscus dendroides elatior, radice repente.* Tourn. Inst. p. 554. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 49. nr. 244.

Ad arborum radices.

211.

*Hypnum furculo erecto, ramis fasciculatis, terminalibus, simpliciusculis, antheris erectis.* Linn. Sp. Pl. p. 1128.

*Muscus squamosus ramosus, erectus, alopecuroides.* Tourn. Inst. p. 554. Vaill. Bot. Par. Tab. 26. Fig. 6.

In sylvis ad arborum radices.

212.

*Hypnum furculis reptantibus, ramis vagis, erectis, foliis fecundis, antheris subrotundis.* Linn. Sp. Pl. p. 1127.

*Muscus squamosus major, foliis angustioribus, acutissimis.* Tourn. Inst. p. 553. Vaill. Bot. Par. Tab. 25. Fig. 1.

*Muscus montanus* Tab. 1. p.

*Musco denticulato similis.* C. B. P. p. 360.

*Berg-Moss.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 48. nr. 286.

213.

*Hypnum ramis vagis, foliis ovatis, apice subulatis, undique reflexis.* Linn. Sp. Pl. p. 1127.

*Muscus erectus, foliis reflexis.* Vaill. Bot. Par. Tab. 27. Fig. 5.

In pascuis umbrosis, humidiusculis.

D

214.

214.

*Hypnum furculo subpinnato, foliis secundis recurvis apice subulatis.* Linn. Sp. Pl. p. 1126.

*Muscus squamosus, minor et crispus.* Vaill. Bot. Par. Tab. 27. Fig. 13. Tourn. Inst. p. 553.

In sylvis ad arborum radices.

215.

*Hypnum furculis pinnatis, teretiusculis, remotis, inaequalibus.* Linn. Sp. Pl. p. 1126.

*Muscus pinnatus minor, caulibus ramosis, in summitate veluti spicatus.* Loef. Fl. B. p. 167. V. B. P. T. 27. F. 12.

Gespizter kleiner Feder-Moß mit ästigen Stengelschens.  
Im Lebenichtschen Walde.

216.

*Hypnum furculis pinnatis, ramulis approximatis, apicibus recurvis.* Linn. Sp. Plant. p. 1125.

*Muscus cristam castrensem repraesentans, flavescent, nemorosus, ramosus, castubicus.* Vaill. Bot. P. T. 27. F. 1.

*Muscus pennatus major, caulibus ramosis, in summitate veluti pinnatus.* Gespizter Feder-Moß mit ästigen Stengelschens. Loef. Fl. Bor. p. 167.

Im Lebenichtschen Walde.

217.

*Hypnum furculis plano-pinnatis, continuatis, pedunculis aggregatis.* Linn. Sp. Pl. p. 1125.

*Muscus terrestris minor, foliis crispis.* Buxb. Cent. IV. Tab. 63. Fig. 3.

In pascuis.

218.

*Hypnum furculis plano-pinnatis, continuatis, pedunculis aggregatis.* Linn. Spec. Plant. p. 1125.

*Muscus filicinus major.* Buxb. Cent. II. Tab. I. Fig. 2.  
Oritur in campestribus, sylvis, pascuis.

219.

*Hypnum furculis proliferis, plano-pinnatis, pedunculis aggregatis.* Linn. Sp. Pl. p. 1125.

Muscus

*Muscus filicinus major.* C. B. P. p. 360. T. Inst. p. 556.  
Vaill. Bot. Par. Tab. XXV. Fig. 1.  
In pascuis humidis.

220.

*Hypnum furculis pennatis*, ramulis distantibus, foliolis imbricatis, incurvis, acutis, secundis. Linn. Sp. P. p. 1125.  
*Muscus filicifolius palustris.* Vaill. Bot. Par. Tab. 29. F. 9.  
In humidioribus locis,

221.

*Hypnum ramis vagis*, subrepentibus, foliolis ovatis, mucronatis. Linn. Sp. Pl. p. 1124.  
*Muscus myosuroides*, rutabuli fructu. Vaill. Bot. Par. Tab. 27. Fig. 8.  
*Pedunculi seniles funis instar contorti.* Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 52.  
Ad arborum radices.

222.

*Hypnum ramis vagis*, recurvis, foliis ovatis, recurvatis, patulis. Linn. Sp. Pl. p. 1124.  
*Muscus squamosus major*, siue vulgaris. Tourn. Inst. p. 553. Vaill. Bot. Par. Tab. 28. Fig. 9.  
In sylvis, uliginosisque pratis.

223.

*Hypnum fronde pinnata*, ramosa, erecta, medio pedunculifera. Linn. Sp. Pl. p. 1123.  
*Muscus pennatus omnium minimus.* Tourn. Inst. p. 556.  
*Muscus taxiformis*, ramosus. Vaill. Bot. Par. Tab. 28. Fig. 5.  
*Muscus filicifolius seu pennatus major*, pinnulis plurimis ad mediam costam adnexis. Buxb. Cent. II. Tab. I. Fig. 4.  
In pascuis humidis.

224.

*Hypnum fronde pinnata*, simplici, pinnis duplicatis, basi pedunculifera. Linn. Sp. Pl. p. 1122.  
*Muscus pinnatus*, denticulatus, minor. Vaill. Bot. Par. Tab. 29. Fig. 8.  
Supra terram umbrosam habitat.

D 2

BRYUM.

## BRYUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 440. Gössan. H. R. M. p. 32.*

225.

*Bryum antheris sessilibus, terminalibus, calyptra minima.*  
Linn. Sp. Pl. p. 1115.

*Muscus apocarpus, hyrsutus, saxis adnascens, capitulis obscure rubris.* Vaill. Bot. Par. Tab. 21. Fig. 15.

*In saxis et arboribus.*

226.

*Bryum antheris erectis, obouatis, calyptra subulata, furculis acaulibus, foliis ovatis, muticis.* Linnaei, Spec. Plant. p. 1116.

*Muscus capillaceus minimus, capitulis pyriformibus, turgidis.* Tourn. Inst. p. 553. Vaill. Bot. Par. Tab. 29. Fig. 3.

*Muscus minimus latifolius, capitulis erectis, turgidis.* Buxb. Cent. I. Tab. 64. Fig. 1.

*Muscus capillaceus minimus, capitulo longiore erecto.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 49. nr. 293.

*In pratis humidis.*

227.

*Bryum anthera erecta, oblonga, minori, calyptris laxis, aequalibus.* Linn. Sp. Pl. p. 1116.

*Muscus capillaceus minimus, calyptra longa, conoidea, nitida.* Tourn. Inst. p. 552. Vaill. Bot. Par. Tab. 26. F. 1.

*In campestribus, aggeribus, sepibus.*

228.

*Bryum antheris erectiusculis, foliis piliferis, recurvis.* Linnaei. Spec. Plant. p. 1117.

*Muscus capillaris tectorum, densis cespitibus nascens, oblongis capitibus, foliis in pilum oblongum desinentibus.* Vaill. Bot. Par. Tab. 25. Fig. 3.

*In muris, tectis, montosis.*

229.

*Bryum antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, furculis simplicibus, cespitosus.* Linn. Sp. Pl. p. 1117.

*Muscus*

*Muscus capillaris minor, capitulis erectis, vulgatissimus, non villosus.* Vaill. Bot. Par. Tab. XXV. Fig. 4.

In faxis, tectis, ambulacris, arboribus, fere ubique.

230.

*Bryum antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis recurvatis, caule declinato.* Linn. Sp. Pl. 1117.

*Muscus capillaceus major, pediculo et capitulo, tenuioribus.* Tourn. Inst. p. 551. Vaill. Bot. Par. Tab. 28. F. 12.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 48. nro. 283.

*Muscus capillaceus, foliis pallidis, pediculis pluribus ex communi theca egredientibus.* Buxb. Cent. 2. Tab. 4. Fig. 1.

231.

*Bryum antheris erectiusculis, pedunculis subfolitariis, foliis lanceolatis, carinatis, undulatis, patentibus, ferratis.*

Linn. Spec. Plant. p. 1117.

*Muscus capillaceus, minor, capitulo longiore, falcato.* Tourn. Inst. p. 551.

*Muscus erectus, linariae folio, major.* Vaill. Bot. Par. Tab. XXVI. Fig. 17.

In sylvis et pratis umbrosis.

232.

*Bryum antheris erectiusculis, operculo, arcuato, foliis erectis, imbricatis, furculis ramosis.* L. Sp. P. p. 1118.

*Muscus saxatilis ericoides.* C. B. P. p. 362. Ej. Prodr. p. 151.

*Muscus erectus capillaceus, densissimus, glauco folio.* Vaill. Bot. Par. Tab. XXVI. Fig. 13.

*Muscus capillaceus, sericeus, coridis facie.* T. Inst. p. 552.

In montosis et arborum radicibus.

233.

*Bryum antheris erectis, foliis setaceis, secundis.* Linnæi. Spec. Plant. p. 1118.

*Muscus capillaceus minimus, plumosus, elegans.* Tourn. Inst. p. 552.

*Muscus capillaceus, foliis unam partem spectantibus.* Vaill. Bot. Par. Tab. XXVII. Fig. 7.

In ericetis, juniperitis.

D 3

234.



234.

*Bryum antheris erectis, subrotundis, operculo mucronato.*

Linn. Spec. Plant. p. 1119.

*Muscus capillaceus omnium minimus.* Tourn. Inst. p.

Vaill. Bot. Par. Tab. XXVI. Fig. 2.

*Muscus stellaris minimus, pediculo breuissimo, capitulis turgidis.* Buxb. Cent. II. Tab. II. Fig. 2.

Habitat ad agros, fossas, sepes.

235.

*Bryum antheris pendulis, foliis lanceolatis, acuminato-setaceis, pedunculis longissimis.* Linn. Sp. Pl. p. 1121.

*Muscus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo.* Tourn. Inst. p. 552. Vaill. B. P. T. 29. F. 7.

Oritur in muris, apricis, tectis, glareosis.

236.

*Bryum antheris pendulis, foliis ouatis, setiferis, carinatis, pedunculis longissimis.* Linn. Sp. Pl. p. 1121.

*Muscus capillaceus major, capitulis crassioribus, cylindraceis, nutantibus.* Tourn. Inst. p. 551.

Vaill. Bot. Par. Tab. XXIV. Fig. 6.

In rupibus et muris.

## MNIUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 1030. Gouan. H. R. M. p. 532.*

237.

*Mnium caule simplici, inflexo.* Linn. Sp. Pl. p. 1110.

*Muscus capillaceus, tenuissimus, pediculo longissimo, purpurascens, capitulo rotundiore.* Tourn. Inst. p. 551.

Vaill. Bot. Par. Tab. XXIV. Fig. 10.

*Muscus parvus stellaris.* C. B. P. p. 361.

Ad fontes, paludosos, frigidos.

238.

*Mnium caule ramoso, androgynum.* Linn. Sp. Pl. p. 1116.

*Muscus capillaceus minimus, capitulo minimo, puluerulento.* Tourn. Inst. p. 552. Vaill. Bot. Par. Tab. 29. F. 6.

In umbrosis silvis.

239.

239.

*Mnium antheris pendulis*, pedunculo curvato, furculo simplici, foliolis margine scabris. Linn. Sp. Pl. p. 1112.

*Muscus capillaceus major*, stellatus. Tourn. Inst. p. 551. Vaill. Bot. Paris. Tab. XXIV. Fig. 4. 5.

*Muscus capillaris*, floribus in apice coccineis, expansis. Boerh. Ind. alt Hort. Lugd. Bat p. 21.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 48 nr. 282.

In sylvis, aggeribus umbrosis.

240.

*Mnium calyptra villosa*. Linn. Spec. Pl. p. 1112.

*Muscus capillaceus minor*, calyptra tomentosa. Vaill. Bot. Par. Tab. XXVI. Fig. 15.

In ericetis sub udis.

## POLYTRICHUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 498. Gouan, H. R. M. p. 32.

241.

*Polytrichum aureum minus*. C. B. P. p. 356.

*Adiantum aureum minus*. Tab. l. 2. p. 476.

Wiedertodt. Göllden Wiedertodt. Jungfrau Haar. Loef. Fl. Bor. p. 6.

In locis muscosis.

242.

*Polytrichum caule simplici*, anthera parallelepida. Linn. Spec. Plant. p. 1109.

*Polytrichum aureum majus*. C. B. P. p. 356.

Groß Göllden Wiedertodt. Helw. Fl. Quasim. p. 23.

*Muscus juniperifolius*, capitulo quadrangulo. Vaill. Bot. Par. Tab. XXIII. Fig. 8.

In muscosis.

## FONTINALIS.

Linn. Gen. Pl. nr. 952. Gouan, H. R. M. p. 30.

243.

*Fontinalis foliis complicato-carinatis*, trifariis, acutis, antheris lateralibus. Linn. Spec. Plant. p. 1107.

D 4

Muscus

*Muscus aquaticus, terrestri vulgari similis, major.* Buxb.  
Cent. III. Tab. LXIX. Fig. 2.

*Muscus aquaticus denticulatus.* Loef. Fl. Bor. p. 173.  
Zu Bladau im kleinen Bächchen nach Neuhausen zu.

## SPHAGNUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 951. Gössan. H. R. M. p. 530.*

244.

*Sphagnum ramis deflexis.* Linn. Sp. Pl. p. 1106.

*Muscus squamosus, palustris, candicans, mollissimus.*

Tourn. Inst. p. 554.

*Muscus palustris, in ericetis nascens.* Vaill. Bot. Par. Tab.  
XXIII. Fig. 3.

*Muscus palustris.* Dod. Pempt. p. 472.

*Muscus vulgarissimus.* C. B. P. p. 360.

Gemein Erd-Moß, Loef. Fl. Bor. p. 450.

Im Gebrüch bey Lauten-Mühle.

## LYCOPODIUM.

*Linn. Gen. Plant. nr. 953. Gössan. H. R. M. p. 530.*

245.

*Lycopodium foliis bifariis, superciliaribus, imbricatis, furculis repentibus, floribus sparsis.* Linn. Sp. Pl. p. 1106.

*Muscus denticulatus minor.* C. B. P. p. 360. T. Inst. p. 488.

*Muscus terrestris Lusitanicus.* Clus. H. Rar. p. 249.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 89. nr. 288.

246.

*Lycopodium foliis bifariis, patulis, superficialibus, distinctis, spici geminis, pedunculatis.* Linn. Sp. Pl. p. 1104.

*Muscus denticulatus, major, pulcher, parvus, repens.*

Tourn. Inst. p. 556.

*Muscus denticulatus major.* C. B. P. p. 360.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 48. nr. 287.

247.

*Lycopodium foliis sparsis, octifariis, caule dichotomo, erecto, fastigiato, floribus sparsis.* Linn. Sp. Pl. p. 1102.

*Muscus*

*Muscus erectus, sature viridis.* C. B. P. p. 360.

Selago 3. Thal. p. 1116.

Mörschau. Loef. Fl. Bor. p. 169.

In der Fischhausischen Heide.

248.

*Lycopodium foliis sparsis, ligamentosis, spicis teretibus, pedunculatis, geminis.* Linn. Sp. Pl. p. 1101.

*Muscus terrestris clauatus.* C. B. P. p. 360.

*Lycopodium.* Tab. l. 2. p. 487.

Beer: Lap. Loef. Fl. Bor. p. 169.

In sylvis copiose.

249.

*Lycopodium foliis bifariis, connatis, superficialibus, solitariis, spicis geminis, pedunculatis.* Linnaei. Spec. Paln. p. 1104.

*Muscus clauatus foliis cupressi.* C. B. P. p. 361.

*Sauina sylvestris Tragi* Seb. in Trag. p. 441.

*Chamaecyparissus.* Tab. l. III. p. 40.

Wilder Sadebaum. Loef. Fl. Bor. p. 170.

Hinter der grossen Glas-Hütte im Scapen, in ericetis.



## FILICES.

### OPHIOGLOSSUM.

*Linn. Gen. Pl. nro. 939. Goëan. H. R. M. p. 323.*

250.

*Ophioglossum fronde ouata.* Linn. Sp. Pl. p. 1062.

*Ophioglossum vulgare.* C. B. P. p. 354. Tourn. Inst. p. 548.

*Ophioglossum Matth. Bauh. in Matth. p. 447.*

Matter: Zunglein. Loef. Fl. Bor. p. 179.

Im Dollkheimischen Rossgarten in muscosis.

251.

*Ophioglossum minus, subrotundo folio.* C. B. P. p. 150.

D 5

Kleine

Kleine Matterzung. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 50. nr. 501.  
Im Grabnickſchen Kirchſpiele in muſcoſis.

## OSMUNDA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 938. Göſſen. H. R. M. p. 523.*

252.

*Osmunda fronde pinnata, caulina, pinnis lunulatis. Linnæi. Spec. Plan. p. 1064.*

*Osmunda foliis lunatis. Tourn. Inſt. p. 547.*

*Lunaria racemosa minor vel vulgaris. C. B. P. p. 354.*

*Ruta Lunaria. Tab. I.*

Mohnraut Traut Babichen ſieh mich an. Loef. Fl. B. p. 146.

Am Laurschen Teich in collibus herbosis nach Bladau ju.

253.

*Osmunda latis crenis incisa. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 52.*

*Lunaria racemosa minor, Adianthi folio, Breynii Cent. p. 183 Tab. 93.*

Sehr zerkerbte Mohnraute. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 25.

Im Angerburgſchen Schloß: Garten.

254.

*Osmunda foliis lunatis ramosa. C. B. P. p. 355.*

*Osmunda foliis lunatis-ramosa. Tourn. Inſt. p. 547.*

*Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 52.*

*Lunariae rarior Species. Cam. Epit. p. 644.*

## PTERIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 940. Göſſen H. R. M. p. 525.*

255.

*Pteris fronde supra decomposita; foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis, superioribus minoribus.*

*Linn. Spec. Pl. p. 357.*

*Filix ramosa major, pinnulis obtusis, non dentatis. C. B. P. p. 357.*

*Filix foemina. Matth. deutsch. p. 539.*

*Filix foemina Fuchſ. p. 569.*

Garten: Kraut, Weiblein. Loef. Fl. Bor. p. 74.

Crescit in der Hollengrund.

256.

256.

*Pteris minor* feu

*Filix ramosa minor* pinnulis dentatis. C. B. P. p. 358.

*Filicula petraea* foemina. IV. Tab. I. 2. p. 475.

Klein Farren; Kraut, Weiblein. Loef. Fl. Bor. p. 74.

Im Neuhausschen Schloß; Graben in saxis musco oblitis.

257.

*Pteris* feu

*Filix saxatilis*, foliis non serratis. C. B. P. Th. Bot. p. 358.

*Filicula petraea* foemina III. Klein Stein; Farn; Weiblein.

Tab. I. II. p. 475.

Wulff. Spec. Inaug. p. 14.

Crescit in sylua prope Löwenhagen in locis aridioribus.

POLIPODIUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 945. Geïan. H. R. M. p. 525.

258.

*Polypodium frondibus* pinnatifidis, pinnis oblongis, subferratis, obtusis, radice squamata. Linn. Sp. Pl. p. 1085.

*Polypodium vulgare*. C. B. P. p. 359.

*Polypodium majus*. Dod. Pempt. p. 464.

Engelsiſſ. Loef. Fl. Bor. p. 204.

In syluis passim.

259.

*Polypodium fronde* bipinnata, pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. Linn. Sp. Pl. p. 1090.

*Filix non ramosa* dentata. C. B. Pr. p. 73. T. Inst. p. 536.

*Filix mas*. Matth. deutsch. p. 539. Dod. Pempt. p. 462.

Fuchf. Hist. p. 595. Wald; Farn, Männlein. Loef. Fl. Bor. p. 73.

In umbrosis in der Hollengrund.

260.

*Polypodium fronde* bipinnata, siue

*Filix palustris* maxima. Loef. Fl. Bor. p. 74.

*Filix palustris* maxima dentata. C. B. Prodr. p. 156.

Wächst im Lebenichtſchen Walde im Eren; Bruch.

261.

261.

*Polypodium fronde bipinnata, siue**Filix angiosperma. Wulff. Spec. Inaug. p. 13.*

*Haec in omnibus cum priori planta conuenit, excepto cauliculo, ab utraque parte filiquis obsito, in quibus semen castanei coloris, lanugine involutum inuenitur, et nudo oculo spectatum se offert. Videtis Iconem. An Filix florida, siue Osmunda regalis, foliis alternis, surculis seminiferis. Gronouii Virg. p. 123?*

*Ad ripas fluuii, inter Löwenhagen et Friedrichstein.*

262.

*Polypodium fronde supra decomposita. Linnaei.**Filix tenuissime et profunde denticulata. C. B. P.**Farn-Kraut mit tief und fein eingekerbten Zähnen. Helw.**Suppl. Fl. Bor. p. 20. nr.**Im grossen Stadt-Bruch bey Angerburg.*

263.

*Polypodium fronde non ramosa decomposita. Linnaei.**Filix minor non ramosa. I. Bauch.**Filix minor palustris. Ruji.**Ohnästiges kleines Farn-Kraut. Helw. Suppl. Fl. B. p. 20.**Im grossen Stadt-Bruch.*

264.

*Polypodium fronde supra decomposita. Linnaei.**Filix ramosa minor polypodii facie. Tourn. Inst. p. 536.**Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 20.**In der Damerau.*

## FLUVIATILES.

### HIPPURIS.

*Linn. Gen. Plant. nr. 9. Gössan H. R. M. p. 2.*

265.

*Hippuris. Linnaei. Spec. Plant. p. 4.**Equisc.*

*Equisetum palustre*, breuioribus foliis polyspermum. C.

B. P. p. 15.

*Polygonum foemina*. Dod. Pempt. p. 113.

Vielsaamichter Wasser Röß. Schwanz mit kleinen Blättern.

Loef. Fl. Bor. p. 65.

In locis uliginosis Bey der Altstädtischen Klapper-Wiese.

CERATOPHYLLUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 871. Gouan. H. R. M. p. 488.*

266.

*Ceratophyllum*. Linn. Spec. Plant. p. 992.

*Equisetum sub aqua repens*, foliis bifurcis. Loef. F. B. p. 67.

In piscinis passim.

MYRIOPHYLLUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 870. Gouan. H. R. M. p. 488.*

267.

*Myriophyllum floribus masculis interrupte Spicatis*. Linn.

Spec. Plant. p. 992.

*Millefolium aquaticum spicatum*. C. B. P. p. 141. Ej. P. p. 73.

*Potamogeton foliis pinnatis*. Tourn. Inst. p. 166.

Hinter dem Altstädtischen Walle nach der Hollengrund zu.

268.

*Myriophyllum floribus omnibus verticillatis*. Linn. Spec.

Plant. p. 992.

*Myriophyllum aquaticum minus*. Clus. H. l. 6. p. 232.

*Millefolium aquaticum flosculis ad foliorum nodos*. C. B.

P. p. 141. Tourn. Inst. p. 233.

Knottichte Wasser-Garbe mit kleinen weissen Blümlein.

Loef. Fl. Bor. p. 165.

In fossis nach dem Bretter-Krüge zu.

SAGITTARIA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 869. Gouan. H. R. M. p. 488.*

269.

*Sagittaria foliis sagittatis acutis*. Linn. Spec. Plant. p. 993.

*Sagitta aquatica minor latifolia*. C. B. P. p. 194.

Klein



**Klein breitblättiges Pfeil-Kraut.** Loef. Fl. Bor. p. 234.  
In undis stagnantibus passim.

270.

**Sagittaria, seu Sagitta aquatica minor angustifolia.** C. B. P.  
p. 194.

**Klein schmalblättriges spitzig Pfeilkraut.** L. F. B. p. 235.  
Am Pregel hinter dem Bretter-Krüge.

271.

**Sagittaria, seu Sagitta aquatica foliis variis.** L. Fl. B. p. 234.  
Im Pregel passim.

272.

**Sagittaria siue quinta.** Linn. Spec. Plant. p. 993.  
**Gramen bulbosum aquaticum.** C. B. P. p. 2. Ej. Pr. p. 4.  
**Eichel-Graß.** Wulff. Sp. Inaug. p. 15.  
In fluvio Pregelano prope Friedrichstein habitat.

## HOTTONIA.

*Linn. Spec. Pl. nr. 143.*

273.

**Hottonia.** Boerh. Ind. atth. Pl. H. L. p. 1207. Linn. Spec.  
Plant. p. 145.

**Mille folium aquaticum, siue Viola aquatica caule nudo.**  
C. B. Prodr. p. 141.

**Wassergarb oder Wasser-Violen mit nackten Stengeln.**  
Loef. Fl. Bor. p. 166.

In lacunis passim.

\*\*\*\*\*

## GRAMINA.

### ANTHOXANTHUM.

*Linn. Sp. Pl. nr. 35. Goëan. H. R. M., p. 20.*

274.

**Anthoxanthum spica ovato-oblonga, flosculis sub-pedunculatis, arista longioribus.** Linn. Sp. Plant. p. 28.

Gramen

## GRAMINA.

63

Gramen pratense spica flavescente. C. B. P. p. 3.

Gramen montanum odoratum spicatum. Wohlriechendes  
spitziges Berggras. Loef. Fl. Bor. p. 110.

Hinter Frauenburg.

275.

Anthoxanthum sive

Gramen aruense odoratum, spicatum.

Wohlriechendes Kornähriges Acker-Gras. Loef. Fl. Bor.  
p. 110.

In incultis bey Königsberg passim.

## NARDUS.

Göhan, H. R. M. p. 32.

276.

Nardus spica setacea, recta Linn. Spec. Plant. p.

Gramen sparteum juncifolium. C. B. P. p. 5.

Gramen foliaceum minimum, foliis junceis, panicula  
unam partem spectante. Tourn. Inst. p. 517.

Spartum paruum Lob.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 28. nr. 157.

## ALOPECURUS.

Linn. Gen. Pl. nr. 61. Göhan, H. R. M. p. 37.

277.

Alopecurus, culmo spicato, erecto, glumis glabris. Ger.  
Fl. Gallo-Prov. p. 74.

Gramen typhoides spica angustiore. C. B. P. p. 4.

Gramen alopecuroides minus alterum. Lobel.

Kölblein-Gras. Fuchsschwanz-Gras. Loef. F. Bor. p. 113.

Hinter der Haberbergischen Kirche ad margines pratorum.

278.

Alopecurus culmo spicato, infracto. Linnaei, Spec. Plant.  
p. 60.

Gramen aquaticum geniculatum spicatum. C. B. P. p. 3.

Gramen spicatum aquaticum, spica cylindracea, breui.

Tourn. Inst. p. 520.

Gramen

Gramen fluuiatile album. Tab. L. I. p. 530.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 29. nr. 164.

Circa riuulos.

279.

*Alopecurus* siue

Gramen typhoides culmo reclinato. C. B. P. p. 4.

Röfblein Graß mit zurüctretenden Spälmen. L. F. B. p. 113.

In aruis passim.

### PHALARIS.

*Linn. Gen. Pl. nro. 59. Göüan. H. R. M. p. 53. 545.*

280.

*Phalaris panicula cylindriaca spiciformi.* L. Sp. P. p. 55.

Gramen typhoides I. C. B. P. p. 513.

Gramen typhinum I. Tab. L. I. p. 513.

Liesch: Graß. Scharf Röfblein: Graß. Loef. Fl. B. p. 113.

In monte Apollinis bey Quednau.

281.

*Phalaris panicula oblonga, ventricosa.* Linn. Sp. Pl. p. 55.

Gramen paniculatum aquaticum, *Phalaridis femine*, folio variegato. Tourn. Inst. p. 524.

Gramen paniculatum, folio variegato. C. B. P. p. 3.

Spanisch Graß. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 30. nr. 170.

In hortis borussicis vulgare.

282.

*Phalaris panicula sub-ouata, spiciformi, glumiscarinatis.*

Linn. Sp. Pl. p. 54.

Gramen spicatum femine miliaceo albo. Tourn. Inst. p. 518.

*Phalaris femine albo.* C. B. P. p. 28.

*Phalaris.* Dod. Pempt. p. 510.

Canarien: Graß. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 28. nr. 161.

Cultura inquilinum in Borussia factum.

### PHLEUM.

*Linn. Gen. Pl. nro. 60. Göüan. H. R. M. p. 36.*

283.

*Phleum spica cylindriaca, longissima.* Linn. Sp. Pl. p. 59.

Gramen

Gramen typhoides maximum, spica longissima. C. B. P.

p. 4.

Scheuch. Hist. Gram. p. 60.

Grosses langes Rölblein oder Fuchs-Schwanz-Gras. Loef.

Fl. Bor. p. 113.

In aruis saepe reperitur bey Königsberg.

## AGROSTIS.

Linn. Gen. Pl. nr. 6. Gouan H. R. M. p. 39. 546.

## Aristatae.

284.

Agrostis petalo exteriore exserente, aristam rectam, strictam, longissimam. Linn. Sp. Pl. p. 61.

Gramen segetum altissimum, panicula sparsa. C. B. Prodr.

p. 3.

Gramen segetale paniculatum. Tab. l. I. p. 499.

Ufer-Strauß-Gras. Loef. Fl. Bor. p. 111.

Unter dem Getreide.

## Muticae.

285.

Agrostis panicula capillari patente, calycibus subulatis, aequalibus, hispidiusculis, coloratis, flosculis muticis. Rojani. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 82.

Gramen montanum panicula spadicea delicatiore. C. B. P.

p. 3.

Liebtlich Castanien-braunes Gras. Loef. Fl. Bor. p. 111.

In arenosis.

286.

Agrostis panicula ramulis diuarticatis, muticis, culmo repente, calicibus aequalibus. Linn. Sp. Pl. p. 62.

Gramen caninum supinum minus. C. B. P. p. 1.

Gramen supinum caninum 2dum. Tab. l. I. p. 498.

Klein kriechend Hund-Gras. Loef. Fl. Bor. p. 109.

Passim bey Königsberg.

E

MILIVM.

## MILIVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 63. Göüan, H. R. M. p. 38.*

287.

*Milium foliis dispersis. Linn. Sp. Pl. p. 61.*

*Gramen syluaticum panicula miliacea sparsa. C. B. Prodr. p. 8.*

*Gramen miliaceum. Tab. l. 1. p. 500.*

*Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 31. nro. 177.*

## PANICVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 62. Göüan, H. R. M. p. 545.*

288.

*Panicum spicis alternis, conjugatisque, spiculis subdiuisis; glumis aristatis, hispidis. Linn. Sp. Pl. p. 56.*

*Gramen paniceum spica diuisa. C. B. P. p. 8.*

*Panicum vulgare, spica multiplici, asperiuscula. Tourn. Inst. p. 515.*

*Panicum syluestre. Tab. l. 1. p. 610.*

*Fench-Gras. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 53. nr. 314.*

289.

*Panicum spicis aggregatis, basi interiore nodosis, flosculis geminis, muticis, vaginis foliorum punctatis. Linnaei. Sp. Pl. p. 57.*

*Gramen dactylon foliolatiore. C. B. P. p. 8.*

*Ischaemum I. Tab. p. 516.*

*Blut-Gras. Loef. Fl. Bor. p. 109. Tourn. Inst. p. 520.*

*Hinter dem vordersten Krüge in Sarkau. it. zwischen Warscheinen am Forcken-Krüge am Wege.*

290.

*Panicum germanicum, panicula minore flaua. C. B. P. p. 27.*

*Panicum. Dod. Pempt. p. 507.*

*Fench-Gras, oder Fuchschwanz-Gras. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 52. nro. 313.*

*Copiose in hortis seritur, et milii loco adhibetur.*

291.

291.

*Panicum spicis digitatis*, patentibus, siue  
*Gramen paniceum spica simplici*. C. B. P. p. 8.  
 Hirsegras mit schlechten Aehren. Loef. Fl. Bor. p. 120.  
 In der Hollengrund.

292.

*Panicum siue*  
*Gramen paniceum spica aristis longis armata*. C. B. P. p. 8.  
 Hirse-Gras mit langspitzigen Aehren. Loef. Fl. B. p. 120.  
 In der Hollengrund.

293.

*Panicum siue*  
*Gramen mannae esculentum Prutenicum*. Loef. Fl. Bor.  
 p. 108.  
 Schwaben-Gras.  
 In pratis humidioribus.

## A I R A .

*Linn. Gen. Pl. nr. 68. Gössan. H. R. M. p. 41.*

294.

*Aira, foliis planis, panicula coarctata, floribus pedunculatis*  
*muticis, conuoluto subulatis*. Linn. Sp. Pl. p. 63.  
*Gramen arundinaceum enode minus syluaticum*. C. B. P.  
 p. 7.  
*Iuncus luxurians* tenuis major. Thal. Sylv. p. 60.  
 Kleiner Schmeel. Loef. Fl. Bor. p. 119.  
 Passim habitat.

295.

*Aira foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis,*  
*aristatis, arista recta, breui*. Linn. Sp. Pl. p. 64.  
*Gramen segetum panicula arundinacea*. C. B. P. p. 3.  
*Gramen pratense* 3. Dod. Pempt. p. 561.  
*Gramen arundinaceum aruense*. Tab. 1. 1. p. 501.  
 Rohrgras. Loef. Fl. Bor. p. 112.  
 In pratis passim, ut et inter segetes.

E 2

MELICA.

## MELICA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 64. Göttan. H. R. M. p. 42.*

296.

*Melica petalis imberbibus, panicula nutante, simplici.*  
Linn. Sp. Pl. p. 66.

*Gramen auenaceum, locustis rarioribus.* C. B. P. p. 10.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 31. nro. 183.

297.

*Melica petalis imberbibus, panicula nutante, simplici.* Linn.  
Spec. Pl. p. 66.

*Gramen montanum auenaceum locustis rubris.* C. B. P.  
p. 10. Ej. Prodr. p. 20. Wulff. Spec. Inaug. p. 15.

In locis montanis circa fluuium in sylua zu Löwenhagen ha-  
bitat.

## POA.

*Linn. Gen. Pl. nro. 69. Göttan. H. R. M. p. 43.*

298.

*Poa panicula diffusa, spiculis sexfloris, linearibus.* Linn.  
Sp. Pl. p. 67.

*Gramen aquaticum paniculatum, altissimum.* Tourn. Inst.  
p. 523.

*Gramen palustre paniculatum altissimum.* C. B. P. p. 3.

*Gramen aquaticum harundinaceum, paniculatum.* Tab. I. I.  
p. 511.

*Straußtragendes sehr hohes Wasser: Gras.* Loef. Fl. Bor.  
p. 119.

In fossis bey dem Bretter: Krüge.

299.

*Poa panicula diffusa, spiculis quinquefloris, basi pubes-  
centibus, culmo erecto, tereti.* Linn. Sp. Pl. p. 67.

*Gramen pratense paniculatum medium.* C. B. P. p. 2.

*Gramen IV. Tab. I. 1. p. 498.*

*Gramen pratense II. Dod. Pempt. p. 560.*

*Klein gemein Gras.* Loef. Fl. Bor. p. 111.

In udis et pratis passim.

300.

*Poa panicula diffusa*, spiculis trifloris, glabris, culmo, erecto, tereti. Linn. Sp. Pl. p. 67.

*Gramen pratense paniculatum majus*, latiore folio. C. B. P. p. 2. Tourn. Inst. p. 521.

*Gramen pratense*. Dod. Pempt. p. 560. Tab. l. i. p. 497. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 30. nr. 176.

301.

*Poa panicula diffusa*, angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. Linn. Sp. Pl. p. 68.

*Gramen pratense paniculatum minus album*. C. B. P. p. 3. Tab. l. i. p. 500. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 36. nr. 175.

302.

*Poa Linnaei* feu

*Gramen pratense paniculatum minus rubrum*. C. B. P. p. 3. Tab. l. i. p. 501.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 30. nro. 174.

## BRIZA.

Linn. Gen. Pl. nr. 70. Goûan. H. R. M. p. 43.

303.

*Briza spiculis ovatis*, calyce flosculis brevior, Linn. Spec. Plant. p. 70.

*Gramen tremulum majus*. C. B. P. p. 2.

*Gramen leporinum*, *Gramen tremulum*. Tab. l. i. p. 523.

*Amourettes tremblantes*. Clus. H. l. 6. p. 218.

*Gramen paniculatum majus*, locustis magnis, phoeniceis tremulis. Tourn. Inst. p. 523.

*Zitterndes Hasen-Gras*. Unser lieben Frauen Gras. Loef. Fl. Bor. p. 112.

*Im Douartschen Walde*.

304.

*Briza* siue

*Gramen tremulum majus*, panicula spadicea. C. B. P. p. 2.

*Gramen paniculatum majus*, locustis phoeniceis tremulis. Tourn. Inst. p. 523.

E 3

Gras



Groß zitterndes Hasen-Gras. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 30.  
nr. 168.

305.

Briza siue

Gramen paniculatum minus, locustis paruis, tremulis.  
Tourn. Inst. p. 524.

Gramen tremulum minus, panicula parua. C. B. P. p. 2.  
Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 30. nr. 169.

## D A C T Y L I S.

*Linn. Gen. Pl. nr. 69. Goëan. H. R. M. p. 43.*

306.

Dactylis panicula secunda glomerata. Linn. Spec. Pl. p. 71.  
Gramen spicatum flore aspero. C. B. P. p. 3.

Gramen aruense spica compacta diuulsa. Acker-Gras mit  
dichten von einander gezogenen Aehren. Loef. Fl. Bor.  
p. 110.

Ben Königsberg passim.

## F E S T U C A.

*Linn. Gen. Pl. nr. 73. Goëan. H. R. M. p. 48.*

307.

Festuca panicula secunda, coarctata, aristata, culmo tetra-  
gono, nudiusculo, foliis setaceis. Linn. Spec. Pl. p. 73.  
Gramen foliis junceis, breuibus, majus, radice nigra. C.  
B. P. p. 5.

Gramen loliaceum minus, capillaceo folio, spica brizae  
longissima. Tourn. Inst. p. 517. Helw. Suppl. Fl. Bor.  
p. 27. nr. 155.

308.

Festuca spiculis viuiparis. Linn. Spec. Plant. p. 74.  
In collibus apricis duris, crescit copiose.

309.

Festuca panicula nutante, inferne ramosa, spicis adscen-  
dentibus, hispidis, foliis setaceis. Linn. Spec. Pl. p. 74.  
Gramen foliolis junceis, breuibus, minus. C. B. P. p. 5.  
Gramen

Gramen cristatum, radiculis nigricantibus. Fadem blät-  
triges subtiles Berg-Gras mit sehr kleinen schwarzen  
Wurzelchens. Loef. Fl. Bor. p. 110.  
Hinter Frauenburg.

## BROMVS.

Linn. Gen. Plant. nr. 73. Göüan H. R. M. p. 50.

310.

Bromus panicula patente, spiculis ouatis, aristis rectis. Linn.  
Festuca graminea, glumis hirsutis. C. B. P. p. 9.

Gramen auenaceum, locustis villosis, crassioribus. Tourn.  
Inst. p. 526.

Gramen auenaceum hirsutum, paniculis minus sparsis.  
Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 21. nr. 181.

In agris et secundum vias.

311.

Bromus siue

Festuca graminea, glumis glabris. C. B. P. p. 9.

Gramen auenaceum spicis habitioribus glumis, glabris.  
Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 31. nr. 182.

312.

Bromus panicula patula, spiculis oblongis, distichis, glu-  
mis subulato-aristatis. Linn. Sp. Pl. p. 77.

Festuca auenacea sterilis, elatior. C. B. P. p. 9.

Bromos Herba. Dod. Pempt. p. 540.

Gramen auenaceum, panicula sparsa, locustis minoribus  
et aristatis. Tourn. Inst. p. 526. Loef. Fl. Bor. p. 72.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 31. nro. 180.

In cultis et incultis habitat.

313.

Bromus panicula patula, spicis ouatis, aristis diuaticatis.  
Linn. Sp. Pl. p. 76.

Festuca graminea, glumis vacuis. C. B. P. p. 9.

Gramen auenaceum, locustis amplioribus, candicantibus,  
glabris, aristatis. Tourn. Inst. p. 525.

E 4

Helw.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 32. nr. 184.  
In sterilibus.

314.

*Bromus culmo indiuiso*, spiculis alternis, subsessilibus, teretibus. Linn. Sp. Pl. p. 78.

*Gramen spica brizae minus*. C. B. P. p. 9. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 98.

## A V E N A .

Linn. Gen. Pl. nr. 78. Goëan H. R. M. p. 52.

315.

*Auena calycibus dispermis*, seminibus laevibus. Linnæi. Spec. Plant. p. 79.

*Auena nigra*. C. B. P. p. 23.

Schwarzer Haber. Helw. Fl. Quasim. p. 25.

316.

*Auena alba*. C. B. P. p. 23.

Haber. Helw. Fl. Quasim. p. 25.

In agris feritur.

317.

*Auena ustilago*. Tourn. Inst. p. 514.

Helw. Tourn. Bor. p. 94. Loef. Fl. Bor. p.

Inter auenam habitat.

318.

*Auena elatior*, calycibus bifloris, altero flosculo aristato. Linn. Spec. Pl. p. 79.

*Gramen nodosum*, auenacea panicula. C. B. P. p. 2.

Tourn. Inst. p. 525.

In pascuis et dumetis.

319.

*Auena panicula patente*, calycibus trifloris, flosculis basi pilosis. Linn. Sp. Pl. p. 80.

*Gramen utriculis lanugine flavescentibus*. C. B. P. p. 10.

*Gramen auenaceum utriculis lanugine flavescentibus*.

Tourn. Inst. p. 525.

In pratis pinguioribus et herbosis.

LOLIVM.

## LOLIVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 77. Göüan. H. R. M. p. 44.*

320.

*Lolium perenne*, spica mutica. Linn. Sp. Pl. p. 83.

*Gramen loliaceum*, angustiore folio et spica. C. B. P. p. 9.

Tourn. Inst. p. 516.

*Phoenix siue lolium murinum*. Dod. Pempt. p. 540.

Ad femitas fere ubique.

321.

*Lolium spica aristata*. Linn. Spec. Plant. p. 83.

*Gramen loliaceum spica longiore*. C. B. P. p. 9. Tourn.

Inst. p. 516.

Dorten. Drespe. Loef. Fl. Bor. p. 121.

Inter Segetes.

## ELYMVS.

*Linn. Gen. Plant. nr. 1075. Göüan. H. R. M. p. 56.*

322.

*Elymus foliis mucronato-pungentibus*. Linn. Sp. Pl. p. 100.

*Gramen caninum*, maritimum, spicatum. C. B. P. p. 1.

*Gramen caninum* 3. Tab. l. 1. p. 488.

*Gramen loliaceum radice repente maritimum*. Tourn. Inst.

p. 516.

Geährtes Hund: und See:Grass. Loef. Fl. Bor. p. 109.

## TRITICVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 78. Göüan. H. R. M. p. 57.*

323.

*Triticum glumis ventricosus*, glabris, imbricatis. Linnæi.

Spec. Plant. p. 85.

*Triticum aestivum*. C. B. P. p. 21.

Sommer:Weizen. Helw. Fl. Quasim. p. 48.

324.

*Triticum glumis ventricosus*, laeuibus, imbricatis, submuticis. Linn. Sp. Pl. p. 86.

E 5

Triti-

*Triticum hybernum* aristis carens. C. B. P. p. 21.

Winter-Weizen. Helw. Fl. Quasim. p. 48.

Seritur in agris.

325.

- *Triticum calycibus subulatis*, trifloris, acuminatis. Linn.  
Spec. Plant. p. 86.

*Gramen Officinatum*. Loef. Fl. Bor. p. 109.

*Gramen caninum aruense*, siue *Gramen Dioscoridis*. C. B.  
P. p. 1.

*Gramen*. Dod. Pempt. p. 558.

*Gramen loliaceum radice repente*, siue *Gramen Officina-*  
*rum*. Tourn. Inst. p. 516.

Quecken: Graß.

326.

*Triticum calycibus subulatis*, quadrifloris, aristatis. Linn.  
Spec. Plant. p. 86.

*Gramen caninum non repens*, elatius, spica aristata. Buxb.  
Cent. IV. Tab. 59.

*Gramen loliaceum radice repente*, siue *Gramen Officina-*  
*rum*, longioribus aristis donatum. Vaill. Bot. Par. Tab.  
XVII. Fig. 2.

- In aruis et circa semitas passim.

327.

*Triticum*, siue

*Gramen loliaceum spica triticea diuulsa*. C. B. P. p. 18.

Breitblättriges Graß mit zertheilten Weizen-Aehren. Loef.  
Flor. Boruss. p. 120.

Sparfim.

## SECALE.

Linn. Gen. Pl. nr. 79. Gössan, H. R. M. p. 56.

328.

*Secale glumarum ciliis glabrum*. Linn. Sp. Pl. p. 84.

*Secale hybernum*. C. B. P. p. 22.

Winter-Roggen.

In agris seritur.

329.

329.

Secale venum siue minus. C. B. P. p. 84.

Sommer; Roggen.

330.

Secale siue

Gramen marinum spica secalina. Loef. Fl. Bor. p. 120.

Meer; Graß mit Korn; Aehren.

Circa littus maris bey St. Albrecht. it. bey der Sackau.

## HORDEVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 20. Gössan. H. R. M. p. 58.*

331.

Hordeum polystichon venum. C. B. P. p. 22.

Hordeum flosculis omnibus, hermaphroditis, aristatis, ordinibus duobus erectioribus. Linn. Sp. Pl. p. 84.

Gemeine Gerste. Helw. Fl. Quasim. p. 34.

332.

Hordeum distichon. C. B. P. p. 23.

Hordeum flosculis lateralibus, masculis, muticis, seminibus angularibus imbricatis. Linn. Sp. Pl. p. 85.

Gemeine Sommer-Gerste. Helw. Suppl. Fl. Quasi. p. 14.

Seritur in agris.

333.

Hordeum flosculis lateralibus, masculis, aristatis. Linnaei. Spec. Plant. p. 85.

Gramen hordeaceum minus et vulgare. C. B. P. p. 8.

Gramen secalinum spicatum vulgare. Tourn. Inst. p. 517.

Holcus Plinii. Lob. Ado.

Mäuse; Gerst. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 28. nr. 158.

## CYNOSVRVS.

*Linn. Gen. Pl. nro. 72. Gössan. H. R. M. p. 53. 47.*

334.

Cynosurus bracteis pinnatifidis. Linn. Sp. Plant. p. 72.

Gramen spicatum glumis cristatis. Tourn. Inst. p. 519.

Gramen

*Gramen pratense cristatum, seu spica cristata laeui.* C. B. P. p. 2.

*Gramen cristatum anglicum,* Parck. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 29. nr. 165.

## ARUNDO.

*Linn. Gen. Pl. nro. 76. Gouan. H. R. M. p. 54.*

335.

*Arundo calycibus quinquefloris, panicula laxa.* Linn. Sp. Plant. p. 81.

*Arundo vulgaris siue Phragmites Dioscoridis.* C. B. P. p. 17. Tourn. Inst. p. 526.

*Gemein Rohr. Deck-Rohr.* Loef. Fl. Bor. p. 19.

*Am frischen und Eurischen Hase.*

336.

*Arundo calycibus unifloris, panicula spicata, foliis inuolutis, mucronato pungentibus.* Linn. Spec. Pl. p. 82.

*Gramen spicatum secalinum, maritimum, maximum, spica longiore.* Tourn. Inst. p. 518.

*Gramen sparteum, spicatum, foliis mucronatis, longioribus.* C. B. Prodr. p. 5.

*Epizäbriges Meer-Gras.* Helw. Supl. F. B. p. 28. nr. 159.

337.

*Arundo calycibus unifloris, culmo ramoso.* Linn. Sp. Pl. p.

*Gramen arundinaceum, panicula molli, spadicea, majus.* C. B. P. p. 6.

*Gramen paniculatum, arundinaceum, panicula, densa, spadicea.* Tourn. Inst. p. 523.

*Groß Rohr-Gras mit seinen weichen, braunrothen Strauß.* Loef. Fl. Bor. p. 119.

*Bei dem Dorf Wittenberg.*

## HOLCVS.

*Linn. Gen. Pl. nro. 925. Gouan H. R. M. p. 113.*

338.

*Holcus glumis trifloris, muticis, glabris, hermaphrodito diandro.* Linn. Spec. Plant. p. 1048.

Gramen

Gramen paniculatum, odoratum. C. B. P. p. 7.

Gramen Mariae Borussorum. Marien-Gras. Loef. Fl. Bor.

P. 111.

Auf den Wiesen hinter dem Bretter-Krüge.

## CAREX.

*Linn. Gen. Pl. nr. 848. Gouan H. R. M. p. 481.*

339.

Carex spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus, folio longiori instructis, culmo triquetro.

Linnaei. Spec. Plant. p. 973.

Gramen cyperoides, minus, repens, spica diuisa. Klein kriechend Cyper-Gras mit zertheilten, braungelben Aehren. Loef. Fl. Bor. p. 116.

In montosis hinter Frauenburg.

340.

Carex spica composita, spiculis ouatis, sessilibus, approximatis, alternis, androgynis, nudis. Linn. Sp. Pl. p. 973.

Gramen cyperoides, majus, spica diuisa. C. B. P. p. 6.

Gramen cyperinum palustre minus. Tab. l. 1. p. 974.

Gramen cyperoides spicis curtis, diuisis. Cyper-Gras mit zertheilten braungelben Aehren. Loef. Fl. Bor. p. 117.

In locis udis passim bey dem Bretter-Krüge.

341.

Carex spiculis subrotundis, remotis, sessilibus, obtusis, androgynis, capsulis ouatis, obtusiusculis. Linn. Sp. Pl. p. 974.

Gramen cyperoides, spicis curtis, diuisis. Cyper-Gras mit kurzen abgesonderten Aehren. Loef. Fl. Bor. p. 117.

In udis passim.

342.

Carex spicis linearibus, erectis, mascula breuiore, inferioraque, bracteis, aphyllis, capsulis distentibus. Linnaei. Spec. Plant. p. 975.

Gramen caryophyllum, montanum spica varia. C. B. P.

P. 4.

Gramen



*Gramen caryophyllum*, polycarpon, fructu triangulari.  
Fruchtreiches Nägelein; Graß mit dreyskantigen Saamen.  
Loef. Fl. Bor. p. 112.

Ben Domnau in incultis.

343.

*Carex supra decomposita*, inferne laxiore, spiculis androgynis, ouatis, sessilibus, glomeratis, superne masculis.  
Linn. Spec. Pl. p. 973.

*Gramen cyperoides*, palustre majus, spica compacta. C. B. P. p. 6. Tab. I, 1. p. 514. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 17. nro. 87.

344.

*Carex spicis masculis superioribus numerosis, foemineis inferioribus, intermedia unica androgyna.* Ger. Fl. Gallo-  
Prov. p. 113.

*Cyperoides latifolium*, spica ruffa, siue caule triangulo.  
Tourn. Inst. p. 529.

*Gramen cyperoides latifolium* spica ruffa, siue caule triangulo. C. B. P. p. 6. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 17. nro. 93.

345.

*Carex spicis erectis, oblongis, sessilibus, alternis, foliolo florali breuioribus, superioribus masculis* Royeni. Ger. Fl. Gallo-  
Prov. p. 13.

*Cyperoides nigro-luteum vernum minus.* Tourn. Inst. p. 529.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 17. nro. 88.

In umbrosis primo vere.

346.

*Carex spicis pendulis, pedunculis geminatis.* Linn. Spec. Plant. p. 978.

*Pseudo-Cyperus.* Dod. Pempt. p. 339.

*Gramen cyperoides palustre*, spica pendula, Wasser; Cyper; Graß mit hangenden schwarz; grünen Aehren. Loef. Fl. Bor. p. 116.

Auf den Wiesen nach dem Bretter; Krüge.

347.

347.

*Carex spica* mascula oblonga, foemineis sessilibus, oblongis, inferiore folio, proprio breuiore. Linn. Sp. Pl. p. 976.

Gramen cyperoides, hirsutum repens spicis minoribus, minusque compactis. Haaricht kriechend Cyper: Grass mit weichen Aehren. Loef. Fl. Bor. p. 118.

In incultis bey der Neuen Bleich.

348.

*Carex spicis erectis, cylindricis, ternis, subsessilibus: mascula terminali, culmo triquetro.* Linn. Spec. Pl. p. 978.

*Cyperus gramineus minor.* Vielstrauchiges kleines, scharfes Cyper: Grass. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 17. nro. 86.

In der Damerauschen Wiese.

349.

*Carex spicis remotis, foemineis, subsessilibus, capsulis hirsutis.* Linn. Spec. Plant. p. 975.

*Cyperoides polystachion, lanuginosum.* Tour. Inst. p. 529. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 17. nr. 90.

350.

*Carex spicis confertis, subsessilibus, subrotundis: mascula lineari capsula, acutis recuruis.* Linn. Sp. Pl. p. 975.

*Cyperoides polystachion, flauicans, spicis breuibus, prope summitatem caulis.* Raji. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 17. nro. 91.

In pratis.

351.

*Carex* feu

*Cyperoides palustre, ad gramen nigro-luteum accedens, spicis fere cylindraceis, crassis, ex nigro-luteo, variegatis.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 17. nro. 92.

352.

*Carex spicis pendulis, mascula erecta, foemineis oblongis et distichis, capsulis nudis acuminatis.* Lin. Sp. Pl. p. 977.

Gramen hirsutum capitulis psyllii. C. B. P. p. 7.

Gramen cyperinum, pilosum. Tab. l. 1. p. 514.

Haarichtes Cyper: Grass. Loef. Fl. Bor. p. 118.

353.

353.

Carex siue

Gramen cyperoides miliaceum. C. B. P. p. 6.

Gramen arundinaceum foliis acutissimis, altissimis. Loef.

Fl. Bor. p. 119.

In locis udis.

354.

Carex siue

Gramen arundinaceum, paniceum, diuisa panicula. Loef.

Fl. Bor. p. 119.

Am Thamm bey'm Bretter: Krüge.

## ERIOPHORVM.

*Linn. Gen. Pl. no. 55. Gouan. H. R. M. p. 32.*

355.

Eriophorum culmis vaginatis, teretibus, spica paleacea.

Linnaei. Spec. Plant. p. 52.

Iuncus Alpinus capitulo lanuginoso, seu Schaenolaguros.

C. B. P. p. 12. Ej. Prodr. p. 23.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 39. nr. 224.

356.

Eriophorum culmis teretibus, foliis planis, spicatis, pedunculatis. Linn. Spec. Plant. p. 52.

Linagrostis panicula ampliore. Tourn. Inst. p. 664.

Gramen pratense tomentosum, panicula sparsa. C. B. Pr. p. 114.

Gramen Eriophoron. Dod. Pempt. p. 562.

Baumwolltragendes Binsen-Gras. Loef. Fl. Bor. p. 114.

In pratis humectis, torfosis, et vallibus uliginosis passim.

## SCIRPV S.

*Linn. Gen. Pl. nr. 54. Gouan. H. R. M. p. 29.*

357.

Scirpus culmo tereti, nudo, spica sub-ouata, imbricata

Linnaei. Spec. Plant. p. 47.

Scirpus equiseti capitulo, major. Tourn. Inst. p. 528.

Scirpus

*Scirpus capitulis equiseti major.* C. B. P. p. 12.

*Iuncellus cyperoides, capitulo simplici.* Schlecht Köpfichte  
kleine Cyper; Binzen. Loef. Fl. Bor. p. 131.

In pratis nach dem Bretter; Krüge zu.

358.

*Scirpus culmo nudo, setaceo, spicis laterilibus, sub-solitariis, sessilibus.* Linn. Spec. Pl. p. 49.

*Scirpus omnium minimus, capitulo breviori.* Tourn. Inst. p. 528.

*Iuncellus inutilis siue Chamaeschoenos.* C. B. P. p. 12.

Die kleinsten Binzen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 61.

In pratis humidis.

359.

*Scirpus culmo tereti, nudo, spicis ouatis, pluribus, pedunculatis, terminalibus.* Linn. Sp. Pl. p.

*Iuncus maximus siue Scirpus major.* C. B. P. p. 12.

*Iuncus palustris major.* Tragi Seb. in Trag. p. 542.

*Scirpus palustris altissimus.* Tourn. Inst. p. 528.

Großer weißer Binzen. Loef. Fl. Bor. p. 130.

Im Pregel nach Jerusalem copiose.

## CYPERVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 3. Götian. H. R. M. p. 28.*

360.

*Cyperus culmo triquetto, nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus inaequalibus, spicis confertis, linearibus.* Linn. Spec. Pl. p. 46.

*Cyperus minimus, panicula sparsa, nigricante.* C. B. P. p. Tourn. Inst. p.

*Gramen exile cyperoides spicis nigris.* Klein Cyper; Gras mit schwarzen Aehren. Loef. Fl. Bor. p. 117.

In pratis nach dem Bretter; Krüge zu.

361.

*Cyperus culmo triquetto, nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus, inaequalibus, spicis confertis, lanceolatis.* Linn. Spec. Pl. p. 46.

F

Cyperus

*Cyperus minimus*, panicula sparsa, flavescente. Tour. In. p. Scheuchz. Hist. Graminum. p. 385.

Gramen *Cyperoides* spica variante. Klein Cyper: Gras, mit zweyerley Aehren. Loef. Fl. Bor. p. 117. Passim.

## TYPHA.

Linn. Gen. Pl. nr. 850. Göttan. H. R. M. p. 480.

362.

*Typha foliis subensiformibus*, spicula mascula, foeminaeque approximatis. Linn. Spec. Pl. p. 971.

*Typha palustris major*. C. B. P. p. 20. Tourn. Inst. p. 530.

*Typha palustris*. Ruel. p. 560.

Narren: Kolben. Deitel: Kolben. Loef. Fl. Bor. p. 277.

In aquis stagnantibus et uliginosis. Hinter der Altstädtschen Ziegel: Scheune.

363.

*Typha palustris minor*. C. B. P. p. 20.

Kleine Liesch: Kolben. Helw. Supp. Fl. Bor. p. 65. nr. 395.

In dem Graben, in Wildniß: Vereuters Feldchen bey Ungersburg.

## SPARGANIVM.

Linn. Gen. Pl. nro. 849. Göttan. H. R. M. p. 53. 480.

364.

*Sparganium foliis erectis*, triquetris. Linn. Sp. Pl. p. 971.

*Sparganium ramosum*. C. B. P. p. 15.

Groß Kiebt: Degen: Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 60.

In fossis stagnantibus passim.

365.

*Sarganium non ramosum*. C. B. P. p. 15.

Schwertel: Kiebt. Igels: Knospen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 63. nro. 383.

In lacunis.

366.

*Sparganium minimum*. C. B. P. p. 15.

Ganz kleine Igels: Knospen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 63. nr. 384.

PIPERITAE.



# PIPERITAE.

## LEMNA.

*Linn. Gen. Plant. nr. 960. Göian H. R. M. p. 479.*

**L**<sup>367.</sup>  
*Lemna foliis petiolatis, lanceolatis. Linn. Sp. Pl. p. 970.*  
*Lenticula aquatica trifulca. C. B. P. p. 362.*  
*Hederula palustris. Tab. l. 2. p. 566.*  
 Drenspiziger Wasser: Eppich. Loef. Fl. Bor. p. 139.  
 In fossis nach dem Bretter: Krüge.

<sup>368.</sup>  
*Lemna foliis sessilibus, utrimque planiusculis, radicibus solitariis. Linn. Spec. Pl. p. 970.*  
*Lenticula palustris vulgaris. C. B. P. p. 362.*  
*Lens palustris Matth. deutsch. p. 783. Tab. l. 2. p. 206.*  
 Wasser: Linsen. Endten: Floß. Loef. Fl. Bor. p. 139.

## CALLITRICHE.

*Linn. Gen. Pl. nr. 1074. Göian, H. R. M. p. 3.*

<sup>369.</sup>  
*Callitriche Plinii. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 122.*  
*Stellaria aquatica. C. B. P. p. 141.*  
*Lenticula palustris angustifolia, folio in apice dissecto.*  
 Schmalblättricht Linsen: Kraut, deren Blätter in der  
 Spitze zerschnitten. Loef. Fl. Bor. p. 140.  
 In der Hollengrund.

<sup>370.</sup>  
*Callitriche secunda. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 123.*  
*Lenticula palustris bifolia, fructu tetragono. C. B. P.*  
*p. 362.*  
 Klein kriechend Linsen: Kraut mit viereckichter Frucht. Loef.  
 Fl. Bor. p. 140.  
 Im Wiesen: Graben unten auf dem Boden gegen Jerusalem über.

## POTAMOGETON.

Linn. Gen. Pl. nr. 128. Geüan. H. R. M. p. 75.

371.

Potamogeton, foliis oblongo-ouatis, petiolatis, nutantibus. Linn. Sp. Pl. p. 126.

Potamogeton rotundifolium. C. B. P. p. 193. Tourn. Inst. p. 233. Tab. l. 2. p. 415.

Rundblättriges Saamkraut. Loef. Fl. Bor. p. 205.

In aquis stagnantibus passim.

372.

Potamogeton foliis cordatis, amplexicaulibus. Linn. Spec. Plant. p. 126.

Potamogeton rotundifolium, alterum, Loef. Fl. B. p. 205. Am Pregel.

373.

Potamogeton foliis lanceolatis, planis, in petiolos deficientibus. Linn. Sp. Pl. p. 126.

Potamogeton foliis splendentibus. C. B. P. p. 193.

Potamogeton altera. Dod. Pempt. p. 582.

Saamkraut mit glänzenden Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 206.

Am Frisching.

374.

Potamogeton foliis lanceolatis, alternis, undulatis, serratis. Linn. Spec. Plant. p. 126.

Potamogeton foliis crispis, siue lactuca ranarum. C. B. P. p. 193.

Kleiner Brunn, oder Froschlattich. Loef. Fl. Bor. p. 200. In lacunis hinter dem Altstädtschen Walle nach der Hollensgrund zu.

375.

Potamogeton alpinum plantaginis folio. Tourn. Inst. p. 233.

Fontanalis lucens major, I. Bauh.

Saam

Saam:Kraut mit Wegerich:Blätter. Helw. Suppl. Fl. Bor.  
p. 55. nro. 329.

In aquis stagnantibus auf dem Angerburgschen Felde.

376.

Potamogeton Salicis folio. C. B. P. p. 193.

Potamogeton, Dod. Pempt. p. 582.

Schmalblättriches Saam:Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 205.

In aquis stagnantibus bey Königsberg passim.

377.

Potamogeton foliis linearibus, obtusis, caule compresso.

Linn. Spec. Plant. p. 127.

Potamogeton ramosum, gramineum. C. B. P. p. 191.

Potamogeton pusillum, gramineo folio, caule compresso.

Tourn. Inst. p. 233.

Potamogetum gramineum latifolium. Klein großährichtes  
breites Saamen:Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 206.

Im Graben bey dem Bretter:Kruge.

378.

Potamogeton foliis lineari-lanceolatis, alternis sessilibus,  
stipula latioribus. Linn. Sp. Pl. p. 127.

Potamogeton gramineum, tenuifolium. Klein grasächti-  
ges schmales Saam:Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 206.

Im Graben bey dem Bretter:Kruge.

379.

Potamogetum, foliis linearibus, oppositis, alternisque dis-  
tinctis, basi patentibus, caule tereti. Linn. Spec. Plant  
p. 127.

Potamogetum mininum, capillaceo folio. Helw. Suppl.  
Fl. Bor. p. 55. nro. 328. Klein Saam:Kraut.

In stagnis.

## TRIGLOCHIN.

Linn. Gen. Pl. nr. 379. Gössan. H. R. M. p. 188.

380.

Triglochin capsulis trilocularibus, sublinearibus. Linnaci.  
Spec. Pl. p. 338.

F 3

Iuncago



*Juncago palustris* et vulgaris. Torun. Inst. p. 266.

*Gramen junceum spicatum* seu *Triglochin*. C. B. P. p. 114.

Winsen: Graß mit einer langen Aehre. Loef. Fl. Bor.

In pratis humectatis circa Regiomontum passim.

## SCHEUCHZERIA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 38.*

381.

*Scheuchzeria*. Linn. Sp. Pl. p. 338.

*Juncus floridus minor*. C. B. P. p. 12.

*Gramen junceum aquaticum*, semine racemoso. Walb.

Winsen: Graß mit zergliederten Blättern. Loef. Fl. Bor.

p. 114.

In uliginosis bey der Hollengrund.

## CALLA.

*Linn. Gen. Plant. nr. 839.*

382.

*Calla foliis cordatis*, spatha plana, spadice undique hermaphrodito. Linn. Spec. Pl. p. 968.

*Dracunculus palustris* siue radice arundinacea Plinii. C. B. P. p. 62.

*Aron aquaticus*. Matth. deutsch. p. 228.

*Dracunculus aquatilis*. Dod. Pempt. p. 330.

Wasser: Schlangen: Kraut. Wasser Aron. Loef. Fl. Bor. p. 62.

In locis uliginosis hinter Juden: Kirch.

## ZOSTERA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 1068. Gouan, H. R. M. p. 478.*

383.

*Zostera*. Linn. Spec. Pl. p. 968.

*Alga angustifolia* Vitrariorum. C. B. P. p. 364.

Meer: Graß. Loef. Fl. Bor. p. 7.

An der See hin und wieder.

ORCHI-

# O R C H I D E A E.

## O R C H I S.

*Linn. Gen. Pl. nr. 823. Gössan. H. R. M. p. 469.*

**O**rchis bulbis indiuisis, nectarii labio lanceolato, integerrimo, cornu longissimo, petalis patentibus. Linnæi. Spec. Pl. p. 939.

Orchis alba bifolia minor calcare oblongo. C. B. P. p. 83. Vaill. Bot. Par. Tab. XXX. Fig. 7.

Testiculus vulpinus latifolius. Tab. l. 2. p. 336.

Orchis serapias. Dod. Pempt. p. 237. Tour. Inst. p. 433.

Fuchs: Huddlein oder Fliegen-Blumen. Standart. Loef. Fl. Bor. p. 181.

385.

Orchis bulbis indiuisis, nectarii labio quadrifido, punctis scabro, cornu obtuso, petalis distinctis. Linn. Sp. Pl. p. 941.

Orchis militaris pratensis humilior. Vaill. Bot. Par. Tab. XXXI. Fig. 38.

Orchis Pannonica IV. Clus. H. p. 268.

Orchis muscae corpus referens maculosa. Flechticht Fliegen: Stendel: Wurz. Loef. Fl. Bor. p. 183.

Wey Lauten: Mühle.

386.

Orchis bulbis indiuisis, nectario, labio quinquefido, punctis scabro, cornu obtuso, petalis confluentibus. Linn. Spec. Pl. p. 941.

Orchis hiantæ cucullo major. C. B. P. p. 80.

Orchis militaris montana, spicata, purpureo-violacea. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 51. nro. 306.

Orchis militaris major. Tourn. Inst. p. 438. Vaill. Bot. Par. Tab. XXXI. Fig. 21. 27. 28.

387.

Orchis militaris pratensis, humilior, floribus variegatis. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 51. nro. 304.

F 4

Orchis

*Orchis latifolia* hiantе cucullo minor. Tourn. Inst. p. 432.  
Flecht Fliegen; Stendel; Wurz, mit buntgesprengter  
Blüte. Helw.

In dem Rossgarten bey Angerburg.

388.

*Orchis muscam referens* major. C. B. P. p. 183.  
Tourn. Inst. p. 434.

*Testiculus muscarius* IV. Tab. I. 2. p. 354.

Braunrothe glatte Fliegen; Stendel; Wurz mit grosser Blüt.

Loef. Fl. Bor. p. 183.

Beym Kranz; Krüge und Quednau.

389.

*Orchis bulbis palmatis*, patentibus, nectarii cornu, germi-  
nibus brevior: labio plano, petalis dorsalis erectis.

Linn. Spec. Pl. p. 942.

*Orchis palmata pratensis maculata*. C. B. P. p. 85.

*Palma Christi maculata*. Tab. I. 2. p. 363.

*Satyrium basilicon* Graecorum. Ruell. p. 564.

*Orchis palmata montana maculata*. Vaill. Bot. Par. Tab.

XXXI. Fig. 9. 10.

Händleins; Wurz. Kreuz; Blum. Loef. El. Bor. p. 181.

Beym Donartschen Walde.

390.

*Orchis palmata minor*, calcaribus oblongis. C. B. P.

p. 54. Ej. Prodr. Rothe Händlein; Wurz mit schmalen  
Blättern. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 50. nr. 392.

In der Damerau und in der Heide.

391.

*Orchis palmata palustris*, tertia, floribus laete incarnatis.

C. B. P. p. 86. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 50. nro. 303.

In den Wiesen hinter der Damerau, wenn man nach Thier-  
garten fährt.

392.

*Orchis palmata pratensis*, latifolia, calcaribus parvis, flo-  
re albo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 51. nro. 307.

Inter alias orchides auf Moosen an den Bäumen.

393.

393.

*Orchis palmata*, palmis inuervis, flore albo. Umgekehrte  
Händlein-Wurz mit weißer Blüt. Loef. Fl. Bor. p. 182.  
Hinter Kraßken im Walde.

SATYRIVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 824. Gouan H. R. M. p. 471.*

394.

*Satyrium bulbis palmatis*, foliis oblongis, obtusis, nectarii labio, lineari, trifido, intermedia obsoleta. Linnaei.  
Spec. Plant. p. 944.

*Orchis palmata* flore viridi. C. B. P. p. 86. Tour. In. p. 435.

*Orchis palmata* galericulata, dilute viridi. Händlein-Wurz  
mit gehelmter lichtgrüner Blüt. Loef. Fl. Bor. p. 182.  
Im Grünhöfchen im Dollkeimschen Garten.

395.

*Satyrium bulbis fibrosis*, foliis ovatis, radicalibus, floribus  
secundis. Linn. Spec. Pl. p. 945.

Pseudo-orchis. C. B. P. p. 84.

*Pyrola angustifolia* polyanthos radice geniculata. Loef.  
Fl. Bor. p. 210.

In der Fischhausischen Heide.

OPHRY S.

*Linn. Gen. Pl. nro. 828. Gouan H. R. M. p. 472.*

396.

*Ophrys bulbis fibroso-fasciculatis*, caule vaginato, nectarii  
labio bifido. Linn. Spec. Pl. p. 945.

*Orchis abortiva* fusca. C. B. P. p. 86.

Nidus avis. Lob. Adv.

*Orchis abortiva* Lobelii. Clus. H. p. 86.

Wild Knaben-Wurz. Loef. Fl. Bor. p. 184.

Im Buchwalde zwischen Schwanis und Versche.

397.

*Ophrys bulbo fibroso*, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii  
labio bifido. Linn. Sp. Pl. p. 946.

F 5

Bifoli-

*Bifolium bulbosum*. Dod. Pempt. p. 242.

*Orchis bifolia*. C. B. P. p. 87. Tourn. Inst. p. 437.

Zwenblatt. Durchwachs; Männlein. Loef. Fl. Bor. p. 180.  
In tenebrosis bey'm Donartschen Walde.

398.

*Ophrys bulbo rotundo*, nectarii labello ovato. Linn. Sp. Plant. p. 947.

*Ophrys διφυλλος* bulbosa. Zwenblatt mit zwieblichter Wurzel. Loef. Fl. Bor. p. 180. •

Hinter Fischhausen auf den Wiesen nach Loehstedt.

399.

*Ophrys bulbo rotundo*, caule nudo, folio ovato, nectarii labio integro. Linn. Sp. Pl. p. 947.

*Ophrys μονοφυλλος* bulbosa. Einblat mit zwieblichter Wurzel. Loef. Fl. Bor. p. 180.

*Pseudo-orchis μονοφυλλος*. Clus. H. l. p. 269.

Ben Kossitten im Gebrüch.

400.

*Ophrys bulbo globoso*, caule nudo, nectarii labio trifido. Linn. Sp. Pl. p. 947.

*Orchis odorata moschata*, siue *Monorchis*. C. B. P. p. 84.

*Orchis radice subrotunda*, labello hastato. Gmel. Sib. I. p. 18. Tab. IV. Fig. 1.

*Orchis coleo unico*, siue *Monorchis*, flosculis pallide viridibus. Einhöddlein; Wurzel mit grüner Blüt. Loef. Fl. Bor. p. 184.

Im Grünhöfischen und Dollkheimischen Ros; Garten.

## SERAPIAS.

Linn. Gen. Pl. no. 825. Gouan. H. R. M. p. 474.

401.

*Serapias bulbis fibrosis*, nectarii labio obtuso, crenato, petalis brevioribus. Linn. Spec. Pl. p. 949.

*Helleborine latifolia montana*. C. B. P. p. 186. Tourn. Inst. p. 436.

Serapi-

Serapias caule multifloro. Gmel. Sib. lib. 1. p. 8.  
 Helleborine. Dod. Pempt. p. 384. Tab. 1. 2. p. 460.  
 Breitblättrige Berg-Nieſwurz mit brauner Blüt. Loef.  
 Fl. Bor., p. 123.

Hinter der Sarcſau im Gebirge.

402.

Serapias siue  
 Helleborine flore carneo. C. B. P. p. 187.  
 Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 32. nr. 157.

403.

Serapias siue  
 Helleborine angusti folia montana flore albo. Helw. Suppl.  
 Fl. Bor. p. 32. nr. 185.  
 Elleborine II. Cluſ. H. p. 272.  
 Schmalblättrige Berg-Nieſwurz mit weiſſer Blüt.  
 In querceto Weiſſſuhn bey Johannisburg.

404.

Serapias siue  
 Helleborine angustifolia montana flore purpureo. Helw.  
 Suppl. Fl. Bor. p. 32. nro. 156.  
 Helleborine montana angustifolia purpurascens. C. B. P.  
 p. 187.

405.

Serapias siue  
 Helleborine sylvestris, flore herbaceo. Helw. Suppl. Fl.  
 Bor. p. 32. nro. 188.  
 In der Ogonschen Heide.

406.

Serapias siue  
 Helleborine angustifolia pratensis, ex albo purpurascens.  
 Schmalblättrige Wiesen-Nieſwurz mit weiß-brauner Blüt.  
 Loef. Fl. Bor. p. 124.  
 In Pratis in der Hollengrund und hinter der Neuen Bleich.

CYPRIPE-

## CYPRIPEDIUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 830. Gouan. H. R. M. p. 474.*

407.

*Cypripedium* radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis, caulinis. Linn. Spec. Pl. p. 951.

Calceolus foliis ovato-lanceolatis. Gmel. Sib. I. p. 2. T. 1.

Calceolus Marianus. Dod. Pempt. p. 180.

Helleborine flore rotundo, f. Calceolus. C. B. P. p. 187.

Marien; Schuchlein. Helw. Fl. Quasim. p. 27.

Inter frutices in der Damerau bey Angerburg.

## TRIDENTALIS.

*Linn. Gen. Pl. nr.*

408.

*Tridentalis* foliis lanceolatis integerrimis, Linn. Sp. Plant. p. 344.

*Pyrola* Alpinæ flore Europæa. C. B. P. p. 191.

Winter grün mit Hünereidarms Blut. Loef. Fl. Bor. p. 24.

Im Donartschen und Lebenichtschen Walde.

\*\*\*\*\*

## CONVALLARIAE.

## ASARUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 461. Gouan. H. R. M. p. 226.*

409.

*Asarum* foliis reniformibus, mucronatis, Linn. Sp. Pl.

p. 442-

*Asarum*. C. B. P. p. 197.

*Asarum*. Fuchf. H. p. 10.

Haselwurz. Loef. Fl. Bor. p. 19.

Beim Lautschen Teiche am Berge.

ASPARAGUS.

ASPARAGVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 339. Gouan. H. R. M. p. 176.*

410.

- *Asparagus caule herbaceo, erecto, foliis setaceis, stipulis paribus.* Linn. Spec. Pl. p. 313.

*Asparagus sylvestris tenuissimo folio.* C. B. P. p. 490.  
Tourn. Inst. p. 300.

*Asparagus maritimus.* Lob.

*Asparagus marinus.* Clus. H. 1. 5. p. 179.

*Asparagus palustris.* Tab. l. 1. p. 515.

*Spargen.* Loef. Fl. Bor. p. 20.

*Ben St. Lorenz an der See. It. in der Sarcfau.*

CONVALLARIA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 341. Gouan. H. R. M. p. 176.*

411.

- *Convallaria scapo nudo.* Linn. Sp. Pl. p. 314.

*Lilium Convallium album.* C. B. P. p. 304.

*Mäyen; Blümlein. Lilien Convallien.* Loef. Fl. Boruss.  
p. 141.

*In umbrosis passim.*

412.

*Convallaria foliis cordatis.* Linn. Sp. Pl. p. 316.

*Lilium convallium minus.* C. B. P. p. 304.

*Monophyllum unifolium.* Thal. Sylv. H. p. 77.

*Unifolium.* Tab. l. 2. p. 428.

*Einblat.* Loef. Fl. Bor. p. 141.

*Ben Lautenmühl in umbrosis.*

413.

*Convallaria siue*

*Lilium Convallium ad radicem monanthemum.* Helw.

*Suppl. Fl. Bor. p. 44. nro. 256.*

*In der Damerau.*

414.

*Convallaria foliis verticillatis.* Linn. Sp. Pl. p. 315.

Polygo.



*Polygonatum angustifolium*, non ramosum. C. B. P.  
p. 303.

*Polygonatum angustifolium*. Fuchf. H. p. 586.

*Polygonatum alterum*. Dod. Pempt. p. 345.

Schmale Weißwurz. Loef. Fl. Bor. p. 201.

Ben Brickenfeld hinter den Ziegel; Scheunen.

415.

Convallaria foliis alternis, amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus unifloris. Linn. Spec. Plant.  
p. 315.

*Polygonatum latifolium vulgare*. C. B. P. p. 200. Gmel.  
Sib. l. 1. p. 34.

*Sigillum Salomonis Tragi* Seb. in Trag. p. 316.

Weißwurz. Loef. Fl. Bor. p. 200.

In der Hollengrund und Ponartschen Walde.

416.

*Convallaria siue*

*Polygonatum latifolium*, flore majore odorato. C. B. P.  
p. 303.

*Polygonatum latifolium*. Clusf. H. p. 276: Helw. Suppl.  
Fl. Bor. p. 54. nro. 326.

In der Ogonschen Heide.

## TAMUS.

*Linn. Gen. Pl. nro. 905. Gouan. H. R. M. p. 505.*

417.

*Tamus foliis cordatis, indiuisis*. Linnaei. Spec. Plant.  
p. 1028.

*Bryonia alba baccis nigris*. C. B. P. p. 297.

*Bryonia nigra*. Dod. Pempt. p. 399.

Hunds-Reben. Schwarze Teufels Kirschen. Bryonien.  
Loef. Fl. Bor. p. 29.

Im Gräfl. Garten zu Wilkienen copiose.

## TRIPETA-



# TRI PETALOIDAE.

## ALISMA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 36. Gouan H. R. M. p. 189.*

418.

**A**lisma foliis ovatis, acutis, fructibus obtusetrigonis.

Linnaei Spec. Pl. p. 392.

Plantago aquatica latifolia. C. B. P. p. 190.

Plantago aquatica. Tab. l. 2. p. 411.

Breitblättriges Wasser: Wegerich. Loef. Fl. Bor. p. 199.

In paludibus passim.

419.

Alisma siue

Plantago aquatica λεπτομακροφυλλος. Wasser: Wegerich, mit langen schmalen Blättern. Loef. Fl. B. p. 199.

Im Pregel passim.

## BYTOMVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 403. Gouan. H. R. M. p. 202.*

420.

Butomus. Linn. Spec. Pl. p. 352.

Iuncus floridus major. C. B. P. p. 112.

Gladiolus aquatilis. Dod. Pempt. p. 600.

Calamogrostis II. Tragi. Seb. in Trag. p. 537.

Butomus flore roseo. Tourn. Inst. p. 271.

Vinzen; Schwertel. Loef. Fl. Bor. p. 130.

In palustribus passim bey Königsberg.



# I V N C O I D E A E.

## I V N C V S.

*Linn. Gen. Plant. nr. 349. Gouan. H. R. M. p. 182.*

421.

**I**uncus culmo nudo striato, capitulo laterali. Linn. Sp. Pl. p. 326.

Iuncus

*Iuncus laevis* panicula non sparfa. C. B. P. p. 131.

Glatte Wasser: Binzen. Loef. Fl. Bor. p. 131.

Tourn. Inst. p. 246.

Passim in uliginosis.

422.

*Iuncus culmo nudo, acuminato, ad basin squamato, foliis pedunculatis.* Linn. Sp. Pl. p. 326.

*Iuncus laevis* panicula sparfa. C. B. P. p. 12.

Glatte Wensher, oder Wasser: Binsen mit ausgebreiteten Büschen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 39. nr. 227.

Circa argilofodinas saepe obuius.

423.

*Iuncus culmo nudo, foliis setaceis, capitulis glomeratis, aphyllis.* Linn. Sp. Pl. p. 327.

Gramen junceum foliis et spica junci. C. B. P. p. 5.

Gramen junceum, semine acuminato. Binzen: Graß mit schwarz gespizten Saamen. Loef. Fl. Bor. p. 115.

In den Wäldern am Wege.

424.

*Iuncus foliis nodoso-articulatis.* Linn. Sp. Pl. p. 327.

*Iuncus foliis articulosus, floribus umbellatis.* Tourn. Inst. p. 247.

Gramen junceum, folio articulado, aquaticum. C. B. P. p. 5.

Binsen: Graß mit ausgewachsenen Büschen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 39. nr. 225. Loef. Fl. Bor. p. 114.

425.

*Iuncus foliolis articulosis, floribus umbellatis, (sine utriculis.)* Tourn. Inst. p. 247. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 39. 226.

In pratis humidioribus circa autumnus tempora.

426.

*Iuncus culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis, sessilibus.* Linn. Spec. Pl. p. 328.

*Iuncus palustris humilior, erectus.* Tourn. Inst. p. 246.

Gramen nemorosum, caliculis paleaceis. C. B. P. p. 7.

Gramen

Gramen-juncum. VI. Tab. I. 1. p. 518.

Krotten: Graß. Voggen: Graß. Loef. Fl. Bor. p. 115.

In der Hollengrund passim.

427.

Iuncus foliis planis pilosis, corymbo ramoso. Linn. Spec. Plant. p. 329.

Gramen hirsutum latifolium, majus. C. B. P. p. 7.

Iuncus nemorosus latifolius, major. Tourn. Inst. p. 246.

Gramen hirsutum nemorosum, Lobelii. Loef. Fl. Bor. p. 113.

Gramen syluaticum. IV. Tab. I. 1. p. 520.

Wald: Stechel: Graß.

## PARIS.

Linn. Gen. Pl. nr. 396. Gouan. H. R. M. p. 200.

428.

Paris. Linn. Spec. Pl. p. 367.

Herba Paris. Dod. Pempt. p. 444. Tourn. Inst. p. 234.

Solanum quadrifolium bacciferum. C. B. P. p. 167.

Wolfs: Beer. Loef. Fl. Bor. p. 257.

Im Ponartschen Walde.



## IRIDES.

### IRIS.

Linn. Gen. Pl. nr. 49. Gouan. H. R. M. p. 25.

429.

Iris corollis barbatis, caule foliis longiore, multiflora. Linn. Spec. Pl. p. 38.

Iris vulgaris siue Sylvestris. C. B. P. p. 30. Tourn. Inst. p. 358.

Blau lilgen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 38. nr. 223.

Crescit in der-Johannsburgschen Wildniß im Weissbun.

G

430.

430.

- *Iris corollis imberbibus, petalis interioribus, stigmate minoribus, foliis ensiformibus.* Linn. Spec. Pl. p. 38.

*Acorus adulterinus.* C. B. P. p. 34.

*Iris palustris lutea.* Tourn. Inst. p. 361.

Geel Wasser: Lilien. Loef. Fl. Bor. p. 6.

In der Hollengrund.

431.

*Iris (Sibirica) corollis imberbibus, germinibus trigonis, caule tereti, foliis linearibus.* Linn. Spec. Pl. p. 32.

Kleine blaue Wiesen: Schwertel. Loef. Fl. Bor. p. 130.

Bei dem Ponartschen Walde circa margines pratorum.

## GLADIOLVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 47. Göttan H. R. M. p. 25.*

432.

*Gladiolus foliis ensiformibus, floribus distantibus.* Linn. Spec. Plant. p. 36.

*Gladiolus floribus uno versu dispositis.* C. B. P. p. 41.

*Victorialis rotunda et gladiolus verus.* Gesn. Hort. p. 286.

260.

*Xiphion Spatha seu segitalis gladius.* Ruell. p. 589.

Runde Siegwurz. Allermannharnisch. Loef. Fl. Boruss. p. 105.

Ad sylvarum declivi loco siturum margines bei Königsberg.

## ACORVS.

*Linn. Gen. Plant. nr. 346. Göttan H. R. M. p. 182.*

433.

*Acorus.* Linn. Spec. Pl. p. 324.

*Acorus verus, siue Calamus Aromaticus Officinarum.* C. B. P. p. 34.

Akerwurz. Calmus. Loef. Fl. Bor. p. 5.

Zu Brandenburg am Hase. Bei Königsberg am Pregel copiose.

LILIVM.

## LILIVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 329. Gouan. H. R. M. p. 169.*

434.

*Lilium foliis sparsis, subulatis, floribus reflexis, corollis revolutis. Linn. Spec. Pl. p. 302.*

*Lilium floribus reflexis, alterum. C. B. P. p. 78.*

*Lilium montanum, siue filuestre primuin majus, Clus. H. l. 2. p. 134.*

*Lilium Saracenicum. Tab. L. 2. p. 334.*

*Berglilien. Goldwurz. Loef. Fl. Bor. p. 140.*

*In der Osterrodschen Heide. Bey Rastenburg und im Walsche bey Neuhoff.*


435.

*Lilium foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis reuolutis. Linn. Spec. Pl. p. 303.*

*Lilium floribus reflexis alterum, lanugine hirsutum. C. B. P. p. 78.*

*Goldwurz. Loef. Flor. Boruss. p. 140.*

*In der Osterrodschen Heide.*



## CORONARIAE.

## ORNITHOGALVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 338. Gouan. H. R. M. p. 171.*

436.

**O***rnithogalum scapo anguloso, diphylo, pedunculis umbellatis, simplicibus. Linn. Sp. Pl. p. 306.*

*Ornithogalum luteum. C. B. P. p. 186. Matth. deutsch. p. Tab. l. 2. p. 321.*

*Bulbus agrestis Tragi. Cam. Hort. p. 321.*

*Kleine Erd-Nuß. Ziegenlauch. Loef. Fl. Bor. p. 186.*

*In der Hollengrund.*

G 2

ALLIVM,

## ALLIVM.

*Linn. Gen. Pl. m. 326. Gouan. H. R. M. p. 166.*

437.

*Allium* scapo nudo semicylindrico, foliis lanceolatis, petiolatis, umbella fastigiata. Linn. Sp. Pl. p. 300.

*Allium* ursinum. Bauh. in Matth. p. 173.

*Allium* sylvestre latifolium. C. B. P. p. 74. De Alliis videtis Hall. Opusc. Bot. p. 331. et seqq.

Wald; Knoblauch. Hunde; Knoplauch. Loef. Fl. Bor. p. 8. Hinter Lattenwalbe.

438.

*Allium* caule tereti, folio umbellifero, umbella globosa, staminibus subulatis. Linn. Spec. Pl. p. 298.

*Allium*, siue montanum IV Clus. H. rar. Pl. l. 2. p. 193. In montosis.

439.

*Allium* caule teretifolio umbellifero, foliis semiteretibus, staminibus tricuspидatis, corolla longioribus. Linn. Sp.

Pl. p. 297. Gmel. Sib. 1. p. 56. Tab. 13 et 14. Fig. 1.

*Allium* montanum capite rotundo. C. B. P. p. 75.

Berg; Knoblauch mit runden purpurfarbenen Köpflein. Loef. Fl. Bor. p. 9.

In der Hollengrund.

440.

*Allium* caule planifolio, umbellifero, staminibus tricuspидatis, radice tunicata. Linn. Spec. Pl. p. 295.

*Porrum* commune capitatum. C. B. P. p. 72.

Winterlauch. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 55. nr. 327.

In hortis rusticis.

## ANTHERICVM.

*Linn. Gen. Plant. no. 336. Gouan. H. R. M. p. 175.*

441.

*Anthericum* foliis planis scapo simplicissimo. Linn. Sp. Pl. p. 310.

Phalan-


## CORONARIAE.

101

Phalangium non ramosum. Dod. Pempt. p. 106. Tab. I. 1.  
p. 546.

Phalangium paruo flore, non ramosum. C. B. P. p. 193.  
Dhnästiges Erd: Spinnen: Kraut. Groß Lilgen. Loef. Fl.  
Bor. p. 193.

Inter Ericeta hinter Brandenburg.



## PARASITICÆ DVBIÆ.

### CVSCVTA.

Linn. Gen. Pl. nr. 124. Goëan. H. R. M. p. 74.

442.

Cuscuta floribus sessilibus. Linn. Sp. Pl. p. 124.

Cuscuta major. C. B. P. p. 210. Tourn. Inst. p. 652.

Androsaces vulgo Cuscuta Tragi. Kyp. in Trag. p. 810.

Silz: Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 59.

Ben Königsberg passim.



## CICHORACEAE.

### TRAGOPOGON.

Linn. Gen. Pl. nro. 749. Goëan. H. R. M. p. 104.

443.

Tragopogon calycibus, corollae radium aequantibus, foliis integris strictis. Linn. Spec. Pl. p. 789.

Tragopogon pratense luteum majus. C. B. P. p. 270.

Tragopogon Fuchsf. p. 827. Tourn. Inst. p. 477.

Wocksbart. Loef. Fl. Bor. p. 270.

Am Kneiphöfischen Walle.

444.

Tragopogon luteum abortivum. Loef. Fl. Bor. p. 270.

Am Kneiphöfischen Walle.

G 3

SCORZO-



## SCORZONERA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 748. Gouan. H. R. M. p. 405.*

445.

*Scorzonera caule subnudo, unifloro, foliis nervosis, planis.*

*Linn. Spec. Plant. p. 790.*

*Scorzonera foliis nervosis. C. B. P. p. 275. Tourn. Inst. p. 259.*

*Scorzonera Germanica angustifolia. Tab. I. 2. p. 299.*

*Schlange: Morb und Matter: Milch. Loef. Fl. Bor. p. 248.*  
*Benm Donartschen Walde.*

## SONCHUS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 751. Gouan. H. R. M. p. 406.*

446.

*Sonchus pedunculis tomentosis, calycibus glabris. Linn. Spec. Plant. p. 794.*

*Sonchus laevis laciniatus latifolius. C. B. P. p. 124.*

*Sonchus non aspera. Fuchf. p. 675.*

*Haaßen: Kobl. Loef. Fl. Bor. p. 259.*

*Inter segetes.*

447.

*Sonchus laevis minor paucioribus laciniis. C. B. P. p. 124.*

*Sonchus laevis latifolius, siue III. Tab. I. 1. p. 481.*

*Breiter Haßen: Kobl. Loef. Fl. Bor. p. 259.*

448.

*Sonchus laevis lanceatus, acutifolius. Loef. Fl. Bor. p. 258.*

*Sonchen: Kraut mit spizigen absätzigten Blättern.*

*Zu Brandenburg am Frisching.*

449.

*Sonchus asper laciniatus et non laciniatus. C. B. P. p. 124.*

*Sonchus asper. Tab. I. 1. p. 480.*

*Saubistel. Loef. Fl. Bor. p. 258.*

*Inter segetes.*

450.

*Sonchus asper laciniatus, latifolius. Loef. Fl. Bor. p. 257.*

*Saudi:*

**Saubistel mit breiten zerschnittenen Blättern.**  
Inter segetes.

451.

*Sonchus asper laciniatus angustifolius*. Loef. Fl. Bor. p. 258.

**Saubistel mit schmalen zerschnittenen Blättern.**

**Unter dem Getreide bey Laßten.**

452.

*Sonchus laevis, laciniatus, latifolius, flore ex luteo-albescente*. Weißlicht Haasen Kohl. Helw. Suppl. Fl. Bor.

p. 63. nr. 382.

**In den Kohlgartens.**

L A P S A N A.

*Linn. Gen. Pl. no. 752. Gouan. H. R. M. p. 417.*

453.

*Lapsana calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus, ramosissimis*. Linn. Spec. Plant. p. 811.

*Soncho affinis Lapsana syluatica*. C. B. P. p. 125.

**Wild Sonchen-Kraut.** Loef. Fl. Bor. p. 259.

**Im Ponartschen Walde.**

P R E N A N T H E S.

*Linn. Gen. Pl. nr. 738. Gouan H. R. M. p. 409.*

454.

*Prenanthes flosculus, quinis, foliis lyrato-hastatis*. Linn. Spec. Plant. p. 797.

*Sonchus laevis laciniatus, muralis, parvis floribus*. C. B. P. p. 124. Cam. in Matth. p. 149.

*Sonchus laevis vulgator* II. Clus. H. R. l. 2. p. 136.

**Wild Sonchen-Kraut.** Loef. Fl. Bor. p.

**In umbrosis beyrn Ponartschen Walde.**

L E O N T O D O N.

*Linn. Gen. Pl. nr. 747. Gouan. H. R. M. p. 410.*

455.

*Leontodon, calyce toto, erecto, hispido, foliis hispidis, dentatis integerrimis*. Linn. Spec. Pl. p. 799.

G 4

Hiera-

*Hieracium dentis leonis folio, hirsutiae asperum, minus laciniatum.* C. B. P. p. 799.

*Wegwarten Habichtskraut.* Loef. Fl. Bor. p. 126.

*Ben lautenmühl inter fruticeta.*

456.

*Leontodon calyce inferne reflexo.* Linn. Sp. Pl. p. 798.

*Dens leonis latiore folio.* C. B. P. p. 126.

*Taraxacon Officinarum.*

*Caput Monachi.* Matth. Deutsch. p. 209.

*Pfaffenblat, oder Röhrleins Kraut.* Loef. Fl. Bor. p. 61.

*Ben Königsberg passim.*

457.

• *Leontodon calyce toto erecto, hispido, foliis hispidis, dentatis, integerrimis.* Linn. Spec. Pl. p. 799.

*Hieracium dentis leonis folio, hirsutiae asperum, minus laciniatum.* C. B. P. p. 127.

*Dens leonis foliis hirsutis et asperis, saxatilis.* Tourn. Inst. p. 468.

*Löwen; Zahn. Raupes Röhrlein; Kraut.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 18. nr. 97.

*Inter frutices.*

458.

*Leontodon siue*

*Dens leonis, foliis canescentibus, villosis.* Tourn. I. p. 468.

*Hieracium montanum, angustifolium, foliis cichoraceis.*

Tab. I. 1. p. 477. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 18. nr. 98.

459.

*Leontodon siue*

*Dens leonis, Alpinus, minor, glaber.* Helw. Suppl. Fl.

Bor. p. 18. nr. 99.

## HIERACIUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 741. Gouan H. R. M. p. 412.*

460.

• *Hieracium foliis integerrimis, ovatis, caule repente, scapo unifloro.* Linn. Spec. Pl. p. 800.

Pilosel-

*Pilosella major*, repens, hirsuta. C. B. P. p. 262.

*Pilosella*. Matth. deutsch. p. 405.

*Pilosella*, *Auricula muris*. Lob. Adv. p. 200.

Mäuß; Dehrlein. Loef. Fl. Bor. p. 193.

Passim in incultis.

461.

*Hieracium foliis integris, ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo, multifloro*. Linnaei. Spec. Plant. p. 800.

*Pilosella major repens*, minus hirsuta. C. B. P. p. 262.

*Auricula muris minor*, secunda Tragi. Seb. in Trag. p. 221.

Das andere Mäuß; Dehrlein. Loef. Fl. Bor. p. 194.

In collibus hinter dem Altstädtschen Walle nach der Hollengrund zu.

462.

*Hieracium foliis ovatis, subdentatis, scapo nudo, racemoso, floribus superioribus, primoribus*. Linn. Sp. Plant. p. 801.

*Pilosella major*, erecta. C. B. P. p. 262.

*Pilosella major altera*. Tab. l. 1. p. 262.

Groß gerades Mäuß; Dehrlein. Loef. Fl. Bor. p. 193.

In der Hollengrund.

463.

*Hieracium caule ramoso, foliis radicalibus, ovatis, dentatis, caulino minori*. Linn. Sp. Pl. p. 802.

*Hieracium murorum, laciniatum, minus pilosum*. C. B. P. p. 129.

*Pulmonaria Gallica foemina*. Tab. l. p. 505.

Berg-Habichtskraut mit gezähnten Blättern und grosser Blüt. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 34. nr. 201.

464.

*Hieracium foliis linearibus, subdentatis, sparsis, floribus subumbellatis*. Linn. Sp. Pl. p. 804.

*Hieracium angustifolium majus*. C. B. P. p. 129. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 34. nr. 202.

In fruticetis.

G 5

465.

465.

*Hieracium fruticosum*, angustis foliis non dentatis, est prioris varietas. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 34. nr. 203.

466.

*Hieracium caule ramoso*, foliis radicalibus ovatis, dentatis, caulino minori. Linn. Sp. Pl. p. 802.

*Hieracium murorum*, folio pilosissimo. C. B. P. p. 129.

*Hieracium montanum hirsutum*, ramosum. L. Fl. B. p. 125.

In der Hollengrund.

467.

*Hieracium caule paniculato*, foliis amplexicaulibus, dentatis, glabris, calycibus hispidis. Linn. Sp. Pl. p. 803.

*Hieracium montanum latifolium glabrum minus*. C. B. P. p. 129.

Klein Berg: Habicht: Kraut, mit breiten unrauben Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 126.

In der Hollengrund.

468.

*Hieracium Alpinum*, latifolium, hirsutie incanum, flore magno. C. B. P. p. 128.

*Hieracium phlomoïdes*. Loef. Fl. Bor. p. 125.

Zu Quednau in monte Apollinis.

469.

*Hieracium montanum latifolium*, non sinuatum. Loef. Flor. Bor. p. 125.

Bei Gerdaunen am Berge nach dem alten Hofe zu.

## CREPIS.

Linn. Gen. Pl. nr. 742. Gouan H. R. M. p. 413.

470.

*Crepis foliis pinnato-hastatis*, scabris, basi superne dentatis, calycibus muricatis. Linn. Sp. Pl. p. 807.

*Hieracium chondrillae folio*, glabrum. C. B. P. p. 127.

Unraubes Habicht: Kraut mit Wegbreit Blätter. Loef. Fl. Bor. p. 125.

In sabulosis passim.

471.

471.

*Crepis foliis hastato-lyratis, caule piloso.* Linn. Spec. Pl. p. 807.

*Hieracium chondrillae folio hirsutum.* C. B. P. p. 127.

*Hieracium* II. Tab. I. 1. p. 473.

**Klein Habichtskraut.** Loef. Fl. Bor. p. 124.

**Am Kneiphösschen Walle passim.**

## HYPOCHAERIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 744. Gouan H. R. M. p. 416.*

472.

*Hypochaeris caule subnudo, ramo, solitario, foliis ovato-oblongis, integris, dentatis.* Linn. Sp. Pl. p. 810.

*Hieracium Alpinum, latifolium, hirsutiae incanum, maculatum flore magno.* C. B. P. p. 128.

*Hieracium Pannonicum latifolium.* I. Clus. H. 1. 2. p. 139.

**Wildhabichtskraut mit rauhen, breiten und fleckichten Blättern, wie auch grosser Blüt.** Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 33. nr. 198.

**In der Heide.**

473.

*Hypochaeris glabra, calycibus oblongis, imbricatis, caule nudo, foliis dentato-sinuatis.* Linn. Sp. Pl. p. 811.

*Hieracium minus, dentis leonis folio, oblongo, glabro.* C. B. P. p. 127.

**Unrauhes Habichtskraut mit Wegwart Blättern.** Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 33. nr. 193.

474.

*Hypochaeris folio dentato-sinuatis, scabris, caule ramoso nudo, pedunculis squamosis.* Linn. Sp. Pl. p. 811.

*Hieracium dentis leonis folio, obtuso, majus.* C. B. P. 127.

**Klein Habichtskraut mit stumpfen Pfaffen: Köhrleins Blättern.** Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 63. nr. 197.

CICHORIVM.

## CICHORIVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 753. Gouan H. R. M. p. 418.*

475.

- *Cichorium caule simplicì, foliis dentato-sinuatis.* Linn. Sp. Pl. p. 813.

*Cichorium sylvestre seu officinarum.* C. B. P. p. 125.*Intybus sylvestris.* Cam. Ep. p. 285. Fuchf. H. p. 979.*Wegwart. Verfluchte Jungfrau.* Loef. Fl. Bor. p. 47.*Hinter dem Kneiphöfsschen Walle.*

476.

*Cichorium sylvestre, flore coerulesc, duplici petalorum serie.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 13. nr. 66.

## CINAROCEPHALÆ.

## ARCTIVM.

*Linn. Gen. Pl. nro. 760. Gouan. H. R. M. p. 420.*

477.

- *Arctium foliis cordatis, inermibus, petiolatis.* Linnæi. Spec. Plant. p. 816.

*Lappa major, siue Arctium Dioscoridis.* C. B. P. p. 198.*Personatia.* Matth. deutsch. p. 506.*Lappa major, purpurea* **Grosse Kletten mit purpurfarbenen Blumen.** Loef. Fl. Bor. p. 136. *Bardana Off.**Passim.*

478.

*Arctium, siue**Lappa major candida.* **Große Klette mit weissen Blumen.**

Loef. Fl. Bor. p. 137.

**Am Wege nach dem Dorf Isafen.**

## SERRATVLA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 761. Gouan. H. R. M. p. 420.*

479.

*Serratula foliis dentatis, spinosis.* Linn. Sp. Pl. p. 820.*Cardu-*

*Carduus in auena proueniens.* C. B. P. p. 377.

*Haber: Distel.* Loef. Fl. Bor. p. 34.

*Inter segetes.*

480.

*Serratula siue*

*Carduus in auena proueniens flore roseo.* C. B. P. p. 377.

*Cirsium aruenſe foliis laciniatis, flore roseo.* *Haber: Distel*  
mit Rosenfarber Blüt. Helw. Suppl. Fl. B. p. 13, nr. 70.

*In dem neuen Wege nach Reussen.*

481.

*Serratula siue*

*Cirsium polycephalon, alato caule, foliis sinuatis.* Tourn.  
Inst. p. 448.

*Wiesen: Distel mit breiten Blättern.* Helw. Suppl. Flor.  
Bor. p. 14. nr. 17.

## ONOPORDUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 762. Gössan. H. R. M. p. 424.*

482.

*Onopordum calycibus squarrosis, foliis ouato-oblongis,*  
*sinuatis.* Linn. Spec. Plant. p. 827.

*Spina alba tomentosa latifolia sylvestris.* C. B. P. p. 180.

*Acanthium vulgare, flore purpureo.* Tab. l. 2. p. 360.

*Weisse Wege: Distel.* Loef. Fl. Bor. p. 261.

*Benm Brandenburgſchen Schloß. Ben Freystadt magna*  
*in copia.*

## CARLINA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 766. Gössan H. R. M. p. 425.*

483.

● *Carlina caule uniflora, flore breuiore.* Linn. Sp. Pl. p. 818.

*Carlina acaulos magno flore.* C. B. P. p. 380.

*Chamaeleon albus.* Clus. H. l. 2. p. 155.

*Ebermurg.* Loef. Fl. Bor. p. 35.

*In der Osterrodiſchen, hinter dem Schilling, gegen Wer-*  
*ſitten über.*

484.



484.

*Carlina caule multifloro, corymboso, floribus terminalibus.* Linn. Sp. Pl. p. 828.

*Cnycus sylvestris spinosior.* C. B. P. p. 378.

*Wilder Feld; Safran.* Loef. Fl. Bor. p. 50.

*In locis montanis et aridioribus, bey Quednau.*

### HELIANTHVS.

*Linn. Gen. Plant. nr. 802. Göttan. H. R. M. p. 455.*

485.

*Helianthus foliis ovato-cordatis: nervis intra folium incisis*  
Linn. Sp. Pl. p. 905.

*Helianthemum Indicum taberosum.* C. B. P. p. 277.

*Batata canadensis Parkinsonii.* Erd; Artschoffen. Helw. Fl.  
Quasim. p. 32.

*In pluribus hortis Angerburgensibus absque cultura crescit.*

### CENTAVREA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 805. Göttan. H. R. M. p. 457.*

486.

*Centaurea calycibus recurvato-plumosis, foliis indivisis.*  
Linn. Sp. Pl. p. 910.

*Iacea latifolia capite hirsuto.* C. B. P. p. 129.

*Iacea flore purpureo.* Loef. Fl. Bor. p. 129.

*Weisse Weg; Distel.* Loef. Fl. Bor. p. 129.

*Bey dem Ponartschen Walde.*

487.

*Centaurea siue*

*Iacea latifolia, capite hirsuto, flore albo.* Weißblühende  
Pfulcken; Blum mit haarichten Köpfen. Loef. Fl. Bor.  
p. 129.

*Hinter der Lebenichtschen Wind; Mühle vor dem Sackheimschen Thore.*

488.

\* *Centaurea calycibus ferratis, foliis linearibus, integerrimis, infimis dentatis.* Linn. Sp. Pl. p. 911.

Cyanus

Cyanus Segetum. C. B. P. p. 273.

Blauer Korn; Blum. Loef. Fl. Bor. p. 59.

Inter Segetes.

489.

Centaurea siue

Cyanus segetum disco coeruleo, cum corona candida.

Tourn. Inst. p. 446. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 16. nr. 81.

490.

Centaurea siue

Cyanus segetum, disco carneo, cum corona candida:

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. nr. 82.

491.

Centaurea siue

Cyanus segetum, disco purpurascens, cum corona coerulea.

Tourn. Inst. p. 446. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 16. nr. 83.

492.

Centaurea siue

Cyanus segetum, flore dilute lanthino. Tourn. Inst. p. 446.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 17. nr. 84.

493.

Centaurea siue

Cyanus segetum florum disco et media corona albis, extre-

mitatibus coronae coeruleis. Helw. Suppl. Fl. B. p. 17.  
nr. 85.

494.

Centaurea calicibus margine ciliatis, foliis pinnatifidis,

pinnis lanceolatis. Linn. Sp. Pl. p. 913.

Scabiosa major, squamatis capitulis. C. B. P. p. 913.

Scabiosa major. Matth. deutsch. p. 405.

Große braune Scabiosen. Loef. Fl. Bor. p. 246.

Secus vias et salebrosas. passim.

495.

Centaurea siue

Scabiosa major, squamatis capitulis, flosculis candidissi-

mis. Groß weiß Scabiosen. Loef. Fl. Bor. p. 246.

Im Dorf Sarschau.

496.

496.

*Centaurea calycibus pinnatis* : squamula ovata: cilibus capillaribus, erectis. Linn. Sp. Pl. p. 911.

*Iacea nigra squamoso capite major.* C. B. P. p. 128.

Groß schwarz; Pflockenblum mit schuppichten Köpfen. Loef. Fl. Bor. p. 128.

Passim in locis siccioribus.

497.

*Centaurea siue*

*Iacea nigra squamoso capite, flore nigro.* Loef. Fl. Bor. p. 128.

Hinter Germau am Berge.

498.

*Centaurea calycibus squamosis, foliis lanceolatis: radicalibus sinuato dentatis, ramis angulatis.* Linn. Spec. Pl. p. 914.

*Iacea laciniata squamata.* C. B. P. p. 271. Loef. Fl. Bor. p. 129.

Ben Lauten; Mühl circa vias.

499.

*Centaurea siue*

*Iacea vulgaris laciniata, seu Centaureum collinum, floribus incarnatis.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 36. nr. 213.

500.

*Centaurea siue*

*Iacea capitulo squamoso minor, foliis integris, nervosis, flore candido.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 36. nr. 214.

501.

*Centaurea siue*

*Iacea calyculis argenteis minor, floribus candidis.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 36. nr. 215.

Auf den Replischen Seebergen.

502.

*Centaurea siue*

*Iacea calyculis argenteis, flore vario, uno scilicet purpureo, reliquis candidis.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 36. nr. 216.

503.

503.

Centaurea siue

Iacea calyculis argenteis, disco albo, corona purpurea.

Helw, Suppl. Fl. Bor. p. 36. nr. 217.

## C O R Y M B I F E R A E.

## A C H I L L A E A.

Linn. Gen. Pl. nr. 794. Gouan H. R. M. p. 452.

504.

♣ **A**chillea foliis lanceolatis, acuminatis, argute serratis,  
Linnaei. Spec. Pl. p. 898.

Dracunculus pratensis, tetrato folio. C. B. P. p. 98.

Tanacetum album acutum. Tab. l. 2. p. 454.

Wilber Bertram. Loef. Fl. Bor. p. 65.

In pratis siccioribus bey der Altstädtschen Ziegelscheune.

505.

♣ **A**chillea foliis bipinnatis, nudis, laciniis linearibus, dentatis. Linn. Sp. Pl. p. 899.

Millefolium vulgare album. C. B. P. p. 140.

Stratiotes millefolia. Fuchf. p. 727.

Weisse gemeine Schaafgarb. Loef. Fl. Bor. p. 164.

Am Wege nach dem Dorf Laseken.

506.

Achillea siue

Millefolium purpureum. Tab. l. 1. p. 463.

Millefolium vulgare purpureum minus. C. B. P. p. 140.

Purpurrothe Schaafgarb. Loef. Fl. Bor. p. 164.

Am Kneiphöfischen Walle nach dem Brandenburgischen Thore zu.

## S I V M.

Linn. Gen. Pl. nr. 269. Gouan. H. R. M. p. 142.

507.

Sium foliis pinnatis, umbella terminali. Linn. Sp. Pl. p. 251.

H

Sion

Sion siue Apium palustre foliis oblongis. C. B. P. p. 154.  
 Wasser: Eywich. Loef. Fl. Bor. p. 255.  
 Im Landgraben hinter Selnicken.

## TANACETVM.

Linn. Gen. Pl. nro. 773. Gouan H. R. M. p. 432.

508.

• Tanacetum foliis bipinnatis, incis, ferratis. Linn. Sp. Pl. p. 844.

Tanacetum vulgare luteum. C. B. P. p. 132.

Artemisia monoclonos. Fuchf. H. p. 56.

Reinfarn Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 165.

In der Hollengrund.

509.

Tanacetum foliis crispis. C. B. P. p. 132.

Tanacetum cristatum, Anglicum. Lob. Adv. p.

Krause gelbe Reinfarn. Loef. Fl. Bor. p. 166.

Ben Laptau.

510.

Tanacetum foliis ouatis, integris, ferratis. Linn. Spec. Pl. p. 845.

Menta hortensis corymbifera. C. B. P. p. 226.

Frauen oder Marien: Münz. Pfannkuchen: Kraut. Mar-  
 rien: Blätter. Helw. Fl. Quasim. p. 37.

## EUPATORIVM.

Linn. Gen. Pl. nro. 772. Gouan, H. R. M. p. 429.

511.

• Eupatorium foliis digitatis. Linn. Sp. Pl. p. 838.

Eupatorium Cannabinum. C. B. P. p. 320.

Eupatorium Cannabium flore purpureo. Loef. Fl. Boruss.  
 p. 70.

Wasser: Dost mit purpurfarbenen Blumen. Runigund:  
 Kraut.

In uliginosis bey der Hollengrund.

512.

512.

*Eupatorium cannabinum* flore albo. Weisser Wasser-Dost.

Loef. Fl. Bor. p. 71.

In der Hollengrund.

**T V S S I L A G O.**

*Linn. Gen. Pl. nr. 783. Gouan H. R. M. p. 438.*

513.

♣ *Tussilago*, scapo imbricato, unifloro, foliis subcordatis, angulatis, denticulatis. Linn. Sp. Pl. p. 865.

*Tussilago vulgaris*. C. B. P. p. 275.

*Tussilago*. Clus. H. Rar. p. 140.

Huff: Lattich. Loef. Fl. Bor. p. 275.

Secus fontes et fossarum margines passim.

514.

♣ *Tussilago thyrso ovato*, flosculis omnibus, hermaphroditicis. Linn. Sp. Pl. p. 866.

*Petasites major et vulgaris*. C. B. P. p. 167.

Grosse gemeine Pestilenz; Wurz. Loef. Fl. Bor. p. 192.

Ben der Neuhauschen Mühle. In Steinbeck am Bach.

515.

*Tussilago thyrso fastigiato*, flosculis foemineis, nudis, paucis. Linn. Sp. Pl. p. 866.

♣ *Petasites minor*. C. B. P. p. 197.

Kleine Pestilenz; Wurz. Loef. Fl. Bor. p. 193.

Am frischen Hase copiose.

**S E N E C I O.**

*Linn. Gen. Plant. nr. 786. Gouan. H. R. M. p. 439.*

516.

*Senecio corollis nudis*, pinnato-sinuatis, amplexicaulibus, floribus sparsis. Linn. Sp. Pl. p. 867.

*Senecio minor vulgaris*. C. B. P. p. 13. Tourn. Inst. p. 456.

Kreuz; Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 252.

Ubique in hortis.

517.

*Senecio corollis radiantibus; foliis pinnato-lyratis: laciniis laciniatis, caule erecto.* Linn. Sp. Pl. p. 870.

*Iacobaea vulgaris laciniata.* C. B. P. p. 131.

*Herba S. Iacobi.* Fuchf. Hist. p. 742.

*St. Jacobs Kraut.* Loef. Fl. Bor. p. 129.

In agrorum marginibus passim.

518.

*Senecio seu*

*Iacobaea, Barbareae folio instar laciniata.* Loef. Fl. Bor. p. 129.

Ben dem Zoll-Hause auf der Wiese.

519.

*Senecio siue*

*Iacobaea, disco luteo, corona alba.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 37. nr. 218.

Auf dem Brozowschen Felde.

520.

*Senecio siue*

*Iacobaea Senecionis folio, incano, perennis.* Tourn. Inst. p. 486. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 37. nr. 219.

In arenosis auf den Kehlischen und Ogonschen Feldern.

521.

*Senecio pinguis incanus.* C. B. P. p. 131.

*Iacobaea Pannonica.* Clus. H. l. 1. p. 21.

*Wollicht Kreuz-Kraut.* Helw. Suppl. Fl. Boruss. p. 37. nro. 220.

Ben Danzig.

522.

• *Senecio corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis, ferratis, glabriusculis.* Linnaei. Spec. Plant. p. 871.

*Virga aurea angustifolia; ferrata.* C. B. P. p. 268.

*Solidago Saracenica.* Fuchf. H. p. 728. Dod. Pemp. p. 141.

*Heidnisch Wund-Kraut.* Loef. Fl. Bor. p. 286.

Zur Kobbelhude am Frisching.

523.

523.

Senecio siue

Virga aurea, Solidago faracenic dicta, latifolia, ferrata.

Groß Heidnisch Wund; Kraut mit breiten Blättern.

Loef. Fl. Bor. p. 286.

INULA.

Linn. Gen. Pl. nr. 1066. Gössan. H. R. M. p. 444.

524.

• Inula foliis ouatis, rugosis, subtus tomentosis, calycum squamis ouatis. Linn. Sp. Pl. p. 881.

Helenium vulgare. C. B. P. p. 176. Tourn. Inst. p. 482.

Enula Campana. Brunf. Tom. III. p. 100.

Wlant; Wurj. Loef. Fl. Bor. p. 123.

In pagis ad sepes hortorum passim.

525.

Inula foliis undulatis, amplexicaulibus, caule prostrato.

Linn. Sp. Pl. p. 882.

Conyza minor, flore globofo. C. B. P. p. 266.

Conyza minima. Dod. Pempt. p. 52.

Conyza minor. Matth. deutsch. p. 365.

Aster palustris, paruo flore, globofo. Tourn. Inst. p. 483.

Kleine Dürmury. Kröstienden; Kraut. Loef. Fl. Boruff.

p. 53.

In locis irriguis.

526.

Inula foliis lanceolatis, recuruis, ferrato-ciliatis, floribus solitariis, ramis angulatis. Linn. Sp. Pl. p. 882.

Aster montanus luteus, salicis glabro folio. C. B. P. p. 266.

Wolffertley. Loef. Fl. Bor. p. 21.

Ben. Wispdehlen im Gerdauschen am Berge.

527.

Inula foliis lanceolatis, semiamplexicaulibus, hispidis, caulibus subunifloris, teretibus. Linn. Sp. Pl. p. 883.

Aster luteus, hirsuto, salicis folio. C. B. P. p. 266.

H 3

Gelsb



Gelb Weidenblättrich, rauhes Sternkraut mit gelben Blumen. Loef. Fl. Bor. p. 21.

Bei Bladau am Teich.

## SOLIDAGO.

*Linn. Gen. Pl. nr. 781. Gouan. H. R. M. p. 445.*

528.

• *Solidago caule subflexuoso, angulato, racemis paniculatis, erectis, confertis.* Linn. Sp. Pl. p. 880.

*Virga aurea latifolia, ferrata.* C. B. P. p. 268. Tourn. Inst. p. 484.

Gulden Bundeckraut mit breiten Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 287.

In monte Apollinis hinter Quednau.

## ERIGERON.

*Linn. Gen. Pl. nr. 782. Gouan. H. R. M. p. 437.*

529.

*Erigeron pedunculis alternis, unifloris.* Linn. Sp. Pl. p. 863.

*Conyza coerulea aeris.* C. B. P. p. 52. Tab. L. 1. p. 532.

*Aster atticus coeruleus minor.* Tourn. Inst. p. 481.

Scharfe blaue Dürrenwurz. Loef. Fl. Bor. p. 52.

In locis arenosis et petrosis bei Königsberg. Im Löwenhagenschen Widdem: Garten.

## BELLIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 795. Gouan. H. R. M. p. 447.*

530.

*Bellis scapo nudo.* Linn. Sp. Pl. p. 886.

*Bellis sylvestris minor.* C. B. P. p. 267.

*Bellis sylvestris.* Dod. Pempt. p. 265. Tourn. Inst. p. 491.

Kleine wilde Möslieben. Tausendschön. Loef. Fl. Bor. p. 24.

Passim in locis graminosis.

531.

*Bellis hortensis flore pleno.* C. B. P. p.

In agris saepius observatur.

CHRYSAN-

CHRYSANTHEMUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 788. Gouan H. R. M. p. 448.*

532.

*Chrysanthemum foliis amplexicaulibus, oblongis, superne ferratis, inferne dentatis. Linn. Sp. Pl. p. 888.*

*Bellis sylvestris, caule folioso, major. C. B. P. p. 261.*

*Oculus bouis. Brunf. Tom. I. p. 259.*

*Buphthalmum majus. Lonic. deutsch. p. 150.*

*Grosse Gänse: Blum. Loef. Fl. Bor. p. 23.*

*In locis arenosis passim.*

533.

*Chrysanthemum foliis minus secto glauco. I. Bauh.*

*Bellis lutea foliis profunde incis. major. C. B. P. p. 262.*

*Gele Gänseblum. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 12. nr. 65.*

*Inter segetes hinter dem Quednauschen Berge.*

534.

• *Chrysanthemum siue*

*Leucanthemum vulgare, seu bellis sylvestris, caule folioso major, duplici petalorum ordine. Gänseblum mit gedoppelten Blumen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 40. nr. 234.*

*In der Johannisburgschen Heide.*

535.

*Chrysanthemum foliis dentato-serratis, inferioribus cuneiformi oblongis, superioribus angustioribus. Ger. Flor. Gallo-Prov. p. 207.*

*Bellis lutea, foliis profunde incis. major. C. B. P. p. 24.*

*Bellis major lutea Tragi. Seb. in Trag. p. 124.*

*Chrysanthemum arvense. Tab. l. 1. p. 454.*

*Grosse Mosllieben mit tief zerschnittenen Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 24.*

*Inter segetes.*

MATRICARIA.

*Linn. Gen. Plant. nr. 789. Gouan H. R. M. p. 449.*

536.

• *Matricaria foliis compositis, planis, foliolis ovatis, incis,*

H 4

incisis, pedunculis ramosis. Linnæi. Spec. Plant.  
p. 890.

*Matricaria vulgaris* siue *fatiua*. C. B. P. p. 133. Tour. Inst. p.  
*Matricaria*. Dod. Pempt. p. 35.

*Matricaria* petalis marginalibus planis, discoidibus fistulo-  
sis. Boerh. Ind. II. Hort. L. B. p.

*Mater. Mutter-Kraut*. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 47.

In hortis rusticorum

### ANTHEMIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 790. Gössan H. R. M. p. 450.*

537.

*Anthemis* foliis pinnato-compositis, linearibus, acutis, sub-  
villosis. Linn. Sp. Pl. p. 894.

*Chamaemelum vulgare*, *Leucanthemum* *Dioscoridis*. C.  
B. P. p. 135.

*Camomilla* III. Tragi. Seb. in Trag. p. 118.

*Chamillen*; Blum. Loef. Fl. Bor. p. 44.

In agris lutosissimis.

538.

*Anthemis* receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus  
nudis. Linn. Sp. Pl. p. 894.

*Chamaemelon foetidum*. C. B. P. p. 135.

*Cotula foetida*. Gesn. Hort. p. 271.

*Hund-Romen*. Loef. Fl. Bor. p. 44.

Inter segetes passim.

539.

*Anthemis* receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus  
coronato-marginatis. Linn. Sp. Pl. p. 894.

*Chamaemelon inodorum*. C. B. P. p. 135.

*Cotula inodora*. Lob. Adv. p. 345.

*Hunds-Aug*. Ruph. Loef. Fl. Bor. p. 45.

In arenosis et sabulosis passim bey Königsberg.

540.

*Anthemis* foliis bipinnatis, serratis, subtus tomentosis, cau-  
le corymbofo. Linn. Sp. Pl. p. 896.

*Buphthal-*

*Bupthalmum foliis Tanaceti.* Loef. Fl. Bor. p. 47.  
 Bey Langheim circa viam am Berge.

BIDENS.

*Linn. Gen. Pl. nro. 776. Gouan H. R. M. p. 428.*

541.

*Bidens corollis flosculosis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis, foliis trifidis.* Linn. Sp. Pl. p. 831.

*Conyza palustris foliis tripartito diuisis.* Loef. Fl. Boruss. p. 53.

*Cannabina aquatica, folio tripartito diuiso.* C. B. P. p. 321.

Wasser: Dürnwurz mit tief zerschnittenen Blättern.

Stuppars. Passim in locis udis bey Königsberg.

542.

*Bidens seminibus erectis, foliis lanceolatis, amplexicaulibus, floribus cernuis.* Linn. Sp. Pl. p. 832.

*Conyza palustris foliis ferratis.* Wasser: Stern: Kraut.  
 Loef. Fl. Bor. p. 54.

*Cannabina aquatica folio non diuiso.* C. B. P. p. 321.

Bey der Laute.

GNAPHALIUM.

*Linn. Gen. Pl. nro. 778. Gouan. H. R. M. p. 434.*

543.

• *Gnaphalium caule simplicissimo, corymbo simplici, terminali, sarmentis procumbentibus.* Linnaci. Spec. Plant. p. 850.

*Gnaphalium montanum flore rotundiore.* C. B. P. p. 263.

*Lagopus II. Tragi.* Seb. in Trag. p. 263.

*Pilosella minor.* Dod. Pempt. p. 68.

• Haasen: Psötlein. Loef. Fl. Bor. p. 106.

In collibus herbosis et arenosis passim.

544.

*Gnaphalium foliis linearibus, caule fruticoso ramoso, corymbo composito.* Linn. Sp. Pl. p. 853.

*Elichrysum siue Stoechas citrina angustifolia.* C. B. P. p. 264.

H 5

Stoc-

*Stoechas citrina*, Matth. Bauh. in Matth. p. 736. Dod.  
 Pempt. p. 268. Tab. l. 2. p. 103.  
 Motten; Blumen. Winter; Blumen. Loef. Fl. Bor. p. 64.  
 In locis aridioribus.

545.

*Gnaphalium* siue  
*Elichrysum* seu *Stoechas citrina*, latifolia, C. B. P. p. 264.  
 Breitblättrige gelbe Reinblumen. Helw. Suppl. Fl. Bor.  
 p. 19. nr. 104.

546.

*Gnaphalium* siue  
*Elichrysum Germanicum* calyce sanguineo. Tourn. Inst.  
 p. 453.  
 Blutfarbene Reinblumen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 19.  
 nr. 105.

547.

*Gnaphalium* siue  
*Elichrysum*, siue *Stoechas citrina angustifolia* flore aurantii  
 coloris. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 19. nr. 106.

548.

*Gnaphalium* siue  
*Elichrysum montanum*, flore rotundiore, suaue-rubente,  
 Tourn. Inst. p. 453.  
 Hasen; Psötlein. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 19. nr. 107.

549.

*Gnaphalium* siue  
*Elichrysum montanum*, flore rotundiore, variegato. Tourn.  
 Inst. p. 453.  
 Hasen; Psötlein mit bunter Blüt. Helw. Suppl. Fl. Bor.  
 p. 19. nr. 108.

550.

*Gnaphalium* siue  
*Elichrysum montanum*, longiore et folio et flore purpu-  
 reo. Tourn. Inst. p. 453. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 20.  
 nr. 109.

In der Heide.

551.

551.

*Gnaphalium* seu

*Elichrysum montanum* longiore et folio et flore albo. Helw.

Suppl. Fl. Bor. p. 20. nr. 110.

552.

*Gnaphalium* seu

*Elichrysum montanum*, longiore folio et flore suaue-  
bente. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 20. nr. 111.

553.

*Gnaphalium* seu

*Elichrysum montanum*, longiore et folio et flore sulphu-  
reo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 20. nr. 112.

Hinter der Eisgrub bey Angerburg.

554.

*Gnaphalium* caule simplicissimo, floribus sparsis. Linn. Sp.  
Plant. p. 856.

*Gnaphalium majus*, angusto, oblongo folio, alterum. C. B.  
P. p. 263.

*Gnaphalium majus*. III. Tab. l. 2. p. 108.

Groß Ruhr-Kraut mit schmalen länglichten Blättern. Loef.  
Fl. Bor. p. 107.

In salebrosis passim bey Königsberg.

555.

*Gnaphalium* caule erecto, dichotomo, capitulis globosis,  
axillaribus terminalibus. Linn. Sp. Pl. p. 857.

*Gnaphalium vulgare majus*. C. B. P. p. 262.

Impia Plinii. Gesn. Hort. p. 262.

Filago siue Impia. Dod. Pempt. p. 66.

Groß gemein Ruhr-Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 107.

In locis apricis et arenosis bey Königsberg.

556.

*Gnaphalium medium*. C. B. P. p. 263. Tab. l. 1. p. 108.

Filago minor. Dod. Pempt. p. 66.

Klein Ruhr-Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 107.

In agris incultis, praesertim editioribus.

ARTEMI-

## ARTEMISIA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 779. Gouan H. R. M. p. 432.*

557.

*Artemisia foliis multifidis, linearibus, caulibus procumbentibus, virgatis.* Linn. Sp. Pl. p. 846.

*Abrotanum campestre.* C. B. P. p. 136.

*Ambrosia.* Matth. deutsch. p. 359.

*Artemisia leptophyllos.* Gesn. Hort. p. 248.

*Wilde Stabwurz mit schmalen Blättern.* Loef. Fl. Boruss.

P. 2.

*Circa vias in salebrosis passim.*

558.

*Artemisia seu*

*Abrotanum campestre, capitulis siue globulis tomentosis.* Helw. Fl. Quasim. p. 23. nr. 1.

559.

*Artemisia foliis multipartitis, subtus tomentosis, floribus subrotundis, nutantibus, receptaculo nudo.* Linn. Sp. Plant. p. 847.

*Absinthium tenuifolium.* Dod. Pempt. p. 24.

*Absinthium.* Brunf. Tom. III. p. 142.

*Wermuth.* Loef. Fl. Bor. p. 2.

*In sabulosis.*

560.

*Artemisia foliis pinnatifidis, planis, incisis, subtus tomentosis, racemis simplicibus, floribus ovatis, radio quinquefloro.* Linn. Sp. Pl. p. 848.

*Artemisia vulgaris major.* C. B. P. p. 137.

*Weyßfuß.* Loef. Fl. Bor. p. 18.

*An den Zäunen passim.*

561.

*Artemisia vulgaris major, caule ex viridi albicante.* Tourn. Inst. p. 460.

*Weißer Weyßfuß.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 4. nr. 17.

XANTHI-

XANTHIVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 858. Gouan. H. R. M. p. 485.*

562.

*Xanthium caule inermi. Linn. Sp. Pl. p. 987.*

*Lappa minor, Xanthium Dioscoridis. C. B. P. p. 137.*

*Xanthium. Matth. Bauh. in Matth. p. 834. Fuch. H. p. 579.*

*Kleine Kletten. Jgels: lause. Loef. Fl. Bor. p. 137.*

*In fimetis passim.*

OTHONNA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 813. Gouan. H. R. M. p. 463.*

563.

*Othonna foliis lanceolatis, dentato-sinuatis. L. S. Pl. p. 924.*

*Conyza aquatica laciniata. C. B. P. p. 266.*

*Wasser: Dürnwurz mit zerschnittenen Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 53.*

*In locis arenosis bey'm Brandenburg'schen Schloß.*



DIPSACEAE.

VALERIANA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 37. Gouan. H. R. M. p. 21.*

564.

*Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis, Linn. Sp. Pl. p. 31.*

*Valeriana sylvestris major. C. B. P. p. 277.*

*Phu paruum. Bauh. Matth. p. 38.*

*Phu Germanicum. Fuch. H. p. 857.*

*Grosser Baldrian. Loef. Fl. Bor. p. 277.*

*In udis pratis.*

565.

*Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis, integris, fructu simplici. Linn. Sp. Pl. p. 33.*

Valeri-



*Valeriana campestris inodora major.* C. B. P. p. 165.

*Album olus.* Dod. Pempt. p. 647.

*Lämmer-Lattich.* Loef. Fl. Bor. p. 278.

In der Hollengrund.

566.

*Valeriana floribus triandris, dioiciis, foliis pinnatis.* Linn.

Sp. Pl. p. 31.

*Valeriana palustris minor.* C. B. P. p. 164. Tourn. Inst. p. 132.

*Phu minus.* Tab. l. 1. p. 438.

*Kleiner Wasser-Balbrian.* Loef. Fl. Bor. p. 278.

Ben Juditten auf den Wiesen.

567.

*Valeriana floribus triandris, dioiciis, foliis pinnatis.* Linn.

Spec. Plant. p. 31.

*Valeriana palustris foliis subrotundis, parum incis.* Loef. Fl. Bor. p. 279.

In loco uliginoso prope pagum Lengen in Dioecesi Elbingensi.

## SCABIOSA.

*Linn. Gen. Pl. m. 90. Gouan. H. R. M. p. 64.*

568.

\* *Scabiosa corollulis, quadrifidis, aequalibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis.* Linn. Sp. Plant. p. 98.

*Succisa glabra.* C. B. P. p. 269.

*Succisa hirsuta coerulea.* Teuffels-Abbiß. Loef. Fl. Bor. p. 262.

*Morsus diaboli.* Tragi. Kyp. in Trag. p. 246.

Im Walde ben Selnicken.

569.

*Scabiosa siue*

*Succisa hirsuta candida.* Loef. Fl. Bor. p. 263.

Im Walde ben Selnicken.

570.

570.

*Scabiosa* feu*Succisa hirsuta* *coerulea*, foliis incisis et laciniatis. Loef.

Fl. Bor. p. 264.

Ben Selnicken.

571.

*Scabiosa hirsuta*, candida flore prolifero. Helw. Suppl. Fl.

Bor. p. 61 nr. 369.

572.

*Scabiosa* folio integro, flore incarnato. Tourn. Inst. p. 466.*Succisa glabra*, floribus incarnatis. Helw. Suppl. Fl. Bor.

p. 61. nr. 370.

573.

*Scabiosa* flore ex purpura albicante. Helw. Suppl. Fl. Bor.

p. 61. nr. 371.

574.

*Scabiosa* flore ex coeruleo albescente. Helw. Suppl. Flor.

Bor. p. 61. nr. 372.

575.

*Scabiosa* flore caesio, caule reflexo. Helw. Suppl. Fl. Bor.

p. 61. nr. 373.

576.

● *Scabiosa* corollulis, quadrifidis, radiantibus, caule hispido.

Linn. Sp. Pl. p. 99.

*Scabiosa pratensis hirsuta*, quae *Officinarum*. C. B. P. p. 269.

Tourn. Inst. p. 464.

Gross Scabiosen. Loef. Fl. Bor. p. 247.

In arvis et pratis, non nihil riguis, passim.

577.

*Scabiosa pratensis hirsuta*, quae *Officinarum*, colore Ber-

filico. C. B. P. p. Helw. Suppl. Flor. Boruss. p. 60.

nro. 364.

Korbe Scabiosen.

Inter segetes in montosis

578.

*Scabiosa pratensis hirsuta*, flore ex rubro albicante, fo-  
liis

liis tenuioribus. Helw. Suppl. Flor. Boruss. p. 61.  
nr. 365.

Bei Gerbäusen in herbosis.

579.

Scabiosa pratensis hirsuta, flore ex albo rubente. Helw.  
Suppl. Fl. Bor. p. 61. nr. 366. ibid.

580.

Scabiosa pratensis hirsuta flore candido. Helw. Suppl. Fl.  
Bor. p. 61. nr. 367.

Bei Ronopfen im Milchischen Kirchspiel.

581.

Scabiosa latifolia, rubra, non laciniata, flore prolifero.  
Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 61. nr. 368.

Auf dem Werder, Warschau genannt.

582.

Scabiosa multifido folio, flore flavescente. C. B. P. p. 270.  
Gelblicht Scabiosen: Kraut mit sehr zerschnittenen Blättern.  
Loef. Fl. Bor. p. 247.

Auf dem Berge gegen den Nassengarten über.

583.

Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus, foliis bipin-  
natis, linearibus. Linn. Sp. Pl. p. 101.

Scabiosa multifido folio, flore flavescente. C. B. P. p. 270.  
Gelblichte Scabiosen mit viel zerschnittenen Blättern. Loef.  
Fl. Bor. p. 247.

Bei Lautenmühle.

## DIPSACVS.

Linn. Gen. Pl. nr. 89. Gouan. H. R. M. p. 64.

584.

Dipsacus foliis sessilibus ferratis. Linn. Sp. Pl. p. 97.

Dipsacus sylvestris aut virga pastoris major. C. B. P. p. 385.  
Tourn. Inst. p. 466.

Carduus fullonum. Brunf. Tom. III. p. 32.

Braun Karten: Distel. Loef. Fl. Bor. p. 62.

Bei der Neuhäusischen Mühle.

VIBURNVM.

## VIBURNUM.

*Linn. Gen. Plant. nr. 292. Gouan H. R. M. p. 153.*

585.

*Viburnum foliis lobatis, petiolis glandulosis.* L. S. Pl. p. 268.

*Opulus Ruellii.* Tourn. Inst. p. 667.

*Sambucus aquatica flore simplici.* C. B. P. p. 456.

Wasser-Hollunder mit schlechter Blüt. Kaninchen Baum.

Loef. Fl. Bor. p. 243.

In der Hollengrund.

586.

*Sambucus aquatica flore pleno.* C. B. P. p. 456.

Schneeballen.

Ad hortorum sepes.

## CORNUS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 110. Gouan. H. R. M. p. 71.*

587.

*Cornus arborea, cymis nudis.* Linn. Sp. Pl. p. 117.

*Cornus foemina.* C. B. P. p. 447. Tourn. Inst. p. 641.

*Virga sanguinea.* Bauh. in Matth. p. 214. Gesn. Hort. p. 286. Dod. Pempt. p. 781.

Hartriegel. Cornelbaum. Kürbeeren. Loef. Fl. Bor. p. 54.

Bei Fischhausen im Rosenbusch.

## SAMBUCVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 294. Gouan. H. R. M. p. 153.*

588.

• *Sambucus caule herbaceo, simplici.* Linn. Sp. Pl. p. 269.

*Sambucus humilis siue Ebulus.* C. B. P. p. 456. Tourn. Inst. p. 606.

Urtich oder niedriger Hollunder. Loef. Fl. Bor. p. 243.

Ad hortorum sepes zu Abschwangen und Seewiesen.

589.

• *Sambucus cymis quinque partitis, caule arboreo.* Linn. Sp. Pl. p. 269.

I

Sam-

*Sambucus fructu in umbella nigro.* C. B. P. p. 456. Tourn.  
Inst. p. 606.

*Hollunder; Baum.* Loef. Fl. Bor. p. 240.

Passim in pagis, etiam in sylvis, sed rarius.

### TRAPA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 115.*

590.

*Trapa.* Linn. Sp. Pl. p. 120.

*Tribulus aquaticus.* C. B. P. p. 194.

*Wasser; Nüsse.* Loef. Fl. Bor. p. 271.

*Im Uderwangschen Mühlen; Teiche.*

### LONICERA.

*Linn. Gen. Plant. nr. 333. Gouan. H. R. M. p. 101*

591.

*Lonicera pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerrimis, pubescentibus.* Linn. Sp. Pl. p. 174.

*Chamaecerasus dumetorum fructu gemino rubro.* C. B. P. p. 451. Tourn. Inst. p. 609.

*Halimus Tragi.* Seb. in Trag. p. 780.

*Xilostemum.* Dod. Pempt. p. 412.

*Periclymeno cognatus sylvestris fructus.* Gefn. H. p. 271.

*Aufrechtige Waldrinde. Zaumling. Weinhölzgen.* Loef. Fl. Bor. p. 42.

*Bei Brandenburg auf dem Lenzenberge.*

### SANGVISORBA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 107. Gouan. H. R. M. p. 71.*

592.

*Sanguisorba spicis ovatis.* Linn. Sp. Pl. p. 116.

*Pimpinella sanguisorba major.* C. B. P. p. 160. Tourn. Inst. p. 156.

*Sanguisorba major.* Fuchf. 788. Tab. 1. p. 301.

*Grosse welsche Bienenel. Braun Leber; Blumen.* Loef. Fl. Bor. p. 195.

*In pratis aridioribus et graminosis locis.*

RVBIACE-



## R V B I A C E A E.

## A S P E R V L A.

*Linn. Gen. Pl. nr. 93. Gouan. H. R. M. p. 65.*

593.

**A**sperrula foliis octonis, lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. Linn. Spec. Plant. p. 103.

Asperula siue Rubeola montana odorata. C. B. P. p. 334.

Marrifylua. Tragi. Seb. in Trag. p. 394.

Asperula odorata. Dod. Pempt. p. 355.

Stern- Leber- Kraut. Waldmeister. Loef. Fl. Bor. p. 21.

Beim Lautschen Teich am Berge.

## G A L L I V M.

*Linn. Gen. Pl. nro. 97. Gouan. H. R. M. p. 66.*

594.

**G**allium foliis octonis, linearibus, sulcatis, ramis floriferis breuibus. Linn. Sp. Pl. p. 107.

Gallium luteum. C. B. P. p. 335. Lob. Advers. p. 358.

Gallium. 1 Tab. l. 1. p. 536.

Unser Frauen Wegstroph. Gliedkraut. Loef. Fl. Bor. p. 108.

Ad viarum crepidines saepe.

595.

**G**allium foliis quaternis, lanceolatis, ouatis, aequalibus, subtus scabris, caule erecto, fructibus glabris. Linn. Sp. Plant. p. 105.

Gallium palustre album. C. B. P. p. 335.

Cruciata palustris alba. Tourn. Inst. p. 115.

Aparine palustris laevis. Thal. p. 10.

Gallium palustre. Dod. Pempt. p. 355.

Weißglat Meyerkraut. Loef. Fl. Bor. p. 18.

In locis palustribus passim circa Regiomontum.

596.

**G**allium foliis octonis, lanceolatis, carinatis, scabris, re-

trorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido. Linn.  
Sp. Plant. p. 108.

Aparine vulgaris. C. B. P. p. 334.

Kleb-Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 17.

Am Kneiphöfischen Walle.

597.

Gallium foliis octonis, ouatis, linearibus, subserratis, patentissimis, mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. Linn. Sp. Plant. p. 107.

Mollugo montana angustifolia, vel Gallium album latifolium. C. B. P. p. 334.

Breitblättriges weißes Meyerkraut, oder Wallstrob. Loef.  
Fl. Bor. p. 166.

In arenosis bey Königsberg passim.

## RVBIA.

Linn. Gen. Plant. nr. 99. Gouan H. R. M. p. 68.

598.

Rubia foliis quaternis. Linn. Sp. Pl. p.

Cruciata glabra. C. B. P. p. 355.

Rubia quadrifolia, glabra angustifolia. I Bauh.

Wilde Rösche. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 16, nr. 80.

In der Ogonschen Heide.

## CRUCIANELLA.

Linn. Gen. Pl. nr. 95. Gouan H. R. M. p. 67.

599.

Crucianella, caule quadrangulo, foliis quatuor vestito, petalis purpureis sex.

Aparine purpureis floribus. C. B. P. p. 334.

Klebkraut mit rothen Blumen. Wulff. Spec. Inaug.  
p. 9.

Inter segetes habitat bey Löwenhagen. Planta visu rara.

## VMBELLI-



# UMBELLIFERAE.

## ERYNGIUM.

*Linn. Gen. Pl. nro. 241. Göüan. H. R. M. p. 130.*

600.

- **E**ryngium foliis radicalibus, subrotundis, plicatis, spinosis capitulis pedunculatis. Linn. Sp. Pl. p. 233.

Eryngium maritimum. C. B. P. p. 386.

Meer; Manns; Treue. Loef. Fl. Bor. p. 69.

Circa portum Pillaiensem copiose.

## SANICULA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 244. Göüan. H. R. M. p. 131.*

601.

- **S**anícula foliis radicalibus, simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. Linn. Sp. Pl. p. 235.

Sanícula Officinarum. C. B. P. p. 319. Tourn. Inst. p. 326.

Sanícula. Tragi. Seb. in Trag. p. 405. Dod. Pempt. p. 140.

Sanickel. Loef. Fl. Bor. p. 244.

Ben Bladau am Teich.

## DAUCUS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 250. Göüan. H. R. M. p. 136.*

602.

- **D**aucus feminibus hispidis. Linn. Sp. Pl. p. 242.

Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis vel Daucus Officinarum. C. B. P. p. 151. Tourn. Inst. p. 368,

Daucus vulgaris, Clus. H. l. 6. p. 198.

Wilde Möhren. Vogels Nest, und Esels Möhren. Loef. Fl. Bor. p. 118.

In monte Apollinis, hinter Quednau.



## SELINUM

*Linn. Gen. Plant. nr. 254.*

603.

*Selinum* foliis radicalibus ouatis, inaequalibus serratis.

Linn. Sp. Pl. p. 1194.

*Daucus montanus* Apii folio major. C. B. P. p. 150.*Dauci* tertium genus. Fuchs. H. p. 233.Schwarze Hirkwurk. Hirk Peterlein. Helw. Fl. Quasim.  
In der Damerau.

## CONIUM.

*Linn. Gen. Plant. nr. 253. Gouan H. R. M. p. 137.*

604.

● *Conium* seminibus striatis. Linn. Sp. Pl. p. 243.*Cicuta* major. C. B. P. p. 160. Tourn. Inst. p. 306.*Cicuta*. Dod. Pempt. p. 461. *Cicuta* Stoeckii.*Cicuta* major vulgaris. Clus. H. l. 2. p. 200.

Schierling. Wüterich. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 13. nr. 68.

*Circa* sepes hortorum et in marginibus agrorum pinguium.

## ATHAMANTHA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 255. Gouan. H. R. M. p. 138.*

605.

● *Athamanta*, foliolis diuaticatis. Linn. Sp. Pl. p. 244.*Apium* montanum folio ampliore. C. B. P. p. 153.*Oreoselinum*. Dod. Pempt. p. 696. Clus. H. l. 1. p. 195.

Tab. l. 1. p. 362.

Berg Peterlein. Samlob. Loef. Fl. Bor. p. 18.

Zu Quednau auf dem Berge.

## LASERPITIVUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 260. Gouan. H. R. M. p. 140.*

606.

*Laserpitium* foliolis cordatis, inciso-serratis. Linn. Sp. Pl.  
p. 248.

Libano-

Libanotis latifolia altera et vulgaris. C. B. P. p. 157.

Seseli Aethyopicum. Dod. Pempt. p. 312.

Weisse Hirschwurk. Loef. Fl. Bor. p. 253.

In der Osterreichischen Heide hinter dem Schilling.

607.

Laferpitium angustifolium, non sinuatum. Weisse Hirschwurk, oder Aethyopische Sesel mit schmalen Blättern.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 40. nr. 251.

In der Ogonischen Heide.

608.

Laferpitium foliolis lanceolatis, integerrimis, extimis, coalitis. Linn. Sp. Pl. p. 248.

Laferpitium daucoides Prutenicum, viscoso semine. Breyn.

Cent. I. p. 167. Tab. LXXXIV. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 40. nr. 231.

In der Heide copiose.

609.

Laferpitium foliolis lanceolatis, integerrimis, petiolatis.

Linn. Sp. Pl. p. 249.

Ligusticum, quod Seseli Officinarum. C. B. P. p. 162.

Siler montanum. Dod. Pempt. p. 310.

Liebstock. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 44. nro. 253.

In hortis rusticis vulgaris planta.

## HERACLEUM.

Linn. Gen. Pl. nro. 277. Gouan. H. R. M. p. 141.

1610.

Heracleum foliis pinnatifidis. Linn. Spec. Plant. p. 249.

Spondylium vulgare hirsutum. C. B. P. p. 157.

Wartsch. Loef. Fl. Bor. p. 262.

In der Hollengrund copiose.

## ANGELICA.

Linn. Gen. Pl. nro. 284. Gouan. H. R. M. p. 141.

611.

Angelica foliorum impari lobato. Linn. Sp. Pl. p. 250.

I 3

Impera-

*Imperatoria sativa*. Tourn. Inst. p. 317.

*Angelica sativa*. C. B. P. p. 155.

*Angelica major*. Dod. Pempt. p. 318.

*Archangelica*. Clus. H. l. 2. p. 295.

*Angelica*. In hortis rusticorum fere semper obuia. Magna in copia im Löwenhagschen Widden Garten.

612.

*Angelica foliis aequalibus, ovato-lanceolatis, serratis*. Linnæi. Sp. Pl. p. 251.

*Imperatoria pratensis major*. Tourn. Inst. p. 317.

*Angelica sylvestris major*. C. B. P. p. 155.

*Angelica sylvestris*. Dod. Pempt. p. 318.

*Wilde Angelica*. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 37. nr. 222.

Im Angerburgschen Stadt:Walde.

613.

*Angelica foliis aequalibus ovato-lanceolatis, serratis*. Linn. Spec. Plant. p. 251.

*Angelica sylvestris major*. C. B. P. p. 155.

*Angelica sylvestris*. Dod. Pempt. p. 318.

*Wasser:Angelica*. Loef. Fl. Bor. p. 15.

In den Wiesen nach Lochnstadt zu.

## AETHUSA.

Linn. Gen. Pl. nro. Gouan. H. R. M. p. 145.

614.

*Aethusa*. Linn. Spec. Plant. p. 256.

*Cicuta minor, petroselinis similis*. C. B. P. p. 158. Tourn. Inst. p. 316.

*Petroselinis vitium*. Seb. in Trag. p.

Hunds:Peterlein. Ragen:Peterlein. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 13. nr. 69.

## PHELLANDRUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 268. Gouan. H. R. M. p. 145.

615.

*Phellandrium foliorum ramificationibus diuaticatis*. Linn. Sp. Pl. p. 255.

Phellan-

Phellandrium. Dod. Pempt. p. 591.

Cicutaria palustris tenuifolia. C. B. P. p. 161.

Cicutaria palustris. Tab. l. 2. p. 460.

Schmalblättriger Wasser-Schierling. Klein Wedendunck.

Loef. Fl. Bor. p. 49.

In paludum marginibus passim bey Königsberg.

CORIANDRUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 270. Gouan. H. R. M. p. 145.

616.

Coriandrum fructibus globosis. Linn. Spec. Pl. p. 256.

Coriandrum majus. C. B. P. p. 158.

Coriandrum. Cam. Epit. p. 523.

Koriander. Helw. Fl. Quasim. p. 30.

In hortis, instar zizania sponte crescit.

SCANDIX.

Linn. Gen. Pl. nr. 273. Gouan H. R. M. p. 146.

617.

Scandix feminibus nitidis, ovato-subulatis. Linn. Sp. Pl. p. 257.

Chaerophyllum fatium. C. B. P. p. 152.

Chaerophyllum. Dod. Pempt. p. 700.

Kerbel. Helw. Suppl. Fl. Quasim. p. 29. nr. 68.

In hortis.

618.

Scandix feminibus ovato-hispidis, corollis uniformibus, caule laevi. Linn. Sp. Pl. p. 257.

Myrrhis sylvestris feminibus asperis. C. B. P. p. 160.

Wilder Kerbel mit scharfen Saamen. Loef. Fl. Bor. p. 175.

Passim am Königsbergischen Walle.

CHAEROPHYLLUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 274. Gouan. H. R. M. p. 146.

619.

Chaerophyllum, flosculis omnibus fertilibus, caule aequali. Linn. Sp. Pl. p. 258.

I 5

Chacro-

*Chaerophyllum sylvestre*, perenne, cicutae folio. Tourn.

Inst. p. 314.

*Myrrhis sylvestris* seminibus laevibus. C. B. P. p. 160.

*Cicutaria*. Gefn. H. p. 253.

*Cicutaria vulgaris*. Dod. Pempt. p. 701.

Wilder Kerbel. Kälbertropf. Loef. Fl. Bor. p. 175.

Ben Königsberg copiose.

620.

*Chaerophyllum caule* scabro, geniculis tumidis. Linn. Sp.

Plant. p. 258.

*Chaerophyllum sylvestre*. C. B. P. p. 152.

*Myrrhis annua* caule fusco, semine striato, Moris. Helw.

Suppl. Fl. Bor. p. 49. nr. 298.

Wilder Kerbel so keinen Geruch hat.

Inter frutices et ad saepes hortorum.

621.

*Chaerophyllum caule* aequali, foliolis incis. acutis. Linn.

Spec. Plant. p. 258.

*Cicutaria palustris*, latifolia, alba. C. B. P. p. 161.

*Cicutaria palustris* flore candido. Cam. Ep. p. 41.

Breitblättriger Wasser-Schierling. Groß Wehdendunck.

Loef. Fl. Bor. p. 48.

In locis palustribus passim ben Königsberg.

## IMPERATORIA.

Linn. Gen. Plant. nr. 276.

622.

*Imperatoria*. Linn. Sp. Pl. p. 259.

*Astrantia*. Dod. Pempt. p. 230.

*Imperatoria major*. C. B. P. p. 156.

Tourn. Inst. p. 317.

*Magistrantia*. Cam. Ep. p. 592.

Weißtermur. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 37. nr. 221.

In hortis rusticis frequens.

PASTINACA.

PASTINACA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 250. Gouan. H. R. M. p. 146.*

623.

† Pastinaca foliis simpliciter pinnatis. *Linnaei. Spec. Plant.* 01

p. 262.

Pastinaca sylvestris latifolia. C. B. P. p. 155.

Elaphoboscum erraticum. Tab. l. 1. p. 188.

Pastinaca sylvestris. Tragi. Seb. in Trag. p. 346.

Sifer sylvestre. Fuchf. p. 723.

Wilde Hirtz; Pasternack. Wild; Möhren. Loef. Fl. Bor.

p. 189.

Zu Jerusalem am Berge.

ANETHVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 281. Gouan H. R. M. p. 149.*

624.

† Anethum fructibus compressis. *Linn. Sp. Pl. p. 263.*

Anethum hortense. C. B. P. p. 147.

Dille. Helw. Fl. Quasim. p. 24.

In plurimis hortis postunam sationem sponte provenit.

625.

Anethum fructibus ouatis. *Linn. Sp. Pl. p. 263.*

Foeniculum vulgare Germanicum. C. B. P. p. 147.

Fenchel. Helw. Fl. Quasim. p. 32.

CARVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 282. Gouan H. R. M. p. 150.*

626.

† Carum. *Linn. Sp. Plant. p. 263.*

Carum. Matth. Bauh. in Matth. p. 158.

Carui. Tourn. Inst. p. 306.

Wiesen; Kümmel. Loef. Fl. Bor. p. 36.

In den höhern Pregel; Wiesen passim.

PIMPINEL.

## PIMPINELLA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 368. Gouan. H. R. M. p. 150.*

627.

- *Pimpinella foliis pinnatis, foliis radicalibus subrotundis: summis linearibus.* Linn. Sp. Pl. p. 263.
- Pimpinella saxifraga minor.* C. B. P. p. 160.
- Tragoselinum minus.* Fuchf. p. 609.
- Pimpinella nigra.* Blauwurzel. Harnisch.
- Stein Bibernel, Kleine Bibernel.* Loef. Flor. Boruss. p. 195.

Am Kneiphöfsschen Walle copiose.

628.

- Pimpinella saxifraga major, umbella candida.* C. B. P. p. 159.
- Tragoselinum majus.* Tab. l. i. p. 242.
- Saxifraga magna.* Dod. Pempt. p. 315.
- Groß, Bocks, Peterlein. Groß Bibernel.* Loef. Fl. Bor. p. 194.
- Bei Bladau passim.

629.

- Pimpinella saxifraga major, umbella rubente.* C. B. P. p. 159.
- Tragoselinum alterum majus.* Tourn. Inst. p. 309.
- Bibernel mit röthlicher Blüt.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 64. nr. 391.

630.

- Pimpinella foliis radicalibus, trifidis incis. Linn. Sp. Pl. p. 264.*
- Apium, Anisum dictum, semine suaue olenti minori.* Tourn. Inst. p. 305.
- Anisum Officinarum.* C. B. P. p. 159.
- Anisum vulgare.* Clus. H. l. 2. p. 202.
- Anis.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 3. nr. 16.
- In pagis Borussicis Polonicis feritur.

ÆGOP-

AEGOPODIUM.

*Linn. Gen. Plant. nr. 284. Gouan. H. R. M. p. 152.*

631.

*Aegopodium foliis caulinis, summis ternatis.* Linn. Spec. Plant. p. 265.

*Angelica sylvestris minor, siue erratica.* C. B. P. p. 155.

*Podagrica.* Lod. Adv. p. 311.

*Aegopodium.* Tab. l. 1. p. 301.

*Herba Gerardi.* Dod. Pempt. p. 320.

*Geiß: Fuß. Giersch.* Loef. Fl. Bor. p. 16.

*In locis umbrosis passim.*



LABIATAE.

LYCOPUS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 27. Gouan. H. R. M. p. 15.*

632.

*Lycopus foliis sinuato-serratis.* Linn. Sp. Pl. p. 21.

*Lycopus palustris glaber.* Tourn. Inst. p. 191.

*Marrubium palustre glabrum.* C. B. P. p. 230.

*Sideritis prima heraclea.* Bauh. in Matth. p. 711.

*Bruch: oder Wasser: Andorn.* Loef. Fl. Bor. p. 160.

*Iuxta riuulos et uliginosa passim.*

633.

*Lycopus palustris villosus.* Tourn. Inst. p. 190.

*Marrubium palustre hirsutum.* C. B. P. p. 230.

*Wasser Andorn mit rauhen Blättern.* Helw. Suppl. Fl.

*Bor. p. 46. nr. 269.*

SALVIA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 30. Gouan. H. R. M. p. 17.*

634.

*Salvia foliis cordato-oblongis, crenatis: summis amplexi-caulibus.*



caulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis.  
Linn. Spec. Plant. p. 25.

*Scleara pratensis* foliis ferratis, flore albo. Tourn. Inst.  
p. 179.

*Horminum pratense*, foliis ferratis. C. B. P. p. 238. Helw.  
Suppl. Fl. Bor. p. 62. nr. 376.  
635.

*Salvia* seu

*Scleara major*, foliis in profundas lacinias incis. Tourn.  
Inst. p. 179.

*Hormium sylvestre majus*, foliis profundius incis. C. B.  
P. p. 239.

Wilder Scharlach oder Salben mit tief zerschnittenen Blät-  
tern. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 62. nr. 375.

Ben Gatten im Eckersbergischen im Gesträuch unweit der  
Fähre.

### PRUNELLA.

Linn. Gen. Pl. nr. Gouan. H. R. M. p. 294.

636.

\* *Prunella* foliis ovato-oblongis, petiolatis. Linn. Sp. Plant.  
p. 600.

*Brunella major* folio non dissecto. C. B. P. p. 260.

*Brunella*. Fuchs. p. 261. Tab. l. 2. p. 256. Dod. Pempt.  
p. 136.

Braunellen. St. Antonii Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 208.  
Zu Steinbeck.

637.

*Prunella* flore albo. Loef. Fl. Bor. p. 269.

Ben Fischhausen hinter der Ziegelscheune.

### SCUTELLARIA.

Linn. Gen. Pl. nr. 587. Gouan H. R. M. p. 294.

638.

*Scutellaria* foliis cordato-lanceolatis, crenatis, floribus axil-  
laribus. Linn. Spec. Plant. p. 599.

Lyfima-

*Lyfimachia coerulea galericulata*, vel *Gratiola coerulea*.

C. B. P. p. 246.

*Tertianaria*. Tab. l. 2. p. 93.

*Cassida palustris*, vulgator, flore coeruleo. Tourn. Inst. p. 182.

*Fieber-Kraut*. Loef. Fl. Bor. p. 155.

Ad fluuiorum ripas passim.

THYMVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 560. Göïan, H. R. M. p. 239.*

639.

*Thymus floribus capitatis*, caulibus repentibus, foliis planis, obtusis, basi ciliatis. Linn. Sp. Pl. p. 590.

*Serpillum vulgare majus*. C. B. P. p. 220.

*Serpillum album primum et secundum*. Tab. l. 2. p. 77. 78.

*Feld-Kümmel*. Loef. Fl. Bor. p. 253.

In montosis passim.

640.

*Thymus siue*

*Serpillum vulgare minus*. C. B. P. p. 253.

*Serpyllum*. Fuchf. p. 251.

*Serpillum minus flore albo et purpureo*. Tab. l. 2. p. 78.

*Kleiner Quendel*. Loef. Fl. Bor. p. 253.

In asperis et secus vias passim.

641.

*Thymus feu*

*Serpillum flore candido*, foliis crassioribus, odore flagrantissimo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 62. nr. 378.

*Hinter Harsen*.

642.

*Thymus siue*

*Serpillum minimum repens flore candido*. Loef. Fl. Bor. p. 253.

*Hinter dem Spittel-Hofe am Wege nach der Fischhaus-schen Heide*.

643.

643.

Thymus seu

Serpillum vulgare minus folio ex albō et viridi variegato.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 62. nr. 379.

Auf dem Roßgarten bey Angerburg.

## DRACOCEPHALVM

*Linn. Gen. Pl. nr. 547. Gouan. H. R. M. p. 291.*

644.

Dracocephalum floribus spicatis, bracteis linearibus partitis, spinosis. Linn. Sp. Plant. p. 595. Cram. El. Veg. Austr. p. 197.

Hyslopus Austriacus magno flore, folio Chamaeipytioides. Herm. Hort. Lugd. Bat. p. 330.

Chamaeipytis Austriaca. Clus. H. l. 2. p. 185. Helw. Fl. Quasim. p. 29. Kram. El. Veg. Austr. p. 179.

In der Heide.

## ORIGANVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 563. Gouan H. R. M. p. 288.*

645.

Origanum spicis subrotundis, paniculatis, conglomeratis, bracteis, calyce longioribus, ovatis. Linn. Spec. Plant. p. 590.

Origanum sylvestre. C. B. P. p. 223.

Origanum sylvestre seu vulgare. Fuchs. H. p. 522.

Wohlgemuth. Brauner Feld: Dost. Loefel. Flor. Boruss. p. 184.

Inter coryleta bey Bladau.

646.

Origanum sylvestre album. C. B. P. p. 223.

Origanum album. Tab. l. 2. p. 58.

Weisser Feld: Dost. Loef. Fl. Bor. p. 186.

Passim.

TEUCRIVM.

TEUCRIVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 558. Gouan. H. R. M. p. 289.*

647.

Teucrium foliis ovatis, inciso-crenatis, petiolatis, floribus subverticillatis. Linn. Sp. Pl. p. 565.

Scordium. C. B. P. p. 247.

Wasser: Knoblauch. Loef. Fl. Bor. p. 247.

Auf der Wiese am Fluß zu Blatau.

CLINOPODIVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 265. Gouan. H. R. M. p. 267.*

648.

Clinopodium, capitulis subrotundis, hispidis, bracteis setaceis. Linn. Spec. Plant. p. 587.

Clinopodium Origano simile. C. B. P. p. 224.

Clinopodium vulgare. Bauh. in Matth. p. 595.

Clinopodium origano simile. Tourn. Inst. p. 49.

Kleiner Wohlgenuth. Loef. Fl. Bor. p. 50.

In der Hollengrund.

649.

Clinopodium origano simile flore albo. C. B. P. p. 225.

Wirbel: Dost mit weisser Blüt. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 15.  
nr. 74.

Ben Johannsburg auf dem Werder, Warschau genannt.

LEONVRVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 583. Gouan. H. R. M. p. 284.*

650.

Leonurus foliis caulinis, lanceolatis, trilobis. Linn. Sp. Pl. p. 584.

Marrubium; Cardiaca, dictum. C. B. P. p. 230.

Cardiaca. Tourn. Inst. p. 186.

Melissa sylvestris Tragi. Kyp. in Trag. p. 12.

Herz: Gespann. Loef. Fl. Bor. p. 159.

Auf der Horschts nahe ben-Friedrichstein copiose.

K

MARRV-

## LABIATAE.

## MARRUBIUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 581. Gouan. H. R. M. p. 283.*

651.

*Marrubium dentibus calycinis, setaceis, uncicatis.* Linn. Sp. Plant. p. 583.

*Marrubium album vulgare.* C. B. P. p. 230. Tourn. Inst. p. 192.

*Marrubium.* Fuchf. p. 590. Dod. Pempt. p. 87.

*Weisser gemeiner Andorn.* Loef. Fl. Bor. p. 158.

*Auf der Horst nahe bey Friedrichstein.*

## BALLOTA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 580. Gouan. H. R. M. p. 283.*

652.

*Ballota foliis cordatis, indivisis, serratis.* Linn. Sp. Pl. p. 582.

*Marrubium nigrum foetidum, Ballote Dioscoridis.* C. B. P. p. 230.

*Ballota.* Tourn. Inst. p. 186.

*Marrubiastrum.* Tab. l. 2. p. 240.

*Schwarzer stinckender Andorn.* Loef. Fl. Bor. p. 159.

## STACHYS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 579. Gouan. H. R. M. p. 282.*

653.

*Stachys verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis, semi-amplexicaulibus.* Linn. Sp. Plant. p. 580.

*Stachys palustris foetida.* C. B. P. p. 236.

*Lyfimachia hirsuta purpurea flore galericulato.* Loef. Fl. Bor. p. 156.

*Ad rituorum margines et inter segetes.*

## LAMIVM.

*Linn. Gen. Plant. nr. 577. Gouan. H. R. M. p. 280.*

654.

*Lamium verticillis sexfloris, foliis cordatis, petiolatis.* Linn.

*Spec. Plant. p. 579.*

Lami-

*Lamium maximum, sylvaticum, foetidum.* C. B. P. p. 231.  
*Galeopsis legitima vel vera Dioscoridis.* Clus. H. l. 4. p. 35.  
*Heraclea vel urtica.* XI Tragi. Seb. in Trag. p. 4.  
 Wald; Nessel. Loef. Fl. Bor. p. 134.  
 In der Hollengrund.

655.

*Lamium foliis cordatis, obtusis, petiolatis.* Linn. Sp. Plant. p. 579.

*Lamium purpureum, foetidum, folio subrotundo, siue Galeopsis Dioscoridis.* C. B. P. p. 230.

*Urtica iners altera.* Dod. Pempt. p. 153.

Taub, oder todte Nessel. Loef. Fl. Bor. p. 123.

Am Kneiphöfischen Walle.

656.

*Lamium floralibus foliis sessilibus amplexicaulibus.* Linn. Sp. Plant. p.

*Lamium folio caulem ambiente, minus.* C. B. P. p. 231.

Kleine Taube Nessel, dessen Blätter um den Stengel gehen.

Loef. Fl. Bor. p. 134.

In agris inter segetes copiose.

657.

*Lamium foliis cordatis, acuminatis, serratis, petiolatis.* Linn. Spec. Pl. p. 579.

*Lamium purpureum et album non foetens, folio oblongo.* C. B. P. p. 231.

Taub oder todte Nessel. Loef. Fl. Bor. p. 123.

Am Kneiphöfischen Walle.

## GALEOPSIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 578. Gouan H. R. M. p. 284.*

658.

*Galeopsis internodiis caulinis aequalibus, verticillis omnibus remotis.* Linn. Sp. Pl. p. 579.

*Sideritis aruensis angustifolia rubra.* C. B. P. p. 233.

*Alyssum Galeni flore purpureo.* Tab. l. 2. p. 243.

K 2

Loef.

Loef. Fl. Bor. p. 255.

Ben lauten; Mühl ad agrorum margines.

659.

*Galeopsis verticillis sexfloris, inuolucro tetraphyllo.* Linn  
Spec. Pl. p. 580.

*Lamium folio oblongo luteum.* C. B. P. p. 231.

*Urtica inerstertia, siue lamium luteo flore.* Dod. P. p. 153.

Taub oder Todte Nessel, mit gelben Blumen. Loef. Fl. Bor.  
p. 134.

In syluis caeduis et dumetis passim.

660.

*Galeopsis procerior, spicata, foetida, floribus laete incarnatis.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 25, nr. 140.

*Lamium maximum syluaticum, foetidum.* C. B. P. p. 231.

Stinkende Wald: Nessel mit fleischfarber Blüt. Helw.

Auf dem Schloßberge in Nordenburg.

661.

*Galeopsis patula segetum, flore albo.* Tourh. Inst. p. 185.

*Sideritis aruensis angustifolia alba.* C. B. P. p. 233.

Gliedkraut mit weißer Blüt. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 25.  
nr. 141.

Im Eckerbergischen in arenosis.

662.

*Galeopsis patula segetum, flore rosaceo.* Helw. Suppl. Fl.  
Bor. p. 25, nr. 142.

Inter segetes im Johannisburgschen.

663.

*Galeopsis urticae similis, foliis inferius incanis et lanuginosis, Heraclea Plinii.* C. B. P. p. Helw. Suppl. Fl. Bor.

p. 25, nr. 134.

In der Damerau.

## GLECOMA.

Linn. Gen. Pl. nr. 568. Gouan. H. R. M. p. 280.

664.

*Glechoma foliis reniformibus, crenatis.* Linn. Sp. Pl. p. 578.

Hedera

*Hedera terrestris vulgaris.* C. B. P. p. 306.

*Chamaecistus.* Fuchf. p. 876.

*Gundelrüb. Uderam.* Loef. Fl. Bor. p. 123.

*Passim.*

MENTHA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 172. Gouan. H. R. M. p. 278.*

665.

- *Mentha floribus spicatis, foliis cordatis, dentatis, undulatis, sessilibus.* Linn. Sp. Pl. p. 576.

*Mentha.* Fuchf. p. 287.

*Mentha crispa verticillata.* C. B. P. p. 227.

*Mentha crispa Officinarum.* Rechter Kräusenmünz.

Sponte prouenit in pago Seewiesen nahe bey Friedrichstein.

666.

*Mentha spicis confertis, foliis ferratis, tomentosis, sessilibus.*

*Linn. Spec. Pl. p. 576.*

*Mentha syluestris longiore folio.* C. B. P. p. 227.

Wilde Münze. Loef. Fl. Bor. p. 161.

Bei Schönbrunn und Creutzburg am Mühlentisch.

61.2

*Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis, acutis, ferratis,*

*staminibus corollam aequantibus.* Linn. Sp. Pl. p. 577.

*Calamintha aruensis verticillata.* C. B. P. p. 229.

*Calamintha aquatica.* Bauh. in Matth. p. 529.

*Mentha aquatica seu pulegium vulgare.* Tourn. Inst. p. 189.

Kornmünz. Wilde Polen. Loef. Fl. Bor. p. 31.

Bei Königsberg passim.

TETRAHIT.

*Linn. Gen. Pl. nr. 178.*

668.

*Tetrahit caule erecto, foliis petiolatis.* Ger. Fl. Gall. Prov.

p. 270.

*Betonica verticillata, glabriuscula, calycibus spinosis.* Linn.

Sp. Pl. p. 1097.

K 3

Beto-



*Betonica arvensis* annua, flore ex albo flavescente. Tourn.  
Inst. p. 203.

*Sideritis arvensis, latifolia* glabra. C. B. P. p. 233.

Wilde Melisse. Loef. Fl. Bor. p. 255.

In Sabulosis hinter dem Aneiphößschen Walde.  
669.

*Tetrahit* seu

*Betonica verticillata, villosa, caulibus subspinosis.* Linn. Sp.  
Pl. p. 1097.

*Sideritis* I. Fuchf. H. p. 769.

*Sideritis vulgaris, hirsuta, erecta.* C. B. P. p. 233.

*Sideritis vulgaris* I. Clusf. H. l. 4. p. 39.

*Sideritis heraclea.* Tab. l. 1. p. 352.

Gliedkraut. Zeißkraut. Loef. Fl. Bor. p. 254.

Bei Holland in incultis.

## BETONICA.

Linn. Gen. Pl. nr. 571. Gouan H. R. M. p. 276.

670.

*Betonica spica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia, emarginata.* Linn. Sp. Pl. p. 573.

*Betonica purpurea.* C. B. P. p. 235. Tourn. Inst. p. 203.

Braun Betonien. Loef. Fl. Bor. p. 25.

Beim Donartschen Walde.

671.

*Betonica alba.* C. B. P. p. 235.

*Betonica albo flore.* Dod. Pempt. p. 39.

Weisse Betonien. Loef. Fl. Bor. p. 25.

Hinter Fischhausen im Rosenbusch.

## SATUREJA.

Linn. Gen. Pl. nr. 561. Gouan, H. R. M. p. 273.

672.

*Satureja pedunculis bifloris.* Linn. Sp. Pl. p. 568.

*Satureja hortensis, siue Cunila fatiua* Plinii. C. B. P.  
p. 208.

Pfeffer.

Pfefferkraut. Loef. Fl. Bor. p. 245.  
An der lauten Mühl auf der Mauer.

NEPETA.

Linn. Gen. Pl. nr. 570. Goëan. H. R. M. p. 247.

673.

Nepeta floribus spicatis, foliis petiolatis, cordatis, dentato-ferratis. Linn. Sp. Pl. p. 570.

Mentha cataria vulgaris et major. C. B. P. p. 228.

Nepeta vulgaris. Seb. in Trag. p. 12.

Cataria vulgaris major. Tourn. Inst. p. 502.

Raßen; Münch. Marien; Neßel. Loef. Fl. Bor. p. 161.

In pago Lasseken ad hortorum sepes.

HYSSOPUS.

Linn. Gen. Pl. nr. 565. Goëan. H. R. M. p. 274.

674.

Hyssopus spicis secundis. Linn. Spec. Pl. p. 217.

Hyssopus Officinarum coerulea seu spicata. C. B. P. p. 217.

Isop. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 36. nr. 210.

675.

Hyssopus, flore dilute coeruleo. Helw. Suppl. Fl. Boruff. p. 36. nr. 211.

676.

Hyssopus flore albo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 36. nr. 212.  
In coemiterio Angerburgensi.

AJUGA.

Linn. Gen. Pl. nr. 557. Goëan. H. R. M. p. 269.

677.

Ajuga stolonibus reptatricibus. Linn. Sp. Pl. p. 561.

Consolida media pratensis coerulea. C. B. P. p. 269.

Bugula. Dod. Pempt. p. 135. Tourn. Inst. p. 209.

Symphytum medium. Lonic. 179.

Blau; Güldengüßel. Loef. Fl. Bor. p. 50.

Ben dem Donartschen Walde.

K 4

678

678.

*Ajuga* seu*Consolida media pratensis purpurea*. C. B. P. p. 160.

Rohr Güldengüßel. Loef. Fl. Bor. p. 50.

Beim Ponartschen Walde.

679.

*Ajuga* siue*Bugula flore albo*. Weiß Güldengüßel. Helw. Suppl. Fl.

Bor. p. 6. nr. 27.

In der Sakunowschen Heide.

680.

*Ajuga* seu*Bugula flore cinereo*. Aschfarbichter Güldengüßel. Helw.

Suppl. Fl. Bor. p. 6. nr. 28.

In pratis editioribus im Reinschen.

## TEUCRIVM.

*Linn. Gen. Pl. nro. 338. Gouan. H. R. M. p. 269.*

681.

*Teucrium foliis ovatis, inciso-crenatis, petiolatis, floribus subverticillatis*. Linn. Sp. Pl. p. 565.*Chamaedrys spuria major altera seu frutescens*. C. B. P. p. 248.

Süsanke-Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 43.

Am Altstädtschen Walle.

682.

*Teucrium* siue*Chamaepyris Austriaca flore rubro, dilutiore*. Clus. H. 1.

p. 185.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 12. nr. 60.

In der Ogonschen Heide.

683.

*Teucrium* siue*Chamaepyris Austriaca flore cineraceo*. Clus. H. 1. p. 185.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 12. nr. 61.


684.

684.

Teucrium siue

Chamaeipyris Austriaca flore candido. Helw. Suppl. Fl. Bor.  
p. 12. nr. 62.

In der Ogonschen Heide.



# P E R S O N A T A E.

## V E R B E N A.

*Linn. Gen. Pl. nr. 20. Gouan H. R. M. p. 14.*

685.

**V**erbena tetrandra, spicis filiformibus, foliis multifido-  
laciniatis, caulibus numerosis. Linn. Sp. Pl. p. 20.

Verbena communis flore coeruleo. C. B. P. p. 269. Tourn.  
Inst. p. 200.

Verbena. Gesn. Hort. p. 285.

Verbenaca. Matth. Bauh. in Matth. p. 742.

Eisenkraut. Loef. Fl. Bor. p. 287.

In Kunken copiose. Im alten Hammer.

## P O L Y G A L A.

*Linn. Gen. Plant. nro. 686. Gouan, H. R. M. p. 354.*

686.

Polygala floribus cristatis, racemosis, caulibus herbaceis, sim-  
plicibus, procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. Linn.  
Spec. Pl. p. 702.

Polygala vulgaris. C. B. P. p. 215. Tourn. Inst. p. 174.

Polygala vulgaris minor. Clus. H. p. 325. Lib. 3.

Milch-Blume. Loef. Fl. Bor. p. 199.

Zwischen Lauten-Rühl und Bladau in umbrosis.

687.

Polygala major. C. B. P. p. 215.

Polygala major coerulea. Tab. l. p.

Blaue große Milch-Blum. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 54.  
nr. 322.

K 5

688

688.

Polygata flore violaceo. C. B. P. p. Boerh. Ind. alt. Pl.  
H. L. p. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 54. nr. 323.  
Hinter Höfen.

## PEDICULARIS.

Linn. Gen. Pl. p. 592. Gouan H. R. M. p. 298.

689.

- Pedicularis caule ramoso, calycibus oblongis, angulatis, lac-  
uibus, corollis labio cordato. Linn. Spec. Pl. p. 607.  
Pedicularis pratensis purpurea. C. B. P. p. 163.  
Pedicularis. Tab. l. 2. p. 470.  
Alectorolophi tertii alterum genus. Clus. H. l. 6. p. 211.  
Krause: Kraut mit purpurfarbenen Blumen. Loef. Fl. Bor.  
p. 190.  
In pratis riguis passim.

690.

Pedicularis pratensis candida. Loef. Fl. Bor. p. 191.  
In pratis bey'm Bretter: Krüge.

691.

Pedicularis pratensis flore ex albo purpurascente. C. B. P.  
p. 163. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 53. nr. 316.  
Auf dem Ungerburgschen Mozenischen Feldern.

692.

Pedicularis caule simplici, floribus terno-verticillatis, corol-  
lis clausis, calycibus crenatis, capsulis regularibus. Linn.  
Spec. Pl. p. 608.  
Pedicularis Alpina folio Ceterach. C. B. P. p. 163. Tourn.  
Inst. p. 173.  
Helw. Fl. Quasim. p. 39.  
In uliginoso prato, bey Ungerburg, rother Bruch, dicto.

## RHINANTHVS.

Linn. Gen. Plant. nr. 591. Gouan. H. R. M. p. 296.

693.

Rhinanthus corollarum labio superiore compresso, breuiore.  
Linn. Sp. Pl. p. 603. Tourn. Inst. p. 172.

Pedicu-

*Pedicularis pratensis lutea*, siue *Crista Galli*. C. B. P. p. 163  
*Pedicularia lutea*. Tab. I. 2. p. 470. *Alectorolophus*. Zinn.  
 Cat. Pl. H. G. p. 288.

Geel Läuse-Kraut. Klapper. Loef. Fl. Bor. p. 190.  
 In pratis editioribus passim.

694.

*Rhinanthus seu*  
*Pedicularis Alpina*, floribus spicatis pallidis. Tourn. Inst.  
 p. 172.

*Crista Galli montana*, floribus pallidis, in spicam congestis.  
 Raji.

*Crista Galli angustifolia montana*. C. B. P. p. 163. Ej. Pr.  
 p. 86.

*Pedicularis, conica, tetragona, corollis dense compactis.*  
 Läuse-Kraut, dessen Blumen: Mehr, einen vierkantigen Re-  
 gel vorstellen.

Bei Bischoffswerder am Land: Wege.

## MELAMPYRUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 549. Gouan H. R. M. p. 207.

695.

*Melampyrum spicis conicis, laxis, laceris*. Linn. Sp. Plant.  
 p. 605.

*Melampyrum purpurascente coma*. C. B. P. p. 234.

*Triticum vaccinum*. Dod. Pempt. p. 541.

Braun achte Wald-Hirse oder Kuhweizen. Loef. Fl. Bor.  
 p. 160.

Hinter der Liede in incultis.

696.

*Melampyrum florum conjugationibus remotis, corollis clau-  
 sis*. Linn. Sp. Pl. p. 605.

*Melampyrum luteum latifolium*. C. B. P. p. 234.

*Mylium sylvaticum* I. et II. Tab. I. 1. p. 537.

*Parietaria sylvestris secunda*. Clus. H. I. 4. p. 44.

Kuhweizen. Tag und Nacht. Loef. Fl. Bor. p. 160.

Ad margines sylvarum, passim.

697.

697.

Melampyrum minus, coma candida. C. B. P. p. 234.

Ruhweizen mit weißer Blüt. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 47.  
nr. 276.

In der Heide.

## EUPHRASIA.

Linn. Gen. Pl. nr. 594. Götian. H. R. M. p. 269.

698.

- Euphrasia foliis ovatis, argute dentatis. Linn. Spec. Plant. p. 604.

Euphrasia Officinarum. C. B. P. p. 233. Tourn. Inst. p. 174.

Fuchf. p. 246. Tab. l. 2. p. 533. Dod. Pempt. p. 54.

Mugentrost. Loef. Fl. Bor. p. 71.

In pratis bey Königsberg passim.

696.

Euphrasia foliis linearibus, omnibus serratis. Linn. Sp. Pl. p. 604.

Euphrasia pratensis rubra. C. B. P. p. 234.

Odontides I. Tab. l. 1. p. 682. Zinn. Cat. Pl. G. p. 289.

Ericoides rubrum. Thal. p. 4.

Brauner Mugentrost. Loef. Fl. Bor. p. 73.

In locis incultis passim.

## DIGITALIS.

Linn. Gen. Plant. nr. 514. Götian. H. R. M. p. 504.

700.

Digitalis. Linn. Spec. Plant. p. 64.

Digitatis lutea. Fuchf. 894. Tab. l. 1. p. 271.

Campanula sylvestris. Tragi. Kyp. in Trag. p. 889.

Geeler Fingerhut, oder Waldblöcklein. Loef. Fl. Bor. p. 61.

Sinter Quednau auf dem Berge copiose.

## LINNAEA.

Linn. Gen. Pl. nr. 624. Götian. H. R. M. p. 397.

701.

Linnaea floribus geminatis. Linn. Sp. Pl. p. 631.

Campa-

## PERPONATAE.

157

*Campanula serpillifolia.* C. B. P. p. 93. Ejus. Prodr. Th.  
p. 35. Helw. Fl. Quasim. p.  
An der Eurischen Näherung in locis opacis et humidis.

## OROBANCHE.

Linn. Gen. Pl. nr. 396. Gouan, H. R. M. p. 308.

702.

*Orobanche caule simplicissimo, pubescente, staminibus inclusis.* Linn. Spec. Pl. p. 632.

*Orobanche major, Garyophyllum olens.* C. B. P. p. 87.

*Orobanche.* Matth. deutsch. p. 198.

*Leonina herba et legumen leoninum.* Ruell. p. 390.

*Sommerrurk. Ermenwürger.* Loef. Fl. Bor. p. 186.

In der Lapainen in incultis nach der See zu.

703.

*Orobanche μονόκλωνος flosculis pediculis insidentibus, radice acuminata.* Loef. Fl. Bor. p. 187.

In der Fischhäusischen Heide passim.

## LATHRAEA.

Linn. Gen. Pl. nr. 597.

704.

*Lathraea caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido.* Linn. Sp. Pl. p. 606.

*Orobanche radice dentata major.* C. B. P. p. 88. Squamaria. Zinn. Cat. Plant. H. G. p. 277.

*Große Schupwurk. Amblat.* Loef. Fl. Bor. p. 187.

In der Hollengrund.

## SCROPHULARIA.

Linn. Gen. Pl. nr. 612. Gouan H. R. M. p. 303.

705.

*Scrophularia foliis cordatis, basi transuersis, caule obtusangulo.* Linn. Sp. Pl. p. 619.

*Scrophularia nodosa foetida.* C. B. Pr. p. 235. Tourn. Inst. p. 166.

Scrophil.



Scrophularia. Bauh. in Matth. p. 791. Dod. Pempt. p. 50.

Ocismastrum alterum Tragi. Kyp. in Trag. p. 184.

Braunwurk. Loef. Fl. Bor. p. 250.

In der Hollengrund passim.

706.

- Scrophularia foliis cordatis, petiolatis, decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. Linn. Sp. Plant. p. 620.

Scrophularia aquatica major caule fimbriato. Groß Wasser:

Braunwurk. Creußnessel. Loef. Fl. Bor. p. 248.

Scrophularia aquatica major. C. B. P. p. 235.

In fossis bey der Hollengrund.

## ANTIRRHINUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 589. Gouan. H. R. M. p. 299.

707.

- Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus, confertis, caule erecto, spicis terminalibus, sessilibus, floribus imbricatis. Linn. Sp. Pl. p. 616.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. C. B. P. p. 212. Tourn. Inst. p. 170.

Osyris. Fuchf. H. p. 453. Tab. l. 2. p. 497.

Flachs: Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 242.

In siccis et apricis habitat.

708.

Antirrhinum corollis ecaudatis, calycibus rotundatis. Linn. Spec. Pl. p.

Antirrhinum majus, alterum, folio longiore. C. B. P. p. 211.

Drant. Brackenhaupt. Löwenmaul. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 3. nr. 15.

Inter segetes, in locis sabulosis im Oberlande.

709.

Amirrhinum seu

Linaria maritima, floribus odoratis. Meer: Harn: Kraut, mit wohlriechenden Blumen. Loef. Fl. Bor. p. 242.

By Sarkau an den Seebergen.

710.

Antirrhinum seu

Linaria montana, flosculis albicantibus. C. B. P. p. 213.

Linaria adulterina. Tab. I. 2. p. 500.

Falsch Lein; Kraut. Wulff. Spec. Inaug. p. 15.

Crescit inter frutices bey der Bartschen Mühle.

711.

Antirrhinum foliis cordatis, quinquelobis, alternis. Linn.  
Sp. Pl. p. 612.Cymbalaria. C. B. P. p. 306. Cam. Ep. p. 860. Helw.  
Fl. Quasim. p. 30.

In rudibus murorum Friedlandensium.

## UTRICULARIA.

Linn. Gen. Plant. nr. 24. Gouan H. R. M. p. 14.

712.

Utricularia nectario conico. Linn. Sp. Pl. p. 18.

Mullefolium aquaticum lenticulatum. C. B. P. p. 141.

Foeniculum aquaticum galericulatum. Tab. I. 1. p. 178.

Wasser; Garb mit geeten Blümlein. Loef. Flor. Boruss.  
p. 164.

In fossis nach dem Bretter; Krüge.

## FUMARIA.

Linn. Gen. Pl. nr. 685. Gouan. H. R. M. p. 33.

713.

Fumaria caule simplici. Linn. Sp. Pl. p. 699.

Fumaria bulbosa, radice caua, major. C. B. P. p. 143.

Aristolochia rotunda. Brunf. Tom. 1. p. 49.

Pistolochia. Fuchf. p. 91.

Radix caua Herbariorum. Lob. Adv. p. 271.

Gemeine Hollwurk. Loef. Fl. Bor. p. 77.

Hinter Neuendorf im Walde.

714.

Fumaria bulbosa, radice non caua. C. B. P. p. 144.

Chelidonia capnites, radice nigra. Thal. p. 33.

Erde

Erdrauch mit rund dichter Wurzel. Loefl. Flor. Boruss.  
p. 78.

In der Hossengrund.

715.

- *Fumaria pericarpis*, monospermis, racemosis, caule diffuso,  
Linn. Sp. Pl. p. 700.

*Fumaria Officinarum et Dioscoridis*. C. B. P. p. 143.

Tourn. Inst. p. 422.

*Fumus terrae*. Brunf. Tom. 1. p. 99.

Erdrauch. Loefl. Fl. Bor. p. 77.

- Inter segetes nach der Lauten; Mühle zu.

### IMPATIENS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 822. Gouan H. R. M. p. 467.*


716.

*Impatiens pedunculis multifloris*, solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis, tumenibus. Linn. Sp. Pl. p. 938.

*Balsamina lutea*, seu *Noli me tangere*. C. B. P. p. 306.

Spring; Krant. Loefl. Fl. Bor. p. 23.

In locis umbrosis hinter dem alten Hammer.



## ASPERIFOLIAE.

### MYOSOTIS.

*Linn. Gen. Pl. nro. 844. Gouan H. R. M. p. 79.*

717.

**M***Yosotis* seminibus nudis, foliorum apicibus callosis.  
Linn. Sp. Pl. p. 131.

*Echium scorpioides arvense*. C. B. P. p. 254.

*Lithospermum arvense*. Tourn. Inst. p. 137.

Blaue Maus; Oehrlein. Vergiß mein nicht. Loefl. Fl. Bor.  
p. 63.

Circa Regiomontum passim.

718.

718.

*Myosotis* seu

*Echium scorpioides arvense* flosculis niueis. *Weisse Acker-*

*Mäuß; Dehrlein.* Loef. Fl. Bor. p. 63.

In locis umbrosis am Thiergarten bey Neuhaß.

719.

*Myosotis* seu

*Echium scorpioides minus*, flosculis luteis. C. B. P. p. 254.

Wulff. Spec. Inaug. p. 12.

Crescit in frutetis montanis aridis prope ~~Sonnenhagen.~~

720.

*Myosotis* siue

*Echium scorpioides minus*, flosculis roseis. Wulff. Spec.

Inaug. p. 12.

In locis aridis passim crescit.

721.

*Myosotis* feminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis pilosis. Linn. Sp. Pl. p. 131.

*Cynoglossum minus.* C. B. P. p. 257.

*Kletten; Kraut.* Loef. Fl. Bor. p. 60.

In Neuendorf am Thamm copiose,

722.

*Myosotis* foliis glabris. Linn. Sp. Pl. p. 131.

*Echium scorpioides palustre.* C. B. P. p. 64.

*Blaue Wasser; Mäuß; Dehrlein.* Loef. Fl. Bor. p. 64.

Bey Königsberg passim.

723.

*Myosotis* siue

*Lithospermum palustre minus*, flore albo. Tour. Inst. p. 137.

*Weisse Wasser; Mäuß; Dehrlein.* Helw. Suppl. Fl. Bor.

p. 45. nr. 258.

In sylvis.

724.

*Myosotis* seu

*Lithospermum*, siue *Echium scorpioides palustre*, flore toto

roseo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 45. nr. 259.

L

LITHO-

## LITHOSPERMUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 132. Göian H. R. M. p. 80.*

725.

- *Lithospermum* seminibus laevibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis. *Linn. Sp. Pl. p. 132.*  
*Lithospermum majus erectum. C. B. P. p. 258.*  
*Lithospermum aruense. Tab. l. 2. p. 523.*  
*Meer: Hirsén. Stein: Saamen. Loef. Fl. Bor. p. 142.*  
*In arenosis beyñ Neuhäusischen Schlosse.*

726.

- Lithospermum* seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus: *Linn. Sp. Pl. p. 131.*  
*Anchusa aruensis minor, facie milii folis. Tab. l. 2. p. 522.*  
*Rothe Ochsen: Zunge. Loef. Fl. Bor. p. 143.*  
*Am Aneiphöfchen Walle passim.*

## ANCHUSA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 133. Göian, H. R. M. p. 81.*

727.

- *Anchusa* foliis lanceolatis, spicis imbricatis, secundis. *Linn. Spec. Pl. p. 133.*  
*Buglossum angustifolium majus. C. B. P. p. 256.*  
*Buglossum vulgare. Bauh. in Matth. p. 829.*  
*Große schmalblättrige Ochsen: Zunge. Loef. Fl. Bor. p. 30.*  
*In locis sabulosis passim bey Königsberg.*

728.

- Anchusa* siue  
*Buglossum flore albo. Loef. Fl. Bor. p. 30.*  
*Bey Kragau in districtu Fischhusensi.*

729.

- Anchusa* racemis subnudis, conjugatis. *Linn. Spec. Plant. p. 133.*  
*Buglossum sylvestre minus alterum et asperius. C. B. P. p. 256.*  
*Anchusa minima, Cord. H. p. 93.*

Walds

Walb: Ochsenzung. Loef. Fl. Bor. p. 30.  
In agris cultis.

CYNOGLOSSUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 134. Gouan. H. R. M. p. 81.

730.

- Cynoglossum staminibus, corolla brevioribus, foliis lato lanceolatis, tomentosis, sessilibus. Linn. Sp. Pl. p. 134.

Cynoglossum majus vulgare. C. B. P. p. 257.

Große Hundszung. Loef. Fl. Bor. p. 60.

Inter segetes passim.

731.

Cynoglossum majus vulgare flore albo. Wulff. Spec. Inaug. p. 12.

Circa sepes in Friedrichstein.

732.

Cynoglossum sine Buglossum angustifolium, semine echinato lignosius, flore coerulesco. Hochwachsendes Klettens Kraut.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 6. nr. 25.

Auf dem Berge Terklo im Reinschen.

733.

Cynoglossum sine Buglossum angustifolium, semine echinato lignosius, floribus albis. Hochwachsendes Klettens Kraut, mit weißer Blüt. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 6. nr. 26.

PULMONARIA.

Linn. Gen. Pl. nro. 136. Gouan H. R. M. p. 81.

734.

- Pulmonaria foliis radicalibus ovato-cordatis, scabris. Linn. Spec. Pl. p. 135.

Symphytum maculosum sine Pulmonaria latifolia. C. B. P. p. 265.

Lungen-Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 265.

Im Donartschen Walde.

L 2

753

735.

*Pulmonaria angustifolia* seu *spicata*, flore albo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 55. nr. 330.

In der Ogonschen Heide.

736.

*Pulmonaria vulgaris, latifolia*, flore albo. Linn. Sp. Plant. p. 135.

Tournef. Inst. p. 136.

*Symphytum maculosum*, seu *Pulmonaria latifolia*, flore albo.

C. B. P. p. 260.

Weiß Lungen-Kraut. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 47.

In sylvis passim.

737.

*Pulmonaria angustifolia, coerulea*, seu *Symphytum maculosum*. C. B. P. p. 260.

*Pulmonaria terria*, seu *angustifolia*, coeruleo flore. Clus. H. Car.

Spitzig und vollblühendes Lungen-Kraut. Helw. Fl. Quasi. p. 47.

In Pinetis passim.

# SYMPHYTUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 135. Gouan. H. R. M. p. 83.

738.

*Symphytum foliis ovato-lanceolatis, decurrentibus*. Linn. Spec. Pl. p. 136.

*Symphytum, Consolida major*. C. B. P. p. 259.

Tourn. Inst. p. 138.

*Consolida major*. Tragi Kyp. in Trag. p. 240.

Walt: Wurk. Weinwelle. Loef. Fl. Bor. p. 264.

Ad fossas et juxta fluminum ripas.

739.

*Symphytum, Consolida major, flore dilute rubente, siue pallido*. Weinwelle, oder Schwarzwurk mit blaßrothet Blüte. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 63. nr. 385.

ASPERV-

ASPERUGO.

*Linn. Gen. Pl. nro. 140. Gouan, H. R. M. p. 85.*

740.

*Asperugo. Linn. Sp. Pl. p. 1038.*

*Buglossum sylvestre, caulibus procumbentibus. C. B. P. p. 257.*

*Asperugo vulgaris. Tournef. Inst. p. 135.*

*Aparine major Plinii. Tab. l. 2. p. 467.*

*Schlangenaugelein. Loef. Fl. Bor. p. 30.*

*Am Kneiphöfischen Walle.*

ECHIMUM.

*Linn. Gen. Pl. n. 139. Gouan H. R. M. p. 86.*

741.

*Echium caule simplici erecto, foliis caulinis, lanceolatis, hispidois, floribus spicatis, lateralibus. Linnæi. Spec. Plant. p. 139.*

*Echium vulgare. C. B. P. p. 254.*

*Wilde Ochsen-Zung. Loef. Fl. Bor. p. 64.*

*Wey lauten; Mühle in locis aridis et salebrosis.*

742.

*Echium vulgare flore albo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 18. nr. 99.*

*In salebrosis auf dem Orgonschen Felde.*

743.

*Echium vulgare flore incarnaro. Helw. Suppl. Fl. Boruss. p. 19. nr. 101.*


744.

*Echium vulgare flore pallide coeruleo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 19. nr. 102.*

745.

*Echium vulgare flore variegato. Helw. Suppl. Fl. Boruss. p. 19. nr. 103.*





# ROTACEAE.

## PRIMULA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 144. Gouan. H. R. M. p. 88.*

746.

- **P**rimula foliis dentatis. Linn. Sp. Pl. p. 142.
- Verbascum pratense odoratum. C. B. P. p. 241.
- Primula veris. Bauh. in Matth. p. 801.
- Primula veris, siue Prima. Tab. l. 2. p. 34.
- Schlüsselblumen. Loef. Fl. Bor. p. 279.
- Ad sylvarum margines passim.

## MENYANTHES.

*Linn. Gen. Plant. nr. 147. Gouan. H. R. M. p. 89.*

748.

- Menyanthes foliis cordatis, integerrimis, corollis, ciliatis.
- Linn. Sp. Pl. p. 145.
- Nymphaea lutea minor, paruo flore. C. B. P. p. 194.
- Kleine gelbe See-Kannen. Loef. Fl. Bor. p. 178.
- In fossis nach dem Bretter-Krüge zu.
- 749.
- Menyanthes foliis ternatis. Linn. Sp. Pl. p. 145.
- Trifolium palustre. C. B. P. p. 327.
- Wiber, Klee, Drenblatt. Loef. Fl. Bor. p. 271.
- In locis uliginosis et palustribus.

## LYSIMACHIA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 149. Gouan. H. R. M. p. 90.*

750.

- Lyfimachia paniculata, racemis terminalibus. Linn. Sp. Pl. p. 146.
- Lyfimachia lutea major, quae Dioscoridis. C. B. P. p. 150.
- Lyfimachia lutea major. Tourn. Inst. p. 141.
- Großer geeler Wendetich. Loef. Fl. Bor. p. 150.
- Iuxta riuos passim.

751.

751.

*Lyfimachia racemis lateralibus, pedunculatis.* Linn. Sp. Pl. p. 147.

*Lyfimachia bifolia, flore globofo luteo.* C. B. P. p. 245.  
Wäſer; Wenderich. Loef. Fl. Bor. p. 151.

Ad foſſas in der Hollengrund.

752.

*Lyfimachia foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente.* Linn. Sp. Pl. p. 148.

*Nummularia major lutea.* C. B. P. p. 309.

*Nummularia ſeu Centmorbia.* Lob. Adv. p. 474.

Œſennigkraut. Wäſer; Polen. Loef. Fl. Bor. p. 177.

In locis humidis circa fluenta.

## ANAGALLIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 150. Gouan, H. R. M. p. 92.*

753.

● *Anagallis foliis indiuiſis, caule procumbente.* Linn. Sp. Pl. p. 148.

*Anagallis phoeniceo flore.* C. B. P. p. 252.

*Anagallis mas.* Seb. in Trag. p. 307.

Kroter Gauchheil. Kroter Meyer. Loef. Fl. Bor. p. 14.  
Inter ſegetes.

## LIMOSELLA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 626.*

754.

*Limofella.* Linn. Spec. Pl. p. 631.

*Limofella annua.* Lind. Alf. p. 156. Tab. 5.

*Plantaginella paluſtris.* C. B. P. p. 190.

*Spér gula perpuſilla, lanceolatis foliolis.* Loef. Fl. Beruff. p. 261.

*Aline paluſtris exigua, foliis lanceolatis.* Menz. Pug. p. 2.  
Tab. 7. Fig. 6. *Limofella.* Zinn. Cat. Plant. Hor. A. G. p. 276.

Ben Sackau zwiſchen Haſſ und Ser.

L 4

SWER-

## SWERTIA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 237,*

755.

*Swertia corollis, quinquefidis, foliis radicalibus, ovalibus.*  
*Linn. Sp. Pl. p. 226.*

*Gentiana palustris angustifolia.* Lungen : Kraut. Blauer  
 Tarant. Loef. Fl. Bor. p. 102.

*Gentiana minima.* Matth. deutsch. p. 258.

*Gentiana XII, punctato flore.* Clus. Hist. l. 1. p. 316.

Ben Weissenstein. Ben Creutzburg.

## GENTIANA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 236. Gouan. H. R. M. p. 128.*

756.

• *Gentiana corollis quinquefidis, infundibili formibus, caule  
 dichotomo.* Linn. Sp. Pl. p. 229.

*Centaureum minus.* C. B. P. p. 278.

Klein Tausendgülden : Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 41.

Byhm Donartschen Walde.

757.

*Gentiana feu*

*Centaureum minus flore pallidiore.* Helw. Suppl. Fl. Bor.  
 p. 11. nr. 55.

758.

*Gentiana feu*

*Centaureum minus flore albo.* Loef. Fl. Bor. p. 41.

759.

*Gentiana corollis quadrifidis, imberbibus, verticillatis, sessi-  
 libus.* Linn. Sp. Pl. p. 231.

*Gentiana cruciata.* C. B. P. p. 188.

*Gentiana minor siue Crucjata.* Lob. Adv. p.

Modelgeer. Klein Engian. Loef. Fl. Bor. p. 101.

In locis incultis ben Wijdehlen.

760.

*Gentiana corollis quinquefidis, infundibili formibus, ramis  
 unifloris, alternis.* Linn. Sp. Pl. p. 229.

Genti-

*Gentiana Alpina aestiva*, centaureae minoris folio. Tourn.  
Inst. p. 81. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 26. nr. 146. C.  
B. P. p. 188.

In pratis editioribus.

761.

*Gentiana corollis quadrifidis*, fauce barbatis. Linn. Sp. Pl.  
p. 231.

*Gentiana coerulea* oris pilosis. C. B. P. p. 188. Tourn.  
Inst. p. 81. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 26. nr. 147.

In der Ogonschen Heide.

762.

*Gentiana cruciata* major, firmis et erectis caulibus. Clus.  
Hist. rar. p. 123.

Aufrecht stehende Nobelgeer, oder Kreuzwurz. Helw.  
Suppl. Fl. Bor. p. 25. nr. 145.

In Reihn im Schloßgarten.



# SOLANACEAE.

## VERBASCUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 182. Gouan, H. R. M. p. 103.

763.

*Verbascum* foliis decurrentibus, utrimque tomentosis.  
Linn. Sp. Pl. p. 177.

*Verbascum mas latifolium* luteum. C. B. P. p. 239.

*Verbascum mas*. Tab. l. 2. p. 166. Lob. Adv. p. 242.

Wulfraut. Königsferk. Loef. Fl. Bor. p. 279.

Den Holland und Frenstadt copiose.

764.

*Verbascum* foliis cordato-oblongis, petiolatis. Linn. Spec.  
Plant. p. 178.

*Verbascum nigrum* flore exluteo purpurascente. C. B. P.  
p. 240.

Tourn. Inst. p. 147.

L 5

Ver-

*Verbascum nigrum*. Tragi. Kyper. in Trag. p. 218. Tab.

l. 2. p. 267. Dod. Pempt. p. 144.

Schwarz Wulffraut. Loef. Fl. Bor. p. 280.

In der Hollengrund.

765.

*Verbascum nigrum*, flore candido, in medutullio purpurascen-  
cente. Loef. Fl. Bor. p. 281.

In pago Bersitten im Osterodischen.

766.

*Verbascum foemina*, flore luteo magno. C. B. P. p.

Schwarz Wulffraut, oder Kerkenkraut mit großer gelber  
Blut. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 65. nr. 396.

Auf dem Johannisburgschen Kirchhoff.

767.

*Verbascum foliis amplexicaulibus, oblongis, glabris, pedun-  
culis solitariis*. Linn. Spec. Pl. p. 178.

*Blattaria lutea*, folio longo laciniato. C. B. P. p. 240.

*Blattaria*. Dod. Pempt.

*Blattaria lutea*. Gold-Knöpflein. Wigand. de H. Pr. p. 48.

Motten-Kraut. Helw. Fl. Quasim. p. 26.

In pratis et circa sepes bey Wenzewen im Eckersbergischen.  
It. Bey Ottenhagen.

## DROSER A.

Linn. Gen. Plant. nr. 307. Gouan H. R. M. p. 160.

768.

*Drosera scapis radicatis, foliis orbiculatis*. Linn. Sp. Plant.  
p. 281.

*Ros Solis folio rotundo*. C. B. P. p. 357.

*Ros Solis*. Dod. Pempt. p. 474.

Rundblättrichter Sonnen-Lchau. Loef. Fl. Bor. p. 231.

In muscosis et uliginosis passim bey Friedrichstein.

769.

*Drosera scapis radiatis, foliis oblongis*. Linn. Spec. Plant.  
p. 282.

*Ros Solis folio oblongo*. C. B. P. p. 282.

Salzi-

Saliflora, siue Sponfa Solis, siue Rorella. Thal. Sylv. Herc.  
p. 116.

Kleine Sonnenthau. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 60. nr. 360.  
Auf dem Reifischen Werder.

D A T U R A.

Linn. Gen. Pl. nr. 177. Gouan. H. R. M. p. 104.

770.

- Datura pericarpis spinosis, erectis, ouatis. Linn. Sp. Plant.  
p. 179.

Stramonium fructu spinoso, oblongo, flore albo. C. B. P.  
p. 155.

Tatula. Cam. Ep. p. 176.

Stingende Stach: Nessel. Helw. Fl. Quasim. p. 47.

Ad Sepes hortorum in pagis passim.

H Y O S C Y A M U S.

Linn. Gen. Pl. nr. 178. Gouan. H. R. M. p. 105.

771.

- Hyoscyamus foliis petiolatis, floribus sessilibus. Linn. Sp.  
Plant. p. 180.

Hyoscyamus albus, major. C. B. P. p. 169.

Hyoscyamus albus. Math. deutsch. p. 460.

Wissen: Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 127. Tourn. Inst. p. 148.

Circa sepes passim.

S O L A N U M.

Linn. Gen. Pl. nr. 169. Gouan. H. R. M. p. 108.

772.

- Solanum caule inermi, frutescente, flexuoso, foliis supe-  
rioribus hastatis, racemis eymosis. Linn. Spec. Plant.  
p. 185.

Solanum scandens seu Dulcamara. C. B. P. p. 167.

Dulcamara. Dod. Pempt. p. 402. Tourn. Inst. p. 149.

Je länger je lieber. Loef. Fl. Bor. p. 256.

Iuxta fluentia im alten Hammer.

773.

- *Solanum caule inermi*, herbaceo, foliis ovatis, dentato-angularis, umbellis nutantibus. Linn. Sp. Pl. p. 586.  
*Solanum Officinatum*. C. B. P. p. 166.  
*Solanum hortense*. Matth. deutsch. p. 462.  
 Nachschatten. Loef. Fl. Bor. p. 256.  
 Ad sepes hortorum passim.

774.

- Solanum caule inermi*, herbacea, foliis pinnatis integerrimis. Linn. Sp. Pl. p. 185.  
*Solanum tuberosum esculentum*. C. B. P. p. 167. Ej. Pr. p. 167.  
 Kartoffeln.  
 Non solum horti, sed toti campi hac Planta Americana, ceu Inquilina, luxuriant. Ad cibum inserviunt plebi, et amyllum ex radicibus conficitur.



## VOLVBILES.

### CONVOLVULVS.

*Linn. Gen. Pl. no. 157. Gouan, H. R. M. p. 98.*

775.

- C**onvoluolus, foliis sagittatis, utrimque acutis, pedunculis, unifloris. Linn. Sp. Pl. p. 153.  
*Convoluolus minor aruensis*. C. B. P. p. 52.  
*Volubilis aruensis*, flore roseo. Tab. L. 2. p. 550.  
 Kleine weiße Uckerwinde. Loef. Fl. Bor. p. 52.  
 Inter segetes passim.

776.

- Convoluolus foliis sagittatis, postice truncatis, pedunculis unifloris*. Linn. Sp. Pl. p. 153.  
*Convoluolus major albus*. C. B. P. p. 51.  
 Große Winde. Zaunglocken. Loef. Fl. Bor. p. 51.  
 In der Hollengeund.

ANTHYL-

## ANTHYLLIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 712. Gössan. H. R. M. p. 360.*

777.

*Anthyllis herbacea foliis quaternopinnatis, floribus lateralibus. Linn. Spec. Pl. p. 719.*


*Loto affinis, Vulneraria pratensis. C. B. P. p. 332.*

*Anthyllis leguminosa. Clus. H. p. 232.*

*Lagopodium flore luteo. Tab. I. 2. p. 226.*

*Geeler Haasen, Klee. Berg-Kraut. Loef. Flor. Boruss. p. 144.*

*In incultis ben Lauten; Mühl.*



## BILOCVLARES.

## FRAXINVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 933. Gössan H. R. M. p. 520.*

778.

**F***raxinus foliis serratis, floribus apetalis. Linn. Sp. Plant. p. 1057.*

*Fraxinus excelsior. C. B. P. p. 416.*

*Fraxinus. Brunf. lat. Tom. 3. p. 237. Dod. Pempt. p. 833. Tourn. Inst. p. 577.*

*Eschenbaum. Loef. Fl. Bor. p. 76.*

*In sylvis uliginosis passim.*

## LIGVSTRVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 114. Gössan. H. R. M. p. 6.*

779.

*Ligustrum. Linn. Sp. Pl. p. 7. Tourn. Inst. p. 596.*

*Ligustrum Germanicum. C. B. P. p. 475.*

*Phyllirea. Dod. Pempt. p. 775.*

*Hartriegel. Weinholz. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 44. nr. 254.*

*In hortis passim.*

VERO.



## VERONICA.

*Linn. Gen. Plant. nr. 20. Gouan H. R. M. p. 9.*

780.

*Veronica spicis terminalibus, foliis oppositis, lanceolatis, serratis, acuminatis. Linn. Sp. Pl. p. 10.*

*Veronica spicata Longifolia, spicis florum candidissimis.*

*Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 65. nr. 400.*

Auf dem Neussischen Werder.

781.

*Veronica spica terminali, foliis oppositis, crenatis, obtusis, caule adscendente, simplicissimo. Linn. Sp. Pl. p. 10.*

*Veronica spicata angustifolia. C. B. P. p. 246.*

*Veronica recta vulgaris major. Clus. H. l. 3. p. 347.*

Aufrechstehender Ehrenpreis. Schwalcken-Zagel. Loef.

*Fl. Bor. p. 283.*

In ericetis bey Brandenburg.

782.

*Veronica spicis lateralibus, pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. Linn. Sp. Pl. p. 11.*

*Veronica mas supina et vulgarissima. C. B. P. p. 246.*

*Tourn. Inst. p. 143.*

Ehrenpreis. Loef. *Fl. Bor. p. 282.*

In apricis passim.

783.

*Veronica racemo terminali, suspicato, foliis ovatis, glabris, crenatis. Linn. Sp. Pl. p. 12.*

*Veronica pratensis serpillifolia. C. B. P. p. 247.*

*Teucrium alterum. Seb. in Trag. p. 165. Loef. Fl. Bor.*

*p. 283.*

Bei Königsberg passim.

784.

*Veronica racemis lateralibus, foliis ovatis, planis, caule repente. Linn. Sp. Pl. p. 12.*

*Anagallis aquatica major, folio oblongo. C. B. P. p. 252.*

*Berula major. Tab. l. 2. p. 305.*

Große

Große Bachbungen mit länglichten Blättern, Loef. Fl. Bor.

p. 14.

An den Flüssen hin und wieder.

785.

Veronica seu

Anagallis aquatica minor, folio oblongo. C. B. P. p. 552.

Anagallis aquatica minor II Tab. I. 2. p. 395.

Kleine Bachbungen mit Polenblättern. Loef. Flor. Boruss.

p. 14.

Riuulis et fossis assistit.

786.

Veronica seu

Anagallis aquatica folio subrotundo, reptante cauliculo,

Loef. Fl. Bor. p. 14.

Auf der Wiese gegen Jerusalem über.

787.

Veronica sue

Anagallis aquatica breuiore, oblongo folio, semine biseutato.

Loef. Fl. Bor. p. 15.

In loco arenoso im Dorf Sarcfau, nach dem Eurischen Hasse zu.

788.

Veronica sue

Anagallis aquatica longiore, angusto folio, semine biseutato.

Loef. Fl. Bor. p. 15.

Hinten dem Tragheimschen Walle, nicht weit vom Oberteich.

789.

Veronica racemis lateralibus, foliis cordatis, rugosis, dentatis, caule striato. Linn. Spec. Pl. p. 13.

Veronica pratensis omnium maxima. Buxb. Cent. I. p. 23.

Tab. 34.

Veronica multicaulis, Pannonica. Tourn. Inst. p. 145.

Chamaedris spuria, major, latifolia. C. B. P. p. 65.

Viessenglichter wilder Ehrenpreis. Helw. Suppl. Fl. Bor.

p. 65. nr. 398.

In editoribus pratis et locis gramineis.

790

790.

*Veronica pillulas ferens* seu *Anagallis Pillulifera Menzelii*,  
Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 65. nr. 399.

In riuis passim.

791.

*Veronica floribus solitariis, foliis cordatis, incis, pedunculo longioribus*. Linn. Sp. Pl. p. 13.

*Alfne veronicae foliis, flosculis cauliculis adhaerentibus*,  
C. B. P. p. 250.

*Alfne veronicae folio*. Tab. l. 2. p. 290.

Hünerdarm mit Ehrenpreis Blätter. Loef. Fl. Bor. p. 13.

In agris.

792.

*Veronica floribus solitariis, foliis cordatis, planis, quinquelobis*. Linn. Sp. Pl. p. 13.

*Alfne hederulae folio*. C. B. P. p. 250.

*Centunculus hirsutior*. Caef. l. 6. cap. 53. p. 259.

*Alfne hederacea*. Tab. l. 2. p. 384.

Hünerdarm mit Epheublätter. Loef. Fl. Bor. p. 13.

Am Wall.

793.

*Veronica floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculo brevioribus*. Linn. Sp. Pl. p. 14.

*Alfne tryphyllos coerulea*. C. B. P. p. 250.

*Alfne recta*. Tab. l. 2. p. 383.

Drenblättricht Vogel: Meyer mit blauen Blümlein. Loef.  
Fl. Bor. p. 13.

In agris.

## GLAUX.

Linn. Gen. Plant. nr. 213.

794.

*Glaux*. Linn. Sp. Pl. p. 207.

*Glaux maritima*. C. B. P. p. 215.

*Alfne bifolia, fructu Coriandri, radice geniculata*. Loef. Fl.  
Bor. p. 13.

Ben Kahlholz in districtu Balgen in pratis.

CONTOR-



# CONTORTAE.

## PERVINCA.

*Linn. Gen. Pl. nro. 217. Gouan, H. R. M. p. 119.*

795.

• **P**ervinca corollae tubo amplo, patente. Ger. Fl. Gallo-  
Pr. p. 326.

Peruinca vulgaris flore coeruleo. Tourn. Inst. p. 119.

Clematis Daphnoides major, flore coeruleo. C. B. P. p. 302.

Dod. Pempt. p. 406.

Vinca caulibus erectis, foliis ovatis. Linn. Sp. Pl. p. 209.

Wintergrün. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 53. nr. 319.

Ad sepes hortorum sepe obuia.

## ASCLEPIAS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 224. Gouan H. R. M. p. 121.*

796.

• **A**sclepias foliis ovatis, basi barbatis, caule erecto, umbel-  
lis proliferis. Linn. Spec. Pl. p. 218.


Asclepias albo flore. C. B. P. p. 303. Tourn. Inst. p. 94.

Hirundinaria. Seb. in Trag. p. 144.

Vincetoxium. Matth. deutsch. p. 336.

Schwalbenwurz. Loef. Fl. Bor. p. 20.

In der Hollengrund. Bey St. Albrecht an den Seebergen.



# OLERACEAE.

## CHENOPODIUM.

*Linn. Gen. Pl. nro. 230. Gouan, H. R. M. p. 123.*

797.

**C**henopodium foliis triangulari-sagittatis, integerrimis.  
Linn. Sp. Pl. p. 218.

Chenopodium folio triangulo. Tourn. Inst. p. 506.

M

Lapa-

*Lapathum unctuosum*. C. B. P. p. 115.

*Bonus Henricus*, Bauh. in Matth. p. 449.

*Tota bona*. Dod. Pempt. p. 651. Cram. El. Veg. Austr. p. 62. nr. 62.

*Stolzer Heinrich*. *Guter Heinrich*. Loef. Fl. Bor. p. 136. In pagis passim.

798.

*Chenopodium foliis cordato-triangularibus, obtusiusculis, dentatis, racemis erectis, compositis, subnudis, caule brevioribus*. Linn. Sp. Pl. p. 218.

*Atriplex sylvestris latifolia*. C. B. P. p. 119.

*Chenopodium*. *Pas anserinus*. Tab. I. Cram. El. Veg. Austr. p. 62.

*Gänsefuß*. Sautodt. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 12. nr. 63. Am Mühlendamm in Gerbauen.

799.

*Chenopodium foliis cordatis, angulato-acuminatis, racemis ramosis, nudis*. Linn. Sp. Pl. p. 219.

*Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio*. C. B. P. p. 23.

*Breitblättriger Püßer, Gänsefuß*. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 23.

Ben Königsberg.

800.

*Chenopodium foliis rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis, subnudis*. Linn. Sp. Pl. p. 219.

*Chenopodium sylvestre opuli folio*. Vaill. Bot. Par. Tab. 7. Fig. 1.

*Chenopodium folio sinuato, candicante*. Tourn. Inst. p. 506.

*Atriplex sylvestris, folio sinuato, candicante*. C. B. P. p. 119.

*Wilde Scheißmilde mit weißlichten Blättern*. Loef. Fl. Bor. p. 22.

Ben Königsberg passim.

801.

*Chenopodium foliis integerrimis rhombo-ovatis, floribus conglomeratis*. Linn. Sp. Pl. p. 220.

*Atriplex foetida*. C. B. P. p. 119.

Cheno-

*Chenopodium foetidum*. Tourn. Inst. p. 506.

Schamkraut. Stinkende Nure. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 12.  
nr. 64.

Vulvularia. Tab. I. p. Connina Caes. Syst. p. 161. Cram.  
El. Veg. Austr. p. 64.

Circa vias in arenosis im Oberlande.

802.

*Chenopodium foliis integerrimis, ovatis, caule decumbente,*  
*cymis dichotomis.* Linn. Sp. Pl. p. 220.

*Blitum polyspermon.* C. B. Pin. p. 118. Cram. El. Veg.  
Austr. p. 24.

Wilder Meyer. Loef. Fl. Bor. p. 28.

In fimetis et pingrioribus locis.

803.

*Chenopodium filiformibus, acutiusculis, caule erecto.* Linn.  
Spec. Pl. p. 221.

*Chenopodium altissimum, flosculis succulentis.* Buxb. Cen.  
I. p. 21. Tab. 31. Fig. 1.

*Kali gramineo folio.* C. B. P. p. 289.

*Kali folio gramineo, semine pastinacae.* Meerstachel: Kraut  
mit Pasternack: Saamen. Loef. Fl. Bor. p. 132.

In locis arenosis bey Villau und Sackau passim.

SALSOA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 232. Goëan. H. R. M. p. 126.*

804.

*Salsola herbacea, foliis subulatis, mucronatis, calycibus oua-*  
*tis, axillaribus.* Linn. Sp. Pl. p. 222.

*Kali spinoso affinis.* C. B. P. p. 133.

*Tragum.* Bauh. in Matth. p. 731. Cram. El. Veg. Austr.  
p. 65.

Meerstachel: Kraut. Scorpion: Kraut. Loef. Flor. Boruss.  
p. 123.

Bey German und Villau in littore maris passim.

## PLANTAGO.

*Linn. Gen. Pl. nr. 106. Gouan. H. R. M. p. 69.*

805.

*Plantago foliis ovatis, glabris, nudo scapo tereti, spica flosculis imbricatis. Linn. Sp. Pl. p. 112.*

*Plantago latifolia sinuata. C. B. P. p. 189. Tourn. I. p. 126.*

*Grosser Wegerich. Loef. Fl. Bor. p. 197.*

806.

*Plantago foliis lanceolatis, spica sub-ouata nuda, scapo angulato. Linn. Sp. Pl. p. 113.*

*Plantago angustifolia major. C. B. P. p. 189. Tourn. Inst. p. 127.*

*Plantago quinquenervia siue lanceolata. Lob. Adv. p. 128.*

*Spitziger Wegerich. Loef. Fl. Bor. p. 198.*

*In pratis editoribus bey Lautenmühl.*

807.

*Plantago angustifolia minor. C. B. P. p. 189.*

*Kleiner spitziger Wegerich. Loef. Fl. Bor. p. 198.*

*In sabuletis hinter dem Kneiphöfischen Walle.*

808.

*Plantago latifolia glabra minor. C. B. P. p. 189.*

*Kleiner breiter Wegerich. Loef. Fl. Bor. p. 198.*

809.

*Plantago foliis ovato-lanceolatis, spica cylindriaca, scapo tereti. Linn. Sp. Pl. p. 113.*

*Plantago latifolia incana. C. B. P. p. 189.*

*Plantago major. Matth. deutsch. p. 169.*

*Breiter Wegerich. Loef. Fl. Bor. p. 198.*

*Bey Lautenmühl secus viam.*

810.

*Plantago latifolia, rosea, quasi in spica dispositis. C. B. P. p. 189.*

*Tourn. Inst. p. 119. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 53, nr. 320.*

811.

*Plantago latifolia, spica multiplici sparsa. C. B. P. p. 189.*

*Wegerich.*

## OLERACEAE.

181

Wegerich mit Rosenformiger Blüth. Helw. Suppl. Fl. Bor.

p. 54. nr. 321.

Auf den Wiesen auf dem Angerburgschen Canal.

## HERNIARIA.

*Linn. Gen. Plant. nr. 228. Göttan H. R. M. p. 121.*

812.

*Herniaria glabra.* Linn. Sp. Pl. p. 218.

*Polygonum minus, seu Millegrana major.* C. B. P. p. 281.

*Polygonum minus.* Matth. deutsch. p. 677.

Haarn: Kraut. Jungfer: Graß. Loef. Fl. Bor. p. 202.

In petrosis hinter dem Kneiphöfischen Walle.

## AMARANTHVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 861. Göttan. H. R. M. p. 486.*

813.

*Amaranthus floribus glomeratis, lateralibus, foliis, ovato-retusis, caule diffuso.* Linn. Sp. Pl. p. 990.

*Amaranthus sylvestris vulgaris.* Tourn. Inst. p. 248.

*Blitum rubrum minus.* C. B. P. p. 118.

Kleiner liegender rother Mäyer. Loef. Fl. Bor. p. 28.

In fimetis.

814.

*Amaranthus maximus semine rubello.* Tourn. Inst. p. 235.

Perlgruß. Rothe Hirsen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 3. nr. 12.

In hortis rusticis seritur, im Angerburgschen und Löbischen.

## STATICE.

*Linn. Gen. Pl. nr. 305. Göttan H. R. M. p. 157.*

815.

*Statice caule nudo, simplici, capitato.* Linn. Sp. Pl. p. 274.

*Caryophyllus montanus minor.* C. B. P. p. 40.

Klein Meergras. Meernägelein. Loef. Fl. Bor. p. 40.

Auf der Curischen Mäherung zwischen Lattenwald und Kun-  
ken im Gebirge.

M 3

TETRA-





## TETRAPETALAE.

## MYAGRUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 642. Gouan. H. R. M. p. 311.*

816.

**M**Myagrurn ficulis ouatis, pedunculatis, polyspermis.

*Linn. Spec. Pl. p. 641.*

Myagrurn fatium. C. B. P. p. 109.

Myagrurn, I. Tab. I. 2. p. 540.

Lein: oder Flach: Dotter. Loef. Fl. Bor. p. 174.

Inter linum in agris.

817.

Myagrurn filiculis globosis, compressis, punctato-rugosis.

*Linn. Spec. Pl. p. 641.*

Myagro similis, filiqua rotunda. C. B. P. p. 109.

Myagrurn monospermum hirsutum, filiquis rotundis. Loef.

Fl. Bor. p. 174.

Hinter dem Kneiphöfischen Walle am Stadt: Graben.

## DRABA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 653. Gouan. H. R. M. p. 313.*

818.

Draba caulibus nudis, foliis incisis. *Linn. Sp. Pl. p. 642.*

Bursa pastoris minor, loculo oblongo. C. B. P. p. 31.

Klein Tschelkraut mit länglichten Schöttlein. Loef. F. p. 31.

In locis arenosis.

## THLASPI.

*Linn. Gen. Pl. nr. 648. Gouan. H. R. M. p. 316.*

819.

Thlaspi ficulis orbiculatis, foliis oblongis, dentatis, glabris.

*Linn. Sp. Pl. p. 648.*

Thlaspi aruense, filiquis latis. C. B. P. p. 105.

Thlaspi latius. Dod. Pempt. p. 712.

Bauren: Senf. Loef. Fl. Bor. p. 268.

Inter segetes passim.

820.

820.

*Thlaspi filiculis cordatis, foliis radicalibus, pinnatifidis.*

Linn. Spec. Pl. p. 647.

*Bursa pastoris major, folio sinuato. C. B. P. p. 108.*

Groß Teschel-Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 36.

In locis arenosis bey Königsberg passim.

## LUNARIA.

Linn. Gen. Pl. nr. 652. Gouan. H. R. M. p. 323.

821.

*Lunaria filiculis oblongis. Linn. Sp. Pl. p. 653.*

*Lunaria Graeca nostras. Loef. Fl. Bor. p. 145.*

Sinter Lattenwalde im Gebürge.

## COCHLEARIA.

Linn. Gen. Pl. nr. 646. Gouan. H. R. M. p. 317.

822.

*Cochlearia foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis  
subsinuatis. Linn. Spec. Pl. p. 647.*

*Cochlearia folio subrotundo. C. B. P. p. 110.*

*Cochlearia. Dod. Pempt. p. 594.*

Löffel-Kresse. Helw. Fl. Quasim. p. 29.

Vulgaris est in hortis Rusticis.

823.

*Cochlearia foliis radicalibus, lanceolatis, crenatis, caulinis  
incisis. Linn. Spec. Pl. p. 648.*

*Raphanus rusticanus. C. B. P. p. 96.*

*Raphanus sylvestris. Fuchf. H. p. 660.*

Meer-Kettig. Loef. Fl. Bor. p. 225.

In prato bey'm Mühlensfuß zu Schwanis.

## ALYSSUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 651. Gouan. H. R. M. p. 320.

824.

*Alyssum caule erecto, foliis lanceolatis, incanis, integerri-  
mis, floribus corymbosis. Linn. Spec. Pl. p. 651.*

M 4

Thla-

*Thalasspi fruticosum, incanum.* C. B. P. p. 108. Loef. Fl. Bor. p. 268.

In der Höllengrund.

## LEPIDIVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 645. Gouan. H. R. M. p. 314.*

825.

*Lepidium floribus diandris, tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis, serratis: superioribus linearibus integerrimis.*

*Linn. Spec. Plant, p. 465.*

*Iberis nasturtii folio.* C. B. P. p. 97.

Groß Besenfraut und wilde Kresse. Loef. Fl. Bor. p. 130.

Via, qua itur nach der Neuenbrück in fimetis copiose.

## DENTARIA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 659. Gouan. H. R. M. p. 323.*

826.

*Dentaria foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus.*

*Linn. Spec. Pl. p. 653.*

*Dentaria heptaphyllos baccifera.* C. B. P. p. 244.

*Dentaria baccifera.* Clus. H. l. p.

*Dentaria IV. Tab. l. 1. p. 309.*

Schuppenwurz. Loef. Fl. Bor. p. 61.

In fruticetis ac locis umbrosis bey Sarcrau.

## CARDAMINE.

*Linn. Gen. Pl. nr. 660. Gouan. H. R. M. p. 324.*

827.

*Cardamine foliis pinnatis, floribus tetrandris.* Linn. Spec.

*Plant. p. 655.*

*Nasturtium aquaticum minus.* C. B. P. p. 104.

*Nasturtium aquaticum.* Dod. Pempt. p. 592.

In uliginosis.

828.

*Cardamine foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis: caulinis lanceolatis.* Linn. Spec. Pl. p. 656.

*Nasturtium pratense magno flore.* C. B. P. p. 104.

Wiesen:

Wiesen: Kress mit großer Blüt.  
In riguis passim bey Königsberg.

## SISYMBRIUM.

*Linn. Gen. Plant. nr. 666. Gouan. H. R. M. p. 325.*

829.

*Sisymbrium filiquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis subcordatis.* Linn. Spec. Pl. p. 657.

*Nasturtium aquaticum supinum.* C. B. P. p. 104.

*Sisymbria Cardamine.* Fuchf. H. p. 723.

Brunnen: Kress. Loef. Fl. Bor. p. 179.

In locis udis passim bey Königsberg.

830.

*Sisymbrium foliis dentatis, filiquis erectis.* Linn. Spec. Pl. p. 659.

*Erysimum latifolium glabrum.* C. B. P. p. 101.

Helw. Fl. Quasim. p. 32.

831.

*Sisymbrium filiquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis subcordatis.* Linn. Spec. Pl. p. 657.

*Eruca palustris minor, luteo paruoque flore.* C. B. P. p. 98.

*Eruca sylvestris.* Fuchf. H. p. 263.

Wilder weisser Senf. Loef. Fl. Bor. p. 68.

In locis uliginosis passim.

832.

*Sisymbrium filiquis declinatis, ouatis, foliis pinnatifidis serratis.* Linn. Sp. Pl. p. 657.

*Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diuisis.* C. B. P. p. 97.

*Radicula sylvestris.* Dod. Pempt. p. 677.

Wilde Rettig. Loef. Fl. Bor. p. 227.

In lacunis bey der Neuenbrück.

833.

*Sisymbrium foliis simplicibus, dentatis, serratis.* Linn. Spec. Pl. p. 657.

*Raphanus aquaticus alter.* C. B. P. p. 97.

M 5

Rapif-

*Rapistrum aquaticum.* Tab. I. 2. p. 110.

Wasser: Hederich. Loef. Fl. Bor. p. 227.

Im Dankiger Werder.

834.

*Sisymbrium foliis lyrato-ferratis, scabris radicalibus, caule subnudo, ramoso.* Linn. Spec. Pl. p. 658.

*Eruca coerulea in arenosis proueniens.* C. B. P. p. 99.

*Eruca sylvestris major, foliis subasperis in orbem sparsis.* Loef. Fl. Bor. p. 68.

In der Wange an den Seebergen copiose.

835.

*Sisymbrium* feu

*Eruca sylvestris minor, foliis subasperis in orbem sparsis.* Loef. Fl. Bor. p. 68.

Bei Runken in montosis.

836.

*Sisymbrium petalis calice minoribus, foliis decomposito-pinnatis.* Linn. Spec. Pl. p. 659.

*Nasturtium sylvestre tenuissime diuisum.* C. B. P. p. 176. Sophia. Dod. Pempt. p. 133.

Sophien-Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 176.

In incultis passim.

837.

*Sisymbrium foliis pinnato-hastatis, siliquis longissimis, nutantibus, remotis.* Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 361.

*Erysimum angustifolium majus.* C. B. P. p. 107. Tourn. Inst. p. 228.

*Erysimum hirsutum siliquis erucac.* Loef. Fl. Bor. p. 69.

Haarichter Weg: Gensf.

Zu Dankig-am Walle.

## ERYSIMVM.

Linn. Gen. Plant. nr. 664. Gouan H. R. M. p. 327.

838.

*Erysimum siliquis spicae appressis.* Linn. Sp. Pl. p. 660.

*Erysimum vulgare.* C. B. P. p. 100. Tourn. Inst. p. 228.

Verbe-

Verbena mas. Fuchf. H. p. 592.

Eisen: Kraut: Männlein. Loef. Fl. Bor. p. 69.

839.

Erysimum foliis lyratis, extimo subrotundo. Linn. p. 660.

Eruca lutea, latifolia seu Barbarea. C. B. P. p. 98.

Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo. Tourn. Inst.

p. 226.

Kapungel. Winter: Kref. Loef. Fl. Bor. p. 67.

Prope pratorum fossas.

840.

Erysimum foliis cordatis. Linn. Spec. Plant. p. 660.

Alliaria. C. B. P. p. 110. Fuchf. H. p. 104.

Knoblauchs: Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 8.

Im Domnauschen Walde.

841.

Erysimum foliis integris lanceolatis. Linn. Sp. Pl. p. 661.

Myagrum filiqua longa. C. B. P. p. 109.

Leindotter mit langen Schoten. Loef. Fl. Bor. p. 174.

Passim bey Königsberg.

## CHEIRANTHVS.

Linn. Gen. Pl. p. 66. Gouan H. R. M. p. 328.

842.

Cheiranthus foliis lanceolatis, acutis, glabris. Linn. Sp. Pl. p. 661.

Leucosum luteum vulgare, vulgo Cheiri. C. B. P. p. 202.

Geele oder Römische einfache Viole. Helw. Suppl. Flor.

Bor. p. 41. nr. 235.

In hortis rusticorum sponte crescit.

## HESPERIS.

Linn. Gen. Plant. nr. 67. Gouan. H. R. M. p. 329.

843.

Hesperis caule simplici, erecto, foliis ovato-lanceolatis, denticulatis, petalis mucrone emarginatis. Linn. Sp. Plant.

p. 663.

Hespe

*Hesperis hortenſis*. C. B. P. p. 202.

*Hesperis hortenſis*, flore purpureo ſimplici, ſeu *Viola hycmalis purpurea*. Tourn. Inſt. p. 222.

*Viola matronalis* ſeu *Damaſcena*. Lob. Adv. p.

**Braune Winter-Violen.** Helw. Suppl. Fl. Boruff. p. 32.  
nro. 190.

844.

*Hesperis hortenſis*, flore albo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 32.  
nr. 191.

## ARABIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 663. Gouan H. R. M. p. 330.*

845.

*Arabis foliis petiolatis, lanceolatis, integerrimis*. Linn. Sp. Pl. p. 665.

*Burſae Paſtoris ſimilis, ſiliqua major.* Thal. Harc. p. 84.  
Tab. 7. Fig. D.

**Taſchen-Kraut mit länglichten Schöttlein.** Helw. Fl. Quaſim. p. 27.

In Incultis.

## TURRITIS.

*Linn. Gen. Pl. nro. 665. Gouan. H. R. M. p. 331.*

846.

*Turritis foliis radicalibus dentatis, hispidis, caulinis integerrimis, amplexicaulibus glabris*. Linn. Sp. Pl. p. 666.

*Brasſica ſylueſtris, foliis circa radicem cichoraceis*. C. B. P. p. 112. Loef. Fl. Bor. p. 29.

Ad viarum margines ſaepe.

## - BRASSICA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 601. Gouan. H. R. M. p. 232.*

847.

*Brasſica radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus, cordatis, ſeſſilibus*. Linn. Sp. Pl. p. 666.

*Brasſica campeſtris perfoliata, flore luteo*. Loef. Fl. Boruff. p. 29.

Gelber

Gelber Durchwachs mit Streckrüben Blätter. Ib.  
Inter segetes passim.

## SINAPIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 662. Gouan. H. R. M. p. 333.*

848.

*Sinapis filiquis multangulis, toroso-turgidis, rostro longioribus.* Linn. Sp. Pl. p. 668.

*Rapistrum flore luteo.* C. B. P. p. 95.

*Rapistrum.* Dod. Pempt p. 675.

*Lampsana flore melino.* Tab. l. 2. p. 120.

*Hederich.* Rüdig. Loef. Fl. Bor. p. 228.

In arvis passim.

849.

*Sinapis seu*

*Raphanistrum segetum flore luteo vel pallido.* Tourn. Inst. p. 230.

*Geeler Hederich.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 59. nr. 253.

Inter segetis.

## RAPHANUS.

*Linn. Gen. Plant. nr. 688. Gouan H. R. M. p. 334.*


850.

*Raphanus filiquis teretibus, torosis, bilocularibus.* Linn. Sp. Plant. p. 669.

*Raphanus major orbicularis, siue rotundus.* C. B. P. p. 96.

*Runder großer Kettig.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 59. nr. 354.

Tam in hortis quam in agris seritur.



## R H E A D E S.

## CHELIDONIUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 486. Gouan. H. R. M. p. 251.*

851.

**C**helidonium pedunculis umbellatis. Linn. Sp. Pl. p. 505.  
Chelido-



*Chelidonium majus vulgare.* C. B. P. p. 144. Tourn. Inst. p. 231.

*Chelidonium majus.* Fusch. H. p. 865. Tab. l. 1. p. 122.  
*Groß Schwalbēn-Kraut.* Schelwurk. Loef. Fl. Bor. p. 45.  
*Bei Königsberg passim.*

## PAP A V E R.

*Linn. Gen. Pl. nr. 496. Gouan H. R. M. p. 251.*

852.

*Papauer capsulis glabris, globosis, caule piloso, multifloro, foliis pinnatifidis, incis. Linn. Sp. Pl. p. 507.*

*Papauer erraticum majus: ροιας Dioscoridis.* C. B. Pin. p. 171. Tourn. Inst. p. 238.

*Wilder Moh'n.* Loef. Fl. Bor. p. 188.

*Inter segetes passim, in arenosis.*

853.

*Papauer erraticum minus.* C. B. P. p. 171.

*Kleiner wilder Moh'n.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 53. nr. 315.

## A C T A E A.

*Linn. Gen. Pl. nr. 499. Gouan. H. R. M. p. 251.*

854.

*Actaea racemo ouato, fructibus baccatis.* Linn. Spec. Pl. p. 504.

*Aconitum racemosum.* C. B. P. p. 183.

*Christophoriana.* Dod. Pempt. p. 402. Tab. l. 2. p. 458.

*St. Christophels-Kraut.* Loef. Fl. Bor. p. 4.

*Bei der Neuhausischen Mühle am Berge. It. Beim Postnartschen Walde.*

## N Y M P H A E A.

*Linn. Gen. Pl. nr. 493 Gouan, H. R. M. p. 253.*

855.

*Nymphaea calyce magno, pentaphyllo.* Linn. Sp. Pl. p. 510.

*Nymphaea lutea major.* C. B. P. p. 193. Tourn. Inst. p. 261.

Geete

Geele See-Kannen. Geele Numlen. Loef. Fl. Bor. p. 177.  
In aquis stagnantibus.

856.

Nymphaea foliis cordatis, integerrimis, calyce quadrifido.

Linn. Spec. Pl. p. 510.

Nymphaea alba major. C. B. P. p. 178. Tourn. Inst. p. 260.

Weisse See-Kannen oder Numlen. Loef. Fl. Bor. p. 178.  
In fossis et piscinis passim.

## SENTICOSAE.

## BERBERIS.

Linn. Gen. Pl. nr. 331. Gouan. H. R. M. p. 184.

857.

Berberis pedunculis racemosis. Linn. Sp. Plant. p. 330.

Berberis dumetorum. C. B. P. p. 454. Tourn. Inst. p. 64.

Berberissen.

Ad sepes hortorum passim.

## MELANIDEAE.

## VIOLA.

Linn. Gen. Pl. nro, 821. Gouan H. R. M. p. 466.

858.

Viola acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. Linn.  
Spec. Plant. p. 934.

Viola martia purpurea flore simplici odore. C. B. P. p. 285.

Viola purpurea. Matth. deutsch. p. 199.

Blaue oder braune Werg; Viole. Loef. Fl. Bor. p. 285.

In der Hollengrund.

859.

Viola martia odora flore simplici cinereo seu aquate coerulesco.

Wisch.

**A**schgraue, wohlriechende Merz:Violen. Helw. Suppl.  
Fl. Bor. p. 66. nr. 405.

**I**m Angerburgschen Widdem: Garten.

860.

**V**iola martia sylvestris odorata, cauliculis erectis. Wohl:  
riechende, aufrechtstehende Wald:Violen. Helw. Suppl.  
Fl. Bor. p. 66. nr. 406.

**I**m Königlichen Walde bey Angerburg.

861.

**V**iola martia inodora, sylvestris. C. B. P. p. 199.

**V**iola canina. Tab. l. 2. p. 18. Lonic. deutsch. p. 214.

**H**unds:Violen. Loef. Fl. Bor. p. 285.

**I**n der Hollengrund.

862.

**V**iola martia alba odore nullo. C. B. P. p. 199.

**V**iola candida. Dod. Pempt. p. 156.

**W**eisse Hunds:Violen. Wulff. Spec. Inaug. p. 19.

Crescit inter fruticeta, locis aridis.

863.

**V**iola caule triquetro, diffuso, foliis oblongis, incisfis, stipu-  
lis dentatis, foliis quato-oblongis, crenatis. Linn. Spec.  
Pl. p. 953.

**V**iola tricolor, hortenſis repens. C. B. P. p. 190.

**H**erba Trinitatis. Fuchf. H. p. 803.

**I**acea ſive flos Trinitatis. Bauh. in Matth. p. 832.

**D**renſaltigkeit:Blum. Loef. Fl. Bor. p. 286.

**I**n pratis et agris paſſim.

## R E S E D A.

Linn. Gen. Pl. nr. 534. Goſſan. H. R. M. p. 229.

864.

**R**efeda foliis lanceolatis, integris, calycibus quadrifidis.  
Linn. Spec. Plant. p. 488.

**L**uteola herba, ſalicis folio. C. B. P. p. 100. Tourn. Inſt.  
p. 423.

**P**ſeudofruthium. Bauh. in Matth. p. 442.

**W**eiden:

Weidenblättriges Streich-Kraut. Acker-Pfriemen. Loef.  
Fl. Bor. p. 147.

Am Altstädtschen Walle nach dem Baum zu.

865.

*Reseda foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis.* Linn.  
Spec. Pl. p. 449.

*Reseda vulgaris.* C. B. P. p. 100.

Spanischer Rauchen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 59. nr. 358.

Ad Vistulam et Rodanum fluuios prouenit.

\*\*\*\*\*

## RANUNCULACEAE.

### THALICTRUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 552. Gowan. H. R. M. p. 263.*

**T**halictrum caule folioso, sulcato, panicula multiplici erecta. Linn. Spec. Plant. p. 546.

*Thalictrum majus, siliqua angulosa aut striata.* C. B. Pin. p. 336.

*Ruta pratensis Herbariorum.* Lob. Adv. p. 391.

*Thalictrum magnum.* Dod. Pempt. p. 58.

Senfblat. Loef. Fl. Bor. p. 267.

In monte Appollinis hinter Quednau.

867.

*Thalictrum foliis lanceolato-linearibus, integerrimis.* Linn.  
Spec. Plant. p. 546.

*Thalictrum pratense angustissimo folio.* C. B. P. p. 337.

Loef. Fl. Bor. p. 268.

In pratis beyh Ponartschen Walde.

868.

*Thalictrum pratense angustifolium.* C. B. P. p. 337.

*Ruta pratensis major.* IV. Tab. I. 1. p. 146.

Große Wiesen-Raute. Loef. Fl. Bor. p. 268.

N

869.

869.

*Thalictrum fructibus pendulis, triangularibus, rectis caule tereti.* Linn. Spec. Plant. p. 547.

*Thalictrum Alpinum, aquilegiae foliis, florum staminibus purpurascens.* Tourn. Inst. p. 270. C. B. P. p. 337.

Große Wiesenraute mit purpurfarbenen Blumen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 36. nr. 386.

In der Heide bey Ogoncken und Weiffen, bey Johannisburg. 870.

*Thalictrum Alpinum majus Aquilegiae foliis, florum staminibus albis, caule viridi.* Tourn. Inst. p. 271.

*Thalictrum montanum altius.* C. B. P. p. 337. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 61. nr. 271.

Ben Weiffen.

871.

*Thalictrum Alpinum minus Aquilegiae foliis, florum staminibus albis, caule viridi.* Tourn. Inst. p. 271.

*Thalictrum montanum album.* C. B. P. p. 337. Claf. H. p. 234.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 64. nr. 388.

Im Weiffen.

## ANEMONE.

Linn. Gen. Pl. nr. 50. Gouan. H. R. M. p. 261.

872.

*Anemone foliis trilobis, integerrimis.* Linn. Sp. Pl. p. 138.

*Ranunculus tridentatus, vernus, flore simplici coerulesco.* Tourn. Inst. p. 286.

*Trifolium epaticum flore simplici.* C. B. P. p. 330.

*Hepatica.* Brunf. lat. Tom. I. p. 190.

Edelleber Blumen. Loef. Fl. Bor. p. 275.

In umbrosis montibus passim.

873.

*Anemone siue*

*Ranunculus tridentatus, vernus flore simplici, subpurpureo.*

Tourn. Inst. p. 287.

Röblich

**Königliche Edelleberblumen.** Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 57.  
nr. 340.

874.

*Anemone* seu

*Ranunculus tridentatus*, flore coeruleo pleno, Tourn. Inst.  
p. 287.

**Edelleber-Kraut mit voller Blüt.** Helw. Suppl. Fl. Bor.  
p. 57. nr. 342.

**In dem Königlichen Angerburgschen Walde.**

875.

*Anemone* seu

*Ranunculus tridentatus vernus*, flore simplici rubro. C. B. P.  
p. 330.

**Im Stadtwalde zu Angerburg.**

876.

*Anemone* seu

*Ranunculus tridentatus vernus*, flore pleno purpureo,  
Tourn. Inst. p. 287. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 57. nr.  
340.

**In sylvis.**

877.

*Anemone pedunculo involocrato, foliis digitatis, multifidis.*  
Linn. Spec. Pl. p. 538.

*Pulsatilla folio anemones secundae siue subrotundo.* C. B.  
P. p. 94.

*Pulsatilla polyanthos, violacea anemones folio.* Breyn. Cent.  
p. 132.

**Küchen-Schell.** Loef. Fl. Bor. p. 269. Helw. Fl. Camp.  
p. 49.

**Bei Lautenmühl in collibus arenosis.**

878.

*Anemone pedunculo involocrato, foliis pinnatis, flore ere-*  
*cto.* Linn. Spec. Pl. p. 538.

*Pulsatilla Apii folio, vernalis, flore majore.* C. B. P. p. 177.

**Loef. Flor. Boruss.** p. 269. Helw. Flor. Camp. p. 63.  
Tab. X.

N 2

879.

879.

*Anemone* siue*Pulsatilla* Apii folio, vernalis, flore minore. C. B. P. p. 177.

Helw. Fl. Camp. p. 64. Tab. X.

880.

*Anemone* pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. Linn. Spec. Pl. p. 539.*Pulsatilla* folio crassiore et maiore flore. C. B. P. p. 177.

Helw. Fl. Camp. p. 62. Tab. VIII.

881.

*Anemone* pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. Linn. Spec. Pl. p. 539.*Pulsatilla* flore minore nigricante. C. B. P. p. 177. Helw.

Fl. Camp. p. 66. Tab. XII.

882.

*Anemone* seu*Pulsatilla* vulgaris, saturatiore flore. Clus. H. l. 1. p. 246.*Pulsatilla* flore clauso, obsoleto, petalis reflexis. Helw. Fl. Camp. p. 65. Tab. II.

883.

*Anemone* pedunculo nudo, feminibus subrotundis, hirsutis. Linn. Spec. Pl. p. 540.*Anemone* sylvestris, alba, major. C. B. P. p. 315.

Weiße Anemonen: Rößlein. Helw. Fl. Quasim. p. 24.

Auf dem hohen Schloßberge Grodzisko bey Eckersberg.

884.

*Anemone* sylvestris, flore incarnato, striato. Helw. Fl. Q. p. 24.

885.

*Anemone* feminibus acutis, foliolis incis, caule unifloro. Linn. Spec. Pl. p. 541.*Anemone* nemorosa, flore maiore. C. B. P. p. 176.*Ranunculus* nemorosus albus. Tab. l. 1. p. 132.

Weiße Aprilen: Blumen. Weiße Viole. Loef. Fl. Bor. p. 219.

In sylvis et dumetis passim.

886.

886.

Anemone seu Ranunculus phragmites flore albo pleno.  
Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 57. nr. 339.

887.

Anemone seu

Ranunculus nemorosus flore carneo. Tab. l. 2. p. 247.

Anemone nemorosa. C. B. P. p. 176. Wulff. Spec. Inaug.  
p. 18.

In montosis circa prata bey Löwenhagen crescit.

888.

Anemone feminibus acutis, foliis incisiss, petalis subrotundis, caule sub-bifloro. Linn. Spec. Pl. p. 241.

Ranunculus nemorosus luteus. C. B. P. p. 178. Tab. l. 1.  
p. 132.

Gelbe Wald-Viole. Loeß. Fl. Bor. p. 219.

Bey Lautenmühl in fruticetis.

## ADOXA.

Linn. Gen. Pl. p. 397. Gouan H. R. M. p. 200.

889.

Adoxa. Linn. Spec. Pl. p. 367.

Ranunculus nemorosus, Muscatellina dictus. C. B. P. p. 178.

Biesem-Kraut. Loeß. Fl. Bor. p. 220.

In der Hollengrund.

## CALTHA.

Linn. Gen. Plant. no. 807. Gouan. H. R. M. p. 268.

890.

Caltha. Linn. Sp. Pl. p. 558.

Caltha palustris, flore simplici. C. B. P. p. 276.

Populago flore majore. Tourn. Inst. p. 273.

Rußblumen. Loeß. Fl. Bor. p. 31.

In pratis udis.

891.

Caltha, siue Populago duplici petalorum serie. Helw. Suppl.  
Fl. Bor. p. 55. nr. 326.

N 3

Anter



Hinter der Ogonschen Heide auf den Wiesen an der Knüppel-  
Brücke.

## MYOSURUS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 311. Gouan. H. R. M. p. 161.*

892.

*Myosurus. Linn. Sp. Pl. p. 285.*

*Holosteó affinis, Cauda muris. C. B. P. p. 190.*

*Ranunculus gramineo folio, flore caudato, seminibus in ca-  
pitulum spicatum congestis. Tourn. Inst. p. 293.*

Mäuß-Gras. Mäuß-Zägelein. *Loef. Fl. Bor. p. 127.*

Am Kneiphöfischen Walle passim.

## RANUNCULUS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 554. Gouan. H. R. M. p. 264.*

893.

*Ranunculus foliis lanceolatis, caule erecto. Linn. Spec. Pl.  
p. 549.*

*Ranunculus longifolius major. C. B. P. p. 180. Tourn.  
Inst. p. 292.*

Großer Speer-Hahnen-Fuß. *Loef. Fl. Bor. p. 223.*

In der Hollengrund.

894.

*Ranunculus longifolius palustris minor. C. B. P. p. 180.*

Flammula, *Ranunculus. Dod. Pempt. p. 432.*

Langer Wasser-Hahnen-Fuß. *Wulff. Spec. Inaug. p. 18.*

In locis udis sylvestribus bey Löwenhagen.

895.

*Ranunculus foliis cordatis, angulatis, petiolatis. Linn. Spec.  
Plant. p. 550.*

*Chelidonia rotundifolia minor. C. B. P. p. 187.*

Klein Scheel-Kraut, Gesselblumen. *Loef. Fl. Bor. p. 46.*

In der Hollengrund.

896.

*Ranunculus foliis radicalibus, subrotundo-cordatis, crena-  
tis: caulinis digitatis, dentatis, caule multifloro. Linn.*

*Spec. Pl. p. 551.*

Ranun-

*Ranunculus rotundifolius*, vernus, sylvaticus major, vel  
Cassubicus, folio Thorae calthae. Breyn. Prodr. 1. p. 45.

*Ranunculus aconitifolius* folio subrotundo, ad radicem praefolante. Loef. Fl. Bor. p. 225.

Hahnenfuß mit Wolfswurzhastigen Blättern, da ein rundes  
Blat an der Wurzel sitzt. Loef. Fl. Bor. p. 226.

Bei Lautenmühle.

897.

*Ranunculus foliis inferioribus palmatis, summis digitatis*  
fructibus oblongis. Linn. Sp. Pl. p. 551.

*Ranunculus palustris* Apii folio laevis. C. B. P. p. 180.

Frosch-Pfeffer. Feigblätter Eppich. Loef. Fl. Bor. p. 222.  
In locis uliginosis passim.

898.

*Ranunculus palustris* Apii folio lanuginosus. C. B. P. p. 180.

Rauher Eppichblättriger Hahnenfuß. Loef. Fl. Bor. p. 223.  
In incultis et arenosis.

899.

*Ranunculus palustris ferratus*. C. B. P. p. 180.

Langer Wasser-Hahnen-Fuß. Loef. Fl. Bor. p. 224.

In humidis et riguis passim.

900.

*Ranunculus calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule*  
erecto, foliis compositis. Linn. Sp. Pl. p. 554.

*Ranunculus pratensis*, radice verticilli modo rotunda. C. B.  
P. p. 197.

Crus Galli. Brunf. lat. Tom. I. p. 145.

Brenn-Kraut. Hahnen-Fuß. Loef. Fl. Bor. p. 221.

Nach der Lauten-Mühle zu.

901.

*Ranunculus pratensis*, radice verticilli modo rotunda, flore  
majore, foliis variis. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 57. nro.

344.

Im Stadt-Walde.

902.

*Ranunculus pratensis*, radice verticilli modo rotunda,  
N 4 foliis

foliis maculatis. Helw. Suppl. Flor. Boruss. p. 57.  
 nro. 345.

Auf dem Angerburgschen Kirchhofe.

903.

*Ranunculus idem obortivus*, seu caule compresso, monstro-  
 so, multifloro. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 58. nr. 346.  
 In agris et pratis editioribus.

904.

*Ranunculus calycibus patulis*, pedunculis sulcatis, stolonibus  
 repentibus, foliis compositis. Linn. Sp. Pl. p. 554.

*Ranunculus pratensis repens*, hirsutus. C. B. P. p. 170.

*Ranunculus dulcis*. VI. Tab. l. 1. p. 113.

Kriechender Wiesen; Hahnenfuß. Loef. Fl. Bor. p. 221.  
 In aruis passim.

905.

*Ranunculus calycibus patulis*, pedunculis teretibus, foliis  
 tripartito-multifidis: summis linearibus. Linn. Spec. Pl.  
 p. 554.

*Ranunculus pratensis erectus acris*. C. B. P. p. 178.

*Ranunculus hortensis*. Dod. Pempt. p. 426.

Acker; Hahnenfuß. Loef. Fl. Bor. p. 220.

In pratis passim.

906.

*Ranunculus feminibus aculeatis*, foliis superioribus, decom-  
 positis linearibus. Linn. Sp. Pl. p. 555.

*Ranunculus aruensis echinatus*. C. B. P. p. 179.

Acker; Hahnenfuß mit stachelichten Köpfen. Loef. Fl. Bor.  
 p. 222.

Am Weichsel; Thamme.

907.

*Ranunculus foliis submersis*, capillaceis, emeris, peltatis  
 Linn. Sp. Pl. p. 556.

*Ranunculus aquaticus*, folio rotundo et capillaceo. C. B. P.  
 p. 180.

Fluß; Hähnelein. Leber; Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 223.

In lacunis auf der Altstädtschen Klapper; Wiese.

908.

908.

*Ranunculus foliis capillaceis*, circumscriptione vaga, breu-  
oribus. Linn. Sp. Pl. p. 556.

*Ranunculus capillaceus aquaticus*. C. B. P. p. 180.

*Millefolium aquaticum foliis Abrotani*, ranunculi flore et  
capitulo. Tourn. Inst. p. 291.

Queiß, Flachß, Waßer, Genschel. Helw. Suppl. Fl. Boruss.  
p. 58. nr. 350.

In der Ungerrap passim.

909.

*Ranunculus montanus*, subhirsutus, *Geranii folio*. C. B. P.  
p. 182.

*Ranunculus nemorosus hirsutus foliis Caryophyllatae*. Loef.  
Fl. Bor. p. 120.

Im Ponartschen Walde und in der Hollengrund,

# TROLLIUS.

*Linn. Gen. Plant. nr.*

910.

*Trollius petalis conniventibus*, nectariis longitudine stami-  
num. Linn. Sp. Pl. p. 556.

*Ranunculus montanus*, *aconiti folio*, flore globofo. C. B. P.  
p. 182.

*Helleborus niger*, ranunculi folio, flore globofo, majore.  
Tourn. Inst. p. 272.

*Ranunculus flore globofo*. Dod. Pempt. p. 430.

Trollblum. Alphanensfuß. Loef. Fl. Bor. p. 225.

Ad pratorum margines beim Ponartschen Walde.

# NIGELLA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 542. Gouan. H. R. M. p. 260.*

911.

*Nigella petalis subtricuspidatis*, foliis subpilosis. Linn. Sp.  
Pl. p. 534.

*Nigella angustifolia*, flore majore, simplici, coeruleo. C. B.  
P. p. 145. Tourn. Inst. p. 258.

N 5

Melan-

*Melanthium sativum*. Tab. 1. p.

*Melanthium*. Dod. Pempt. p. 303.

Narden: Saamen. Schwarzer Coriander. Helw. Suppl.

Fl. Bor. p. 50. nr. 299.

In pagis ubique colitur.

### ISOPYRUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 333. Gouan H. R. M. p. 267.*

912.

*Isopyrum stipulis ovatis, petalis obtusis*. Linn. Spec. Plant. p. 557.

*Ranunculus nemorosus Thalictri folio*. C. B. P. p. 178.

*Ranunculus praecox* II. *Thalictri folio*. Clus. Hist. 1. 1. p. 233.

*Thalictrum montanum praecox*. Tourn. Inst. p. 271. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 64. nr. 389.

Im Fürstenaushen Walde.

### DELPHINIUM.

*Linn. Gen. Plant. nr. 535. Gouan H. R. M. p. 287.*

913.

*Delphinium nectariis monophyllis, caule subdiuiso*. Linn. Sp. Pl. p. 530.

*Consolida regalis aruensis*. C. B. P. p. 142. Tourn. Inst. p. 426.

Rittersporn. Loef. Fl. Bor. p. 51.

Behm Dümpel: Krug inter segetes copiose.

914.

*Delphinium nectariis diphyllis, labellis bifidis, apice barbatis, foliis incisis, caule erecto*. Linn. Sp. Pl. p. 531.

*Aconitum coeruleum hirsutum, flore consolidae regalis*. C. B. P. p. 131.

Groß Wolfsmurz. Berg: Rittersporn. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 18. nr. 95.

In der Damerau.

ACONT-

ACONITUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 136. Gouan. H. R. M. p. 259.*

915.

*Aconitum foliis palmatis, multifidis, villosis.* Linn. Sp. Pl. p. 532.

*Aconitum lycoctenum luteum.* C. B. P. p. 183. Tourn. Inst. p. 424.

Gelbe Wolfsmurz. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 1. nr. 1.  
In monte Terklo bey Eßersberg im Reinschen.

916.

*Aconitum foliorum laciniis, linearibus, superne latioribus, lineâ exaratis.* Linn. Sp. Pl. p. 532.

*Aconitum coeruleum seu Napellus.* C. B. P. p. 183. Tourn. Inst. p. 425.

Eisenhart. Eisenhüttlein. Narren: Kap. Loef. Fl. Boruss. p. 5.

Bey der Hoppenbruchschen Mühle.

AQUILEGIA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 541. Gouan. H. R. M. p. 260.*

917.

*Aquilegia nectariis incurvis.* Linn. Sp. Pl. p. 533.

*Aquilegia sylvestris.* C. B. P. p. 144. Tourn. Inst. p. 428.

Wilde Aegelen. Loef. Fl. Bor. p. 18.

In der Osterrodischen Heide hinter dem Schilling.

STRATIOTES.

*Linn. Gen. Pl. nr. 543.*

918.

*Stratiotes foliis ensi-triangularis, ciliato-aculeatis.* Linn. Sp. Pl. p. 535.

*Aloe palustris.* C. B. P. p. 286.

Wasser: Sichel. Loef. Fl. Bor. p. 11.

In den Grabens nach der Neuenbleich.

HELIO.



# HELIOSCOPIAE.

## CISTVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 519. Göttan. H. R. M. p. 254.*

- C**istus suffruticosus, procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis, reuolutis, subpilosis. Linn. Sp. Pl. nr. 528.  
 Chamae-cistus vulgaris, flore luteo. C. B. P. p. 465.  
 Hyssopus campestris. Seb. in Trag. p. 177.  
 Helianthemum vulgare, flore luteo. Tourn. Inst. p. 248.  
 Heiden; Ysop. Loef. Fl. Bor. p. 43.  
 In locis incultis beyh Donartschen Walde.

## HYPERICVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 736. Göttan. H. R. M. p. 401.*

920.  
 Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis, pellucido-punctatis. Linn. Sp. Pl. p. 765.  
 Hypericum vulgare. C. B. P. p. 279.  
 St. Johannis; Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 128.  
 In sabulosis passim.

921.  
 Hypericum floribus trigynis; calycibus ferrato-glandulosis, foliis cordatis, glabris. Linn. Sp. Pl. p. 786.  
 Hypericum minus erectum. C. B. P. p. 279. Tourn. Inst. p. 255.  
 Hypericum pulchrum, vel IV. Seb. in Trag. p. 29. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 35, nr. 209.  
 In montosis.

922.  
 Hypericum Ascyrum dictum, caule quadrangulo pallide luteo. Hartheu mit blaßgelben Blumen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 35, nr. 208.  
 In umbrosis im Angerburgschen Walde.

CARYO-



## CARYOPHYLLEAE.

## ARENARIA.

*Linn. Gen. Plant. nr. 446. Gouan, H. R. M. p. 218.*

**A**renaria foliis ovatis, acutis, carnosiss. Linn. Spec. Pl.  
p. 423.

Alfene litteralis, foliis Portulacae. C. B. P. p. 251.

Alfene marina foliis Portulacae. Loef. Fl. Bor. p. 12.

In der Garrau.

924.

Arenaria foliis subovatis, acutis, sessilibus, corollis calyce  
breuioribus. Linn. Sp. Pl. p. 423.

Alfene minor. Fuchf. H. p. 23.

Alfene minor multicaulis. C. B. P. p. 251. Loef. Fl. Bor.  
p. 12.

925.

Arenaria foliis filiformibus, stipulis membranaceis, vaginan-  
tibus. Linn. Sp. Pl. p. 423.

Alfene spargulae facie, siue Spargula minor, subcoeruleo  
flore. C. B. B. p. 25.

Polygonum foliis gramineis, Spargulae capitibus. Loef. Fl.  
Bor. p. 203.

Hinter Juditten-Kirch, am Wege nach Sellaicken zu.

926.

Arenaria siue

Alfene montana latifolia, flore laciniato, siue Alfene heder-  
cea. C. B. Pin. p. 251. Tourn. Inst. p. 242. Helw.  
Suppl. Fl. Bor. p. 2. nr. 8.

In alnetis in der Damerau.

927.

Arenaria siue

Alfene palustris tenuissimis foliis, siue Saxifraga palustris al-  
fene folia. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 2. nr. 9.

928.



928.

Arenaria seu

Alfane major. C. B. P. p. 251.

Wasser; Vogel; Kraut. Wulff. Spec. Inaug. p. 8.

Iuxta fluvium in sylva bey Löwenhagen crescit.

## CERASTIUM.

Linn. Gen. Pl. nro.

Göian. H. R. M. p. 223.

929.

Cerastium foliis lineari-lanceolatis, obtusis, glabris, corollis calyce majoribus. Linn. Sp. Pl. p. 435.

Caryophyllus aruensis hirsutus, flore majore. C. B. Pin. p. 210.

Holoosteum Caryophyllaceum. Tab. I. 1. p. 525.

Roths Acker; Nägelein mit großer Blüt. Loef. Fl. Bor. p. 39.

Myosotis aruensis hirsuta, flore majore. Vaill. Bot. Par. Tab. XXX. Fig. 4.

Am Kneiphöffschen Walle passim.

930.

Cerastium siue

Caryophyllus aruensis hirsutus flore minore. Loef. Fl. Bor. p. 39.

Holoostium caryophyllaceum aruense. Tab. I. 1. p. 525.

Rauhes weiß Nägelein; Gras mit kleiner Blüt.

In arenosis inter Ottenhagen und Barth.

931.

Cerastium foliis cordatis, sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. Linn. Sp. Pl. p. 439.

Alfane major. C. B. P. p. 250.

Groß Hünerdarm. Loef. Fl. Bor. p. 12.

Bey Königsberg passim.

932.

Cerastium siue

Alfane minor repens. Loef. Fl. Bor. p. 12.

Hinter Lattenwalde nach Runzen zu.

933.

933.

*Cerastium* siue*Caryophyllus aruensis umbellatus*. C. B. P. p. 210.*Alfne verna glabra*, floribus umbellatis albis. Tourn. Inst.  
p. 242.Weiß Acker; Nägelein; Graß. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 3.  
nr. 11.

In Langheim.

## CENTUNCULUS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 108.*

934.

*Centunculus*. Linn. Sp. Pl. p. 116.*Anagallis paludosa minima*. Vaill. Bot. Par. Tab. 4. Fig. 2.*Anagallis palustris minima*, flosculis albis. Menz. Pug. Tab.  
VI. Fig. 5.*Alfne pusilla graminea*, flore tetrapetalo. Helw. Suppl. Fl.  
Bor. p. 2. nr. 10.

In muscosis.

## STELLARIA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 10. Gouan H. R. M. p. 197.*

935.

*Stellaria foliis lanceolatis*, serrulatis, petalis bifidis. Linn.  
Spec. Pl. p. 422.*Caryophyllus aruensis*, glaber, flore majore. C. B. P. p. 210.  
Gramen. Fuchf. H. p. 210.Unrauhe Acker; Nägelein mit großer Blüt. Augentrost; Graß.  
Loef. Fl. Bor. p. 38.

In fyluis passim.

## GYPSOPHYLLA.

*Linn. Gen. Pl. nr. Gouan, H. R. M. p. 211.*

936.

*Gypsophylla foliis lanceolato linearibus*, obsolete triquetris,  
laeuibus, obtusis, secundis. Linn. Sp. Pl. p. 407.*Caryophyllus saxatilis*, floribus gramineis, umbellatis corym-  
bis. C. B. P. p. 211.

Poly-

*Polygonum majus erectum angustifolium, floribus candidis,*  
 Menz. Pug. rar. Tab. II. Fig. 2.  
*Helw. Fl. Quasim. p. 40.*  
*Von Eckersberg.*

937.

*Gypsophylla foliis linearibus planis, caule dichotomo, petalis crenatis.* Linn. Sp. Pl. p. 408.

*Caryophyllus minimus muralis.* C. B. P. p. 211.

*Kleine Maur: oder Weg: Nägelein.* Loef. Fl. Bor. p. 36.

*In sylvis prope vias saepiuscule obseruatur.*

## DIANTHVS.

*Linn. Gen. Pl. no. 430. Gouan. H. R. M. p. 213.*

938.

*Dianthus floribus subaggregatis, squamis calycinis ouatis, aristatis, tubum subaequantibus, foliis linearibus.* Linn. Sp. Pl. p. 409.

*Caryophyllus aruensis caliculo florum numerofo.* Loef. Fl. Bor. p. 39.

*Caryophyllus syluestris latifolius.* C. B. P. p. 209.

*Von Holland in aruis copiose.*

939.

*Dianthus floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis lanceolatis, villosis, tubum aequantibus.* Linn. Spec. Pl. p. 410.

*Caryophyllus barbatus syluestris.* C. B. P. p. 209.

*Thier: Nägelein.* Loef. Fl. Bor. p. 39.

*Von der Balga am Haffe.*

940.

*Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis, lanceolatis, binis, corollis crenatis.* Linn. Sp. Pl. p. 411.

*Caryophyllus syluestris vulgaris, angustifolius.* C. B. Pin. p. 209.

*Heidnägelein.* Loef. Fl. Bor. p. 49.

*In der Brandenburgschen Heide copiose.*

941.

941.

Dianthus feu

Caryophyllus tenuissime dissecto flore, et carneo. C. B. P.  
p. 210.

Acker; Nägelein. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 11. nr. 58.

942.

Dianthus feu

Caryophyllus flore laciniato, albo inodoro. C. B. Pin.  
p. 210.

Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 11. nr. 54.

Hinter Königsberg.

943.

Dianthus feu

Caryophyllus media corolla purpureo, violacea cincta.  
Lob. Adv.Hochmuth oder Muthwillen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 11.  
nr. 55.

Hinter Königsberg.

944.

Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis, subovatis, bre-  
uissimis, corollis multifidis, fauce pubescentibus. Linn.  
Sp. Pl. p. 411.

Caryophyllus tenuissime dissecto. C. B. P. p. 209.

Weiße Pflaum; Nägelein. Loef. Fl. Bor. p. 39.

In der Brandenburgschen Heide.

## SAPONARIA.

Linn. Gen. Pl. nr. 431. Gouan. H. R. M. p. 212.

945.

Saponaria calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis.  
Linn. Sp. Pl. p. 408.

Saponaria major laevis. C. B. P. p. 206.

Lychnis sylvestris, quae Saponaria vulgo. Tourn. Inst.  
p. 336.

Seifen; Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 244.

In coemiterio pagi Neuhausen.

②

CVCVRA

## CUCUBALVS.

*Linn. Gen. Plant. nr. 443. Gouan. H. R. M. p. 215.*

946.

*Cucubalus calycibus subglobosis, glabris, reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. Linn. Sp. Pl. p. 414.*

*Lychnis sylvestris, quae Been album vulgo. C. B. Pin. p. 148.*

*Gließ-Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 148.*  
In sabulosis passim.

947.

*Cucubalus floribus dioicis, petalis setaceis, indivisis. Linn. Spec. Plant. p. 415.*

*Lychnis viscosa flore muscoso. C. B. P. p. 206.*

*Öhr-Löfflein-Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 149.*  
In der Brandenburgschen Heide.

## SILENE.

*Linn. Gen. Pl. p. 444. Gouan H. R. M. p. 216.*

948.

*Silene petalis bifidis, floribus lateralibus secundis, cernuis caule recurvato. Linn. Sp. Pl. p. 417.*

*Lychnis montana viscosa, alba, latifolia. C. B. P. p. 205.*

*Lychnis sylvestris viscosa foliis Otitidis. Loef. Fl. Boruss. p. 150.*

Zu Quednau am Berge.

## AGROSTEMMA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 440. Gouan. H. R. M. p. 222.*

949.

*Agrostemma hirsuta, calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis. Linn. Sp. Pl. p. 435.*

*Lychnis segetum major. C. B. P. p. 204.*

*Raden. Loef. Fl. Bor. p. 148.*

Inter segetes,

LYCHNIS.

## LYCHNIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 451. Göttan; H. R. M. p. 227.*

950.

*Lychnis petalis quadrifidis, fructu subrotundo. Linn. Spec. Pl. p. 436.*

*Caryophyllus pratensis, flore laciniato simplici, siue flos Cucull.* C. B. P. p. 210.

*Ruckuck: Blum. Loef. Fl. Bor. p. 41.*

*In pratis passim bey Königsberg.*

951.

*Lychnis pratensis flore laciniato, simplici suave-rubente. Tourn. Inst. p. 33.*

*Ruckucks: Blum mit blasrother Blum. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 46. nr. 266.*

*In pratis.*

952.

*Lychnis petalis integris. Linn. Sp. Pl. p. 436.*

*Lychnis sylvestris viscosa, rubra angustifolia. C. B. P. p. 205.*

*Klebrichte Purpurrothe Marien-Röflein mit schmalen Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 149.*

*In monte Apollinis bey Quednau.*

953.

*Lychnis sylvestris viscosa, angustifolia, flore pallide incarnato. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 45. nr. 260.*

*In Weiffen bey Johannisburg.*

954.

*Lychnis viscosa floribus foris purpurascens, intus albis.*

*Tourn. Inst. p. 330. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 45. nr. 261.*

*Hinter dem Ungerrap: Stroh gleich über Stulichen.*

955.

*Lychnis sylvestris viscosa alba, angustifolia major. Helw.*

*Suppl. Fl. Bor. p. 45. nr. 262.*

956.

*Lychnis sylvestris flore herbaceo, foliis laevibus. Helw.*

*Suppl. Fl. Bor. p. 45. nr. 263.*

*Im Weiffen bey Johannisburg.*

O 2

957.

957.

*Lychnis sylvestris*, latifolia, calyculis turgidis, striatis. C. B. P. p. 205.

Margen-Rößlein. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 46. nr. 265. Inter segetes.

958.

*Lychnis nocti flora*. C. B. P. p. 205. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 45. nr. 260.

In Ogonken in hortis rusticis.

959.

*Lychnis floribus dioicis*. Linn. Sp. Pl. p. 437.

*Lychnis sylvestris aquatica*, purpurea simplex. C. B. Pin. p. 204. Tourn. Inst. p. 335.

*Lychnis sylvestris*, floribus purpureo-rubentibus. Dod. P. p. 171.

Roht Margen-Rößlein. Loef. Fl. Bor. p. 148.

Iuxta pratorum, et fluuiorum margines.

960.

*Lychnis sylvestris alba simplex*. C. B. P. p. 100.

*Lychnis sylvestris alba*. Cam. Hort. p. 39.

Weiß Wiederstoß. Marien-Rößlein. Loef. Flor. Boruss. p. 147.

Inter segetes passim.

## SPERGULA.

Linn. Gen. Pl. nr. 448. Gowan, H. R. M. p. 224.

961.

*Spergula foliis verticillatis*, floribus decandris. Linn. Spec. Pl. p. 440.

Alfine, *Spergula dicta*, m. C. B. P. p. 251. Tourn. Inst. p. 243.

Wasser-Persen. Loef. Fl. Boruss. 13.

Inter segetes.

962.

*Spergula seu*

*Alfine minor lini capitulis*. C. B. P. p. 251.

Klein

Klein Stein; Vogel; Kraut. Wulff, Spec. Inaug. p. 9.  
Passim nascitur, praeprimis in montibus aridis et arenoso  
solo.

963.

Spergula foliis oppositis, subulatis, laeuibus, caulibus simplicibus. Linn. Sp. Pl. p. 440.

Alfine nodosa Germanica. C. B. P. p. 251.

Polygonum, foliis gramineis alterum. Loef. Flor. Boruss.  
p. 204.

Am Bollwerk bey'm Zollhaus.

LINUM.

Linn. Gen. Pl. no. 306. Gouan. H. R. M. p. 158.

964.

Linum calycibus, capsulisque mucronatis, petalis crenatis,  
foliis lanceolatis, alternis, caule subsolitario. Linn. Sp.  
Plant. p. 277.

Linum satium. C. B. P. p. 214.

Gladsch vel potius Lein. Helw. Fl. Quasim. p. 36.  
Seritur in agris.

965.

Linum foliis oppositis, ouato-lanceolatis; caule dichotomo,  
corollis acutis. Linn. Sp. Pl. p. 287.

Linum pratense flosculis exiguis. C. B. P. p. 214.

Spergula bifolia linj capitulis. Loef. Fl. Bor. p. 261.

Ben Lautenmühle inter fruticera.

966.

Linum foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris,  
tetragynis. Linn. Sp. Pl. p. 281.

Chamaelinum vulgare. Vaill. Bor. Par. Tab. IV. Fig. 6.

Polygonum minimum, seu Millegrana minima. C. B. P.  
p. 262.

Das allerkleinste Tausend; Korn. Loef. Fl. Bor. p. 202.

Im Dorf Sarkau.





## S V C C V L E N T A E

## SAXIFRAGA.

*Linn. Gen. Plant. nro. 434. Gouan. H. R. M. p. 209.*

**S**axifraga foliis caulinis linearibus, alternis ciliatis, radicalibus aggregatis. Linn. Sp. Pl. p. 402.

Saxifraga angustifolia, autumnalis, flore luteo, peltato. Breyn. Cent. 1. p. 104. Helw. Fl. Quasim. p. 45.

Bei Angerburg im rothen Bruch.

968.

Saxifraga foliis caulinis, reniformibus, lobatis, caule ramoso, radice granulata. Linn. Sp. Pl. p. 403.

Saxifraga rotundifolia alba, C. B. P. p. 245.

Rundblättriger weißer Steinbrech. Loef. Flor. Boruss. p. 245.

Auf dem Nassengarten in montosis.

969.

Saxifraga foliis caulinis, cuneiformibus, trifidis, alternis, caule erecto, ramoso. Linn. Sp. Pl. p. 404.

Sedum tridactylites tectorum. C. B. P. p. 285.

Paronychia altera. Dod. Pempt. p. 113.

Saxifraga annua verna humilior. Tourn. Inst. p. 252.

Roht Stein: Nägel: Kraut. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 60. nr. 363.

Bei Wilschchen Höhen, locis aridis.

## CHRYSO SPLENIUM

*Linn. Gen. Pl. nro. 387. Gouan. H. R. M. p. 209.*

970.

Chrysosplenium foliis oppositis. Linn. Sp. Pl. p. 309.

Gulden Steinbrech. Loef. Fl. Bor. p. 246.

In locis uliginosis.

GEVM.

## GEVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 434. Gouan, H. R. M. p. 249.*

971.

*Geum floribus erectis, fructu globoso, aristis uncinnatis, nudis, foliis lyratis.* Linn. Sp. Pl. p. 501.

*Caryophyllata vulgaris.* C. B. P. p. 321.

*Caryophyllata.* Dod. Pempt. p. 137.

*Benedictwurzel.* Loef. Fl. Bor. p. 36.

972.

*Geum floribus nutantibus, fructu oblongo, aristis plumosis.* Linn. Sp. Pl. p. 501.

*Caryophyllata aquatica nutante flore.* C. B. P. p. 321.

*Wasser-Benedictwurzel.* Loef. Fl. Bor. p. 37.

*In locis uliginosis passim.*

973.

*Geum siue*

*Caryophyllata aquatica altera.* C. B. P. p. 322.

*Caryophyllata prolifera, flosculis elegantissimis.* Loef. Fl. Bor. p. 37.

*In Schacken. Zu Birkenfeld.*

974.

*Geum seu*

*Caryophyllata aquatica altera flore multiplici.* C. B. P. p. 322.

*Wasser-Benedictwurzel mit voller Blüt.* Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 10. nr. 49.

*In alnetis im Schloßgarten zu Angerburg.*

975.

*Geum seu*

*Caryophyllata aquatica flore nutante, toto luteo.* Helw.

Suppl. Fl. Bor. p. 10. nr. 50.

*Bei Lawken im Reinschen.*

976.

*Geum seu*

*Caryophyllata foliis hederæ terrestris Breynii.* Helw. Suppl.

Fl. Bor. p. 10. nr. 51.

*In alnetis im Schloß-Rossgarten.*

O 4

977.

977.

Geum feu

Caryophyllata majore flore. C. B. P. p.

Benedictwurz. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 10. nr. 52.

Zu Stulichen im Gießbachgarten.

## RIBES.

Linn. Gen. Plant. nr. 202. Gouan, H. R. M. p. 114.

978.

Ribes feu

Grossularia sylvestris rubra. C. B. P. p. 455.

Wilde Corinthen. Loef. Fl. Bor. p. 122.

Hinter Lattenwalde in montosis passim.

979.

Ribes inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. Linn. Sp. Pl. p. 200.

Grossularia multipliciacino, siue non spinosa, hortensis, rubrae. C. B. P. p. 455.

Ribes Officinarum. Johannisbeeren. Loef. Flor. Boruss. p. 121.

980.

Ribes inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. Linn. Sp. Pl. p. 201.

Grossularia non spinosa, fructu nigro. C. B. P. p. 455.

Ribes vulgaris, nigro fructu. Clus. St. I. 1. p. 120.

Schwarze Johannisbeeren. Bocksbeeren. Loef. Fl. Bor. p. 121.

In der Hollengrund.

981.

Ribes racemis aculeatis, baccis glabris, petioli bractea monophylla. Linn. Sp. Pl. p. 201.

Grossularia simpliciacino, vel spinosa sylvestris. C. B. P. p. 455.

Uua crispa. Stachel; Kloster; oder Kristobren; Beeren. Helw. Fl. Quasim. p. 34.

SEDVM.

## S E D U M.

*Linn. Gen. Pl. nr. 455. Gouan, H. R. M. p. 220.*

982.

*Sedum foliis planiusculis, ferratis, corymbo folioso, caule erecto.* Linn. Sp. Pl. p. 430.

*Telephium vulgare.* C. B. P. p. 287.

*Bruchwurzel. Wolfsbohnen.* Loef. Fl. Bor. p. 266.

*In der Hollengrund.*

*Anacampteros minor, rotundiore folio semper virens.*

Tourn. Inst. p. 263.

983.

*Sedum foliis subovatis, adnato sessilibus, gibbis, erectiusculis, alternis, cyma trifida.* Linn. Sp. Pl. p. 432.

*Semperuium minus, vermiculatum, acre.* C. B. P. p. 251.

*Illecebra seu Semperuium.* 3. Dod. Pempt. p. 129.

*Bladløß.* Loef. Fl. Bor. p. 251.

*In arenosis passim.*

984.

*Sedum seu*

*Semperuium minus, vermiculatum, acre cauliculis repentibus.* Loef. Fl. Bor. p. 252.

*Vinter Sarkau am See: Gebirge.*

## S E M P E R V I U M.

*Linn. Gen. Plant. nr. 465. Gouan H. R. M. p. 235.*

985.

*Semperuium foliis ciliatis, propaginibus patentibus.* Linn. Spec. Plant. p. 464.

*Sedum majus vulgare.* C. B. P. p. 251.

*Große Hauswurzel.* Loef. Fl. Bor. p. 251.

*In muris antiquis et tectis.*

## P A R N A S S I A.

*Linn. Gen. Pl. nr. 302. Gouan H. R. M. p. 156.*

986.

*Parnassia.* Linn. Spec. Plant. p. 273.

O 5

Gramen

Gramen Parnassi albo simplici flore. C. B. P. p. 309.

Hepatica alba. Cordi. Hist. p. 108.

In riguis et humidis pratis.

## GRVINALES.

### OxALIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 43. Gouan. H. R. M. p. 222.*

**O**xalis scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamoso-articulata. Linn. Sp. Pl. p. 433.

Oxys flore albo. Tourn. Inst. p. 88.

Trifolium acetosum vulgare. C. B. P. p. 330.

Saafen; Klee. Loef. Fl. Bor. p. 274. Acetosella Offic.

Bei Lautenmühle.

### GERANIVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 673. Gouan. H. R. M. p. 338.*

988.

Geranium pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis, incis, obtusis. Linn. Sp. Pl. p. 680.

Geranium Cicutae folio minus et supinum. C. B. P. p. 319.

Storch; oder Kranich; Schnabel. Loef. Fl. Bor. p. 104.

In locis arenosis passim.

989.

Geranium Cicutae folio moschatum et inodorum. C. B. P. p. 319.

Storch; Schnabel mit Schirlings-Blätter. Loef. Fl. Bor. p. 104.

Bei Lautenmühle passim.

990.

Geranium pedunculis bifloris, foliis peltatis, inciso-ferratis, summis subfessilibus. Linn. Sp. Pl. p. 691.

Gera-

*Geranium batrachoides* folio *Aconiti*. C. B. P. p. 317.

Blaue Storchen-Schnabel mit Eisenhuts Blättern. Loef.  
Fl. Bor. p. 102.

Ad margines pratorum bey der Koppelbude.

991.

*Geranium Batrachoides* folio *Aconiti*, flore ex coeruleo albicante. Loef. Fl. Bor. p. 102.

In Birkenfeld ad fossas. Bey Holland am Mühlen-Fluß.

992.

*Geranium pedunculis bifloris*, calycibus pilosis, decem-angularis. Linn. Sp. Pl. p. 681.

*Geranium Robertianum* primum. C. B. P. p. 319.

Ruprechts-Kraut. Klein Schmalben-Kraut. Loef. Fl. Bor.  
p. 105.

Bey Königsberg passim.

993.

*Geranium pedunculis bifloris*, petalis integris, longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus, incis. Linn. Sp. Pl. p. 683.

*Geranium folio Malvae* rotundo. C. B. P. p. 318.

*Geranium columbinum* majus, flore coeruleo minore. Vaill.  
Bot. Par. Tab. XV. Fig. 1.

Blaue Storchen-Schnabel mit Eisenhuts Blättern. Loef.  
Fl. Bor. p. 102.

Ad margines pratorum bey der Koppelbude.

994.

*Geranium columbinum* erectum, minus, tenuius laciniatum, flore minore, pediculis longis insidente. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 27. nr. 149.

Locis gramineis auf dem Angerburgschen Kirchhof.

995.

*Geranium columbinum*, erectum, majus, tenuius laciniatum, flore paruo, flosculis cauliculis adhaerentibus. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 27. nr. 150.

996.

*Geranium maximum*, foliis dissectis. Tourn. Inst. p. 268.  
Gera-

*Geranium columbinum majus*, foliis imis longis usque ad pediculum divisiss. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 27. nr. 151.

An der Inster im Gesträuch hinter Insterburg.

997.

*Geranium columbinum maximum*, foliis dissectis, flore albo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 27. nr. 152.

Ibidem.

998.

*Geranium columbinum erectum tenuius laciniatum*, flore magno. Tief zerschnittener Taubensfuß mit großer Blüt.

Loef. Fl. Bor. p. 103.

Hinter Quednau auf dem Berge copiosissime.

999.

*Geranium columbinum procumbens*, tenuis, laciniatum, flore paruo. Tief zerschnittener Taubensfuß mit kleiner Blüt. Loef. Fl. Bor. p. 104.

*Geranium columbinum tenuius laciniatum*. C. B. P. p. 318.

1000.

*Geranium pedunculis unifloris*, foliis quinquepartitis, trifidis, orbiculatis. Linn. Sp. Pl. p. 683.

*Geranium sanguineum*, maximo flore. C. B. P. p. 317.

Berg-Schnabel-Kraut. Blut-Röselein. Helw. Fl. Q. p. 34.

*Geranium* IV. *Haematodes*. Clus. H. l. 2. p. 202.

In pinetis, caeduis montosis.



## TILIAEAE.

### TILIA.

Linn. Gen. Pl. nr. 108. Gouan. H. R. M. p. 254.

1001.

**T**ilia floribus, nectario destitutis. Linn. Sp. Pl. p. 514.

*Tilia foemina* folio majore. C. B. P. p. 268.

Linde. Loef. Fl. Bor. p. 268.

In sylvis copiose.

BICOR-



## B I C O R N E S.

## V A C C I N I U M.

*Linn. Gen. Pl. nr. 508. Gouan. H. R. M. p. 194.*

**V**accinium pedunculis unifloris foliis ferratis, ouatis, deciduis, caule angulato. Linn. Sp. Pl. p. 349.  
 Vitis idaea foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. C. B. P. p. 470.

Vaccinia nigra. Dod. Pempt. p. 768.

Blaubeeren. Loef. Fl. Bor. p. 289.

In ericetis et muscosis passim.

1003.

Vaccinium pedunculis unifloris, foliis integerrimis, ovalibus, basi ciliatis. Linn. Sp. Pl. p. 350.

Vitis idaea foliis subrotundis, exalbidis. C. B. P. p. 470.

Vaccinia rubra. Dod. Pempt. p. 770.

Roths Heidelbeer. Loef. Fl. Bor. p. 289.

Ben Schwanis im Gebrüch. Ben Lautenmühl.

1004.

Vaccinium racemis, terminalibus, nutantibus, foliis obouatis, reuolutis, integerrimis, subtrus punctatis. Linn. Spec. Pl. p. 351.

Vitis idaea foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris. C. B. P. p. 470. Kram. El. Veg. Anstr. p. 198. nr. 3.

Vitis idaea foliis oblongis, non crenatis, baccis rubris. Loef. Fl. Bor. p. 289.

Vaccinium foliis Buxi, semper virens, baccis rubris. Hall. Rupp. Fl. Ien. p. 52.

In der Sarrau. In Sylva. Ben Domnau.

1005.

Vaccinium foliis integerrimis, reuolutis, ouatis, caulibus repentibus, filiformibus nudis. Linn. Sp. Pl. p. 351.

Vitis idaea palustris. C. B. P. p. 471.

Moss.



Mosß: Beeren. Loef. Fl. Bor. p. 289.  
In muscolis et uliginosis.

## ERICA.

Linn. Gen. Pl. nr. 378. Gouan. H. R. M. p. 194.

1006.

*Erica antheris bicornibus inclusis, corollis inaequalibus, campanulatis, mediocribus, foliis oppositis, sagittatis.* Linn. Spec. Pl. p. 352.

*Erica vulgaris glabra.* C. B. P. p. 485.

Heide. Loef. Fl. Bor. p. 67.

In locis arenosis passim.

1007.

*Erica baccifera, tenuifolia, baccis nigris.* Loef. Fl. Bor. p. 67.

Arden: Beeren. Loef.

Auf der Eursichen Nöherung hinter Kunzen copiose.

## PYROLA.

Linn. Gen. Pl. nr. 425. Gouan. H. R. M. p. 208.

1008.

*Pyrola staminibus ascendentibus, pistillo declinato.* Linn. Spec. Pl. p. 396.

*Pyrola rotundifolia major.* C. B. P. p. 191.

Groß rundblättriges Wintergrün. Loef. Fl. Bor. p. 269.

In opacis et muscolis, bey Schwanis und Neuhausen.

1009.

*Pyrola racemò unilateralì.* Linn. Sp. Pl. p. 396.

*Pyrola folio mucronato ferrato.* C. B. P. p. 191.

Wintergrün mit gespißten und zerkerbten Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 210.

In der Fischhäusschen Heide.

1010.

*Pyrola pedunculis subumbellatis.* Linn. Sp. Pl. p. 396.

*Pyrola frutescens, Arbuti folio.* C. B. P. p. 101.

Staudigtes Wintergrün, mit zerkerbten länglichtigen Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 211.

1011.

1011.

*Pyrola scapo unifloro.* Linn. Sp. Pl. p. 397.

*Pyrola rotundifolia minor.* C. B. P. p. 191.

Klein rundblättriges Wintergrün. Loef. Fl. Bor. p. 210.

Inter ericeta bey Kunzen und Bladau.

## HEDERA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 290. Gouan. H. R. M. p. 115.*

1012.

*Hedera foliis ovatis, et lobatis.* Linn. Sp. Pl. p. 202.

*Hedera major sterilis.* C. B. P. p. 305.

*Hedera helix.* Matth. deutsch. p. 245.

Baum: Epheu. Loef. Fl. Bor. p. 122.

In sylvis passim.

## LEDUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 428.*

1013.

*Ledum.* Linn. Sp. Pl. p. 391.

*Cistus Ledon foliis Roris marini ferrugineis.* C. B. P. p. 391.

Dorsch. Silber Rosmarin. Loef. Fl. Bor. p. 49.

In ericetis uliginosis bey Suditten.

1014.

*Ledum seu*

*Cistus Ledon foliis falcis angustifoliis.* C. B. P. p. 468.

Rosmarinum sylvestre *ἀόσμος*. Clus. H. l. p.

*Vitis idaea Roris marini folio, averſa parte albido ac nervoso.*

Loef. Fl. Bor. p. 280.

In der Sarkau. Bey Schwanis im Gebrüch.

## ACER.

*Linn. Gen. Pl. nr. 370. Gouan. H. R. M. p. 318.*

1015.

*Acer foliis quinquelobis, acuminatis, acute dentatis, glabris,*

*floribus corymbosis.* Linn. Sp. Pl. p. 1055.

*Acer major.* Cam. Ep. p. 63.

Leins

Lein, Baum. Uhorn. Loef. Fl. Bor. p. 3.  
In sylvis passim.

## CHAMELEAE.

### DAPHNE.

*Linn. Gen. Pl. nr. 379. Gouan. H. R. M. p. 196.*

- D** 1016.  
*Daphne floribus sessilibus, ternis, caulinis foliis lanceolatis, deciduis. Linn. Sp. Pl. p. 356.*  
*Laureola folio deciduo, flore purpureo. Officinis Laureola foemina. C. B. P. p. 462.*  
*Daphnoides, Cam. Ep. p. 462.*  
*Kellershalß. Seidelbast. Wolfsbast. Loef. Fl. Bor. p. 138.*  
 In umbrosis zu Neuhausen am Thiergarten.

## VAGINALES.

### RUMEX.

*Linn. Gen. Pl. nr. 357. Gouan. H. R. M. p. 186.*

- R** 1017.  
*Rumex floribus hermaphroditis: valvulis integris, graniferis, foliis lanceolatis, undulatis, acutis. Linn. Spec. Pl. p. 335.*  
*Lapathum folio acuto, crispo. C. B. P. p. 115.*  
 Grindwurz mit spizigen, krausen Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 135.  
 Passim bey Königsberg.

1018.

- Rumex floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis, nudis, foliis cordatis. Linn. Sp. Pl. p. 336.*  
*Lapathum aquaticum, folio cubitali. C. B. P. p. 116.*

Wasser:

Wasser: Grindwurz mit langen Blättern. Loef. Fl. Bor.  
p. 135.

In aquosis et uliginosis bey Königsberg.

1019.

Rumex siue

Lapathum aquaticum minus. C. B. P. p. 116.

Klein Wasser: Grindwurz. Loef. Fl. Bor. p. 135.

Auf der Altstädtischen Klapperwiese nach dem Baum zu.

1020.

Rumex seu

Lapathum folio subrotundo. C. B. P. p. 115.

Grindwurz mit hohen, rundlichten Blättern. Loef. Fl. Bor.

p. 135.

Passim in incultis.

1021.

Rumex floribus androgynis: foliis oblongis sagittatis. Linn.

Spec. Pl. p. 337.

Acetosa pratensis. C. B. P. p. 14.

Oxalis. Matth. deutsch. p. 151.

Gemein Saurampf. Loef. Fl. Bor. p. 34.

Passim in pratis editioribus.

1022.

Rumex floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. Linn. Sp.

Plant. p. 338.

Acetosa aruensis lanceolata. C. B. P. p. 114.

Oxalis ouina. Tab. L. 2. p. 150.

Schaaf: Saurampf. Loef. Fl. Bor. p. 4.

Am Tragheimschen Walle.

## POLYGONVM.

Linn. Gen. Pl. nr. 391. Gouan. H. R. M. p. 197.

1023.

Polygonum caule simplicissimo, monostachyo, foliis ovatis,  
in petiolum decurrentibus. Linn. Sp. Pl. p. 360.

Bistorta major, radice minus intorta. C. B. P. p. 192. Tourn.

Inst. p. 511.

P

Große

Große Schlangen: oder Natter: Wurz. Loef. Fl. Bor. p. 27.  
In pratis passim.

1024.

*Polygonum floribus hexandris, semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis.* Linn. Sp. Pl. p. 361.

*Perficaria urens, siue Hydropiper.* C. B. P. p. 101.

Hydropiper. Dod. Pempt. p. 607.

Flöh: Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 191.

In locis palustribus.

1025.

*Polygonum foliis hexandris, digynis, spicis ouatis, oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis.* Linn. Sp. Pl. p. 361.

*Perficaria mitis maculosa et non maculosa.* C. B. P. p. 102.

Gelind Flöh: Kraut. Pfersing: Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 191.

Auf dem Damme nach dem Bretter: Krüge zu.

1026.

*Polygonum seu*

*Perficaria minor.* C. B. P. p. 102.

*Perficaria pumila.* Tab. l. 2. p. 528.

Klein Flöh: Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 192.

In fossis hinter dem Friedländschen Thore, nach dem Ponartschen Walde zu.

1027.

*Polygonum floribus octandris, trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente, herbaceo.* Linn. Spec. Pl. p. 362.

*Polygonum latifolium.* C. B. P. p. 281.

Wegtritt. Jungfertritt. Loef. Fl. Bor. p. 201.

1028.

*Polygonum oblongo, angusto folio.* C. B. P. p. 281.

Wegtritt mit langen, schmalen Blättern. Loef. Fl. Boruss. p. 202.

Secus viam bey Judenkirch.

1029.

*Polygonum foliis cordato-fagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus.* Linn. Sp. Pl. p. 364.

Erysi-

*Erysimum Theophrasti* folio hederaceo. C. B. P. p. 27.

*Fagopyrum*. Dodon. Helw. Fl. Quasim. p. 32.

*Fruentum faracenicum*. Matth. deutsch. p. 130. Linn.  
Fl. Svec. nr. 345.

Buch: Weihen.

In agris seritur arenosis.

1030.

*Polygonum foliis cordatis*, caule volubili, floribus planiusculis. Linn. Sp. Pl. p. 364.

*Conuoluulus minor* semine triangulo. C. B. P. p. 52.

*Conuoluulum nigrum*. Dod. Pempt. p. 396.

Schwarze Winde. Buchwinde. Loefl. Fl. Bor. p. 52.

In der Hollengrund.

## CALYCIFLORAE.

### HIPPOPHAE.

Linn. Gen. Pl. nr. 894.

1031.

*Hippophae* foliis lanceolatis. Linn. Sp. Pl. p. 1023.

*Rhamnus salicis* folio angusto, fructu flavescente. C. B. P.  
p. 477.

*Rhamnus* II. Matth. deutsch. p. 58.

Schmaler Weidenblättriger Stechdorn. Loefl. Fl. Bor. p. 230.

Ad littus maris passim. Ben Dirschkeim. Zu Balga am Hase.

## CAMPANACEAE.

### CAMPANULA.

Linn. Gen. Pl. nr. 161. Gouan. H. R. M. p. 98.

1032.

*Campanula* caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. Linn. Sp. Pl. p. 166.

P. 2

Cam-

*Campanula vulgarior*, foliis *Urticae*, vel major et asperior.

C. B. P. p. 94.

Gemein Nesselblättriges scharfes Halskraut. Loef. Fl. Bor.  
P. 32.

Nach dem Donartschen Walde zu.

1033.

*Campanula vulgaris* μονοκλῶνος, foliis *Urticae* flore candido. Nesselblättriges Halskraut, mit weißer Blüt. Loef. Fl. Bor. p. 132.

Hinter Lattenwalde im Gebürge.

1034.

*Campanula caule angulato*, simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali. Linn. Sp. Pl. p. 166.

*Campanula pratensis* flore conglomerato. C. B. P. p. 94.

*Uuularia exigua*. Seb. in Trag. p. 727.

Klein Halskraut, mit dicht an einander gesetzten Blumen.  
Loef. Fl. Bor. p. 33.

In der Hollengrund.

1035.

*Campanula oblongifolia*, flore cœruleo in summis cauliculis. Blaue Glockenblum mit länglichten Blättern, dessen Blümlein auf den obersten Stengeln. Loef. Fl. Bor. p. 33.

Beim Donartschen Walde.

1036.

*Campanula longifolia* flore albo, in summis cauliculis. Weiße Glockenblum mit länglichten Blättern, dessen weiße Blümlein auf den obersten Stengeln. Loef. Fl. Bor. p. 33.

In locis montosis et umbrosis bey Cumainen.

1037.

*Campanula foliis radicalibus obouatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis, sessilibus, remotis*. Linn. Spec. Pl. p. 164.

*Rapunculus perfoliatus*, magno flore. C. B. P. p. 93.

Pfirsichblättriger Rapunzel. Loef. Fl. Bor. p. 229.

Hinter Lattenwalde im See: Gebürge.

1038.

1038.

*Campanula vulgatio*, foliis urticae vel major et asperior, flore dilute purpurascente. C. B. P. p. 94.

Groß Hals-Kraut. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 7. nr. 31.

1039.

*Campanula urticae* foliis, oblongis, minus asperis. C. B. P. p. 94. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 7. nr. 32.

In montosis.

1040.

Eadem flore albo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 7. nr. 33.

1041.

*Campanula pratensis*, floribus singularibus, per caulem sparsis. C. B. P. p. 94. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 7. nr. 34.

Circa vias in sylvis.

1042.

Eadem flore cinereo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 7. nr. 35.

1043.

*Campanula pratensis*, flore per caulem sparso, albo. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 7. nr. 36.

1044.

*Campanula ramosa*, floribus plerumque singularibus. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 7. nr. 37.

1045.

*Campanula media*, inferius foliis candida lanugine vestitis. C. B. P. p. 94. Thal. Sylv. H. p. 32. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 8. nr. 38.

Bei Stocken auf den Bergen im Milkischen Kirchspiel.

1046.

*Campanula Persicaefolia* flore albo simplici. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 8. nr. 40.

In der Dgonschen Heide.

1047.

*Campanula* foliis ovatis, glabris, subserratis, caule erecto, paniculato: ramulis brevibus. Linn. Sp. Pl. p. 164.

*Campanula pyramidata altissima*. Tourn. Inst. p. 109.

*Rapunculus latiore folio* siue *Pyramidalis*. C. B. P. p. 93.

P 3

Milch-



Milchglöcklein. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 8. nr. 41.  
Zu Quicken bey Eckersberg.

1048.

*Campanula hispida*, racemo ovato oblongo, terminali, caule simplicissimo, foliis lanceolato-linearibus. Linn. Sp. Pl. p. 167.

*Campanula floribus villosis* Echii. C. B. P. p. 49. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 9. nr. 42.

1049.

*Campanula nemorosa angustifolia*, flore paruo. Tourn. Inst. p. 111.

*Rapunculus nemorosus*, angustifolius, flore parua. C. B. P. p. 93.

Wald: Rapunzel. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 9. nr. 44.

In der Damerau, et ad strues lapidum auf dem Stadt Felde.

1050.

*Campanula Alpina glabra*, flore dilutissime coeruleo, Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 9. nr. 45.

## PHYTEUMA.

Linn. Gen. Pl. nr. 162. Gouan. H. R. M. p. 90.

1051.

*Phyteuma spica oblonga*, capsulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. Linn. Spec. Pl. p. 171.

*Rapunculus spicatus*. C. B. P. p. 92.

Großer Rapunzel mit einer Fuchs, Schwanz, Aehre. Loef. Fl. Bor. p. 228.

In umbrosis bey Bladau. Im Ponartschen Walde.

## IASIONE.

Linn. Gen. Pl. nr. 819. Gouan. H. R. M. p. 466.

1052.

*Iasione*. Linn. Sp. Pl. p. 928.

*Rapunculus scabiosae capitulo*, coeruleo. C. B. P. p. 92.

Rapunzel mit blauen Scabiosen Köpfen. Loef. F. B. p. 229.

In incultis siccioribus passim.

1053.

1053.

Iasione feu

Rapunculus scabiosae capitulo carneo. Rapunzel mit fleischfarbenen Blumen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 59. nr. 155. Bey Quednau.

1054.

Iasione feu

Rapunculus scabiosae capitulo caesio, Rapunzel mit grauen Scabiosen Köpfen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 59. nr. 56. Im Löbischten.

1055.

Iasione feu

Rapunculus spicatus, spica orbiculari Oelhausii. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 59. nr. 357. Bey Grabowen im Walde.

1056.

Iasione feu

Rapunculus scabiosae capitulo candido. Loeß. Fl. Bor. p. 229. Bey dem Löbenichtschen Walde in incultis.

SAMOLVS.

Linn. Gen. Pl. nr. 172. Gouan. H. R. M. p. 100.

1057.

Samolus. Linn. Sp. Pl. p. 171.

Samolus Valerandi. I. Bauh.

Amagallis aquatica folio rotundo non crenato. C. B. Pin. p. 252.

Wachbungen mit runden unzerkerbten Blättern. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 60. nr. 362.

In riutlis.

POLEMONIVM.

Linn. Gen. Pl. nr. 159. Gouan. H. R. M. p. 95.

1058.

Polemonium calycibus corollae tubo longioribus. Linn. Sp. Pl. p. 162.

Valeriana coerulea. C. B. P. p. 278.

P 4

Vale-

Valeriana Graeca. Dod. Pempt. p. 352.

Griechischer Baldrian. Loef. Fl. Bor. p. 278.

Ben Judenkirch auf der Wiese.

## CORNICVLATAE.

### CIRCAEA.

*Linn. Gen. Plant. nr. 19. Gouan H. R. M. p. 8.*

1059.

**C**ircaea caule erecto, racemis plurimis. Linn. Sp. Pl. p. 9

Solanifolia, Circaea dicta, major. C. B. P. p. 168.

St. Stephans Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 256.

Ben Schwanis in uliginosis.

1060.

Circaea. Col. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 13. nr. 70.

Solanifolia, Circaea Alpina. C. B. P. p. 168.

Klein Stephans Kraut. Helw.

In truncis alneis putrefactis.

### EPILOBIVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 377. Gouan, H. R. M. p. 193.*

1061.

**E**pilobium foliis sparsis, lineari-lanceolatis. Linn. Spec. Pl. p. 347.

Lyfimachia, Chamaenerion dicta, latifolia. C. B. P. p. 245.

St. Antonii Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 154.

In der Hollengrund.

1062.

**E**pilobium foliis oppositis, lanceolatis, serratis. Linn. Spec. Pl. p. 347.

Lyfimachia filiquosa, hirsuta, magno flore. C. B. Pin. p. 245.

Krother oder brauner Weiderich. Loef. Fl. Bor. p. 151.

Ad rivulos passim.

1063.

1063.

*Epilobium* feu

*Lyfimachia filiquosa, hirsuta, paruo flore.* C. B. P. p. 245.

Großer, rauher, Schottentragernder Weiderich mit kleiner  
Blüt. Loef. Fl. Bor. p. 151.

In udis passim.

1064.

*Epilobium foliis oppositis, ouatis, dentatis.* L. S. P. p. 348.

*Lyfimachia filiquosa major.* C. B. P. p. 245.

Großer, glatter, Schotten tragender Weiderich. Loef. Fl.  
Bor. p. 151.

In locis udis.

1065.

*Epilobium foliis lanceolato-linearibus, denticulatis, imis op-  
positis, caule tetragono.* Linn. Sp. Pl. p. 348.

*Chamaenerion angustifolium glabrum.* Tourn. Inst. p. 303.

*Lyfimachia filiquosa glabra minor.* C. B. P. p. 245.

Kleiner untrauher Schotten tragender Weiderich. Loef. Fl.  
Bor. p. 152.

In der Hollengrund in uliginosis.

1066.

*Epilobium* feu

*Lyfimachia filiquosa glabra minor flore albo.* Loef. Fl. Bor.  
p. 152.

Ben Gerdaun am Mühlen-Teich in umbrosis.

1067.

*Epilobium* feu

*Chamaenerion villosum magno flore, ex purpurea albes-  
cente.* Blasprothe Weiderich, Köpflein. Helw. Snppl. Fl.  
Bor. p. 11. nr. 58.

*Epilobium* siue

*Chamaenerion villosum majus, paruo flore.* Tourn. Inst.  
p. 303.

*Lyfimachia filiquosa hirsuta major paruo flore.* C. B. P.  
p. 245. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 12. nr. 54.

Hinter Königsberg.

P 5

GLAV.



## GLAUCOPHYLLAE.

## PEPLIS.

*Linn. Gen. Plant. fr. 354.*

1068.

**P**eplis. Linn. Sp. Pl. p. 332.

Glaux aquatica folio subrotundo. Loef. Fl. Bor. p. 106.

Glaux altera, subrotundo folio. Vaill. Bot. Par. Tab. XV.

Fig. 5.

Alfne palustris minor serpillifolia. C. B. P. p. 251

In lacunis hinter dem Tragheimschen Walle.

## LYTHRUM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 463. Gouan, H. R. M. p. 227.*

1069.

Lythrum foliis oppositis, cordato-lanceolatis, floribus spicatis, dodecandris. Linn. Sp. Pl. p. 446.

Lysimachia spicata purpurea. C. B. P. p. 246.

Brauner spiziger Weiderich. Loef. Fl. Bor. p. 152.

Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. Tourn. Inst. p. 253.

In incultis.



## SEPIARIAE.

## EVONYMVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 111. Gouan, H. R. M. p. 113.*

1070.

**E**uonymus floribus plerisque quadrifidis. Linn. Spec. Pl. p. 197.

Euonymus vulgaris, granis rubentibus. C. B. P. p. 428.

Tourn. Inst. p. 617.

Zwischholz. Loef. Fl. Bor. p. 70.

In der Hollengrund.

1071.

1071.

*Euonymus latifolius*. Linn. Sp. Pl. p. 197.*Euonymus tertia* sine *latifolia*. Clus. H. l. 2. p. 56.*Euonymus latifolius*. C. B. P. p. 428.*Breitblättriger Spindelbaum*. Helw. Suppl. Fl. Quasim.

p. 31.

*Circa margines sylvarum et agrogrum*.

## RHAMNUS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 188. Gouan. H. R. M. p. 112.*

1072.

*Rhamnus spicis terminalibus, floribus quadrifidis, dioicis.*

Linn. Sp.-Pl. p. 193.

*Rhamnus catharticus*. C. B. Pin. p. 478. Tourn. Inst.

p. 593.

*Creutz: Beer. Loef. Fl. Bor. p. 230.**In umbrosis bey Rumainen.*

1073.

*Rhamnus inermis, floribus monogynis, hermaphroditis foliis integerrimis.* Linn. Sp. Pl. p. 193.*Alnus nigra baccifera*. C. B. P. p. 428. Tourn. Inst. p. 612.*Faulbaum. Loef. Fl. Bor. p. 11.**In der Hollengrund.*

## R O S A C E A E.

## ALCHIMILLA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 122. Gouan. H. R. M. p. 113.*

1074.

*Alchimilla foliis lobatis.* Linn. Sp. Pl. p. 128.*Alchimilla vulgaris*. C. B. P. p. 319. Tourn. Inst. p. 508.*Alchimilla*. Seb. in Trag. p. 408.*Unser Frauen Mantel. Loef. Fl. Bor. p. 7.**In graminosis passim.*

AGRI-

## AGRIMONIA.

*Linn. Gen. Pl. p. 464. Gouan H. R. M. p. 228.*

1075.

*Agrimonia foliis caulinis, pinnatis, fructibus hispidis. Linn.**Sp. Pl. p. 448.**Eupatorium Veterum, seu Agrimonia. C. B. P. p. 321.**Agrimonia Officinarum. Tourn. Inst. p. 381.**Odermennie. Loef. Fl. Bor. p. 71.**In der Hollengrund.*

1076.

*Agrimonia floribus luteo-pallidis. Helw. Suppl. Fl. Bor.**p. 2. nr. 7.**Inter frutices auf Mozenen prope Angerburgum.*

## SPIRAEA.

*Linn. Gen. Plant. nr. 206. Gouan. H. R. M. p. 245.*

1077.

*Spiraea foliis pinnatis, foliolis uniformibus, serratis, caule herbaceo, floribus cymosis. Linn. Sp. Pl. p. 490.**Filipendula vulgaris. C. B. P. p. 163.**Filipendia. Seb. in Trag. p. 695.**Rother Steinbrech. Loef. Fl. Bor. p. 73.**Ben Lautenmühl im Gebüsch.*

1078.

*Spiraea foliis pinnatis, impari, majore lobato, floribus cymosis. Linn. Sp. Pl. p. 490.**Barba caprae floribus compactis. C. B. P. p. 164.**Regina prati. Dod. Peimpt. p. 57.**Geißbart. Medesüß. Loef. Fl. Bor. p. 23.**In pratis passim.*

## ROSA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 484. Gouan. H. R. M. p. 245.*

1079.

*Rosa caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus pinnatis.**Linn. Sp. Pl. p. 491.*

Rosa

*Rosa sylvestris vulgaris*, flore odorato, incarnato. C. B. P.  
p. 483.

Hahnbutten oder Gelbrosen. Loef. Fl. Bor. p. 231.

Inter fruticeta passim.

1080.

*Rosa aculeata*, foliis odoratis, subtus rubiginosis. Linn. Sp.

Pl. p. 491.

*Rosa sylvestris foliis odoratis*. C. B. P. p. 483.

*Rosa Eglanteria*. Tab. l. p.

Engeltier, Rosen. Helw. Fl. Quasim. p. 44.

In hortis rusticorum passim.

1081.

*Rosa rubra simplex*. C. B. P. p. 481.

Rothe Zucker, Rosen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 60.

In quibusvis fere hortis.

R V B V S.

Linn. Gen. Pl. nr. 485. Gouan. H. R. M. p. 246.

1082.

*Rubus foliis quinato-digitatis, ternatisque, caule petiolisque  
aculeatis*. Linn. Sp. Pl. p. 493.

*Rubus vulgaris*, siue *Rubus fructu nigro*. C. B. P. p. 479.

Schwarze Brombeeren. Loef. Fl. Bor. p. 332.

Bei der Altstädtschen Ziegelscheune.

1083.

*Rubus foliis quinato-pinnatis, ternatisque, caule aculeato,  
petiolis canaliculatis*. Linn. Sp. Pl. p. 493.

*Rubus idaeus spinosus*. C. B. P. p. 479.

Rothe Hundsbeeren. Loef. Fl. Bor. p. 233.

In der Hollengrund.

1084.

*Rubus foliis ternatis, nudis, caule aculeato*. Linn. Spec. Pl.  
p. 493.

*Rubus repens fructu caesio*. C. B. P. p. 479.

Blaue Krakelbeeren. Loef. Fl. Bor. p. 233.

In arvis passim.

1085.



1085.

*Rubus foliis ternatis, nudis, flagellis reptantibus, herbaceis.*

Linn. Spec. Pl. p. 494.

*Chamaerubus saxatilis.* C. B. P. p. 110.

*Rubus saxatilis Alpinus.* Clus. H. l. 1. p. 118.

*Brunitschen.* Loef. Fl. Bor. p. 234

In umbrosis bey Blatau.

1086.

*Rubus foliis simplicibus, lobatis, caule unifloro.* Linn. Sp.

Pl. p. 494.

*Chamaerubus foliis Ribes.* C. B. P. p. 480.

*Chamaemorus Norwegica.* Clus. H. l. 1. p. 119.

*Zetie: Beeren.* Norwegis: Mulierculis nostris *Pautchen*

*Beeren.* Wulff. Spec. Inaug. p. 11.

In paludosis hospitat inter Hohenbagen et Barten.

## POTENTILLA.

Linn. Gen. Pl. nr. 478. Gouan H. R. M. p. 248.

1087.

*Potentilla foliis pinnatis, serratis, caule repente.* Linn. Spec.

Pl. p. 495.

*Potentilla.* C. B. P. p. 321.

*Genserich.* Loef. Fl. Bor. p. 206.

In pratis.

1088.

*Potentilla repens, hirsuta incana.* Loef. Fl. Bor. p. 207.

Bey Neuendorf am Wege.

1089.

*Potentilla foliis quinatis, cuneiformibus, incisis, subtus tomentosis, caule erecto.* Linn. Sp. Pl. p. 497.

*Quinquefolium folio argenteo.* C. B. P. p. 325.

*Quinquefolium erectum luteum, dorso foliorum incano.*

Loef. Fl. Bor. p. 218.

Vor dem Brandenburgischen Thore in arenosis.

1090.

*Potentilla foliis radicalibus quinatis, acute serratis, cauli-*

caulinis ternatis, caule declinato. Linn. Spec. Plant.  
p. 498.

Quinquefolium minus repens luteum. C. B. P. p. 325.

Klein kriechend Fünffingerkraut. Loef. Fl. Bor. p. 217.  
In locis arenosis passim.

1091.

Potentilla foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris.  
Linn. Sp. Pl. p. 499.

Quinquefolium majus repens. C. B. P. p. 216.

Groß gemein kriechend Fünffingerkraut. Loef. Fl. Bor.  
p. 216.

Auf dem Tragheimschen Kirchhof.

1092.

Potentilla foliis ternatis, caule dichotomo, pedunculis axil-  
laribus. Linn. Sp. Pl. p. 499.

Quinquefolium hirsutum luteum paucioribus laciniis. Loef.  
Fl. Bor. p. 218.

Am Altstädtschen Walle nicht weit vom Baume.

1093.

Potentilla foliis digitatis, lanceolatis, serratis, utrinque sub-  
pilosis, caule erecto. Linn. Sp. Pl. p. 497.

Quinquefolium rectum luteum. C. B. P. p. 325.

Quinquefolium alterum vulgare. Dod. Pempt. p. 116.

Aufrechtstehendes Fünffingerkraut. Wulff. Spec. Inaug.  
p. 18.

In locis montanis habitat.

1094.

Potentilla siue

Quinquefolium lanuginosum, foliorum segmentis profun-  
dus incis. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 56. nr. 336.

1095.

Potentilla foliis digitatis, apice connuenti-serratis, caulibus  
filiformibus, procumbentibus, receptaculis hirsutis. Linn.  
Spec. Pl. p. 498.

Quinquefolium majus, album, alterum. C. B. P. p. 325.  
Fünff

**Jünffinger:** Kraut mit weißer Blüt, Helw. Suppl. Fl. Bor.  
p. 57. nr. 338.

**In Lohwalds Heide im Reinschen.**  
1096.

**Potentilla, siue**

**Quinquefolium minus repens, lanuginosum, luteum. C. B.**  
P. p. 325.

**Klein kriechend Jünffinger:** Kraut, unten mit aschfarbenen  
Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 217.

**In saxosis passim bey Königsberg.**  
1097.

**Potentilla seu**

**Quinquefolium minus, repens, Alpinum aureum. C. B. P.**  
p. 325. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 57. nr.

**In dem Angerburgschen Widdem: Garten.**

## FRAGARIA.

*Linn. Gen. Plant. no. 486. Gouan. H. R. M. p. 247.*

1098.

**Fragaria flagellis reptans. Linn. Sp. Pl. p. 494.**

**Fragaria vulgaris. C. B. P. p. 326.**

**Potentilla foliis ternatis, fructibus baccatis, stolonibus reptantibus. Ger. Gallo-Prov. p. 470.**

**Erdbeer: Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 75.**

**In syluis et locis apricis passim.**

1099.

**Fragaria cauliculis maxime reptantibus. Loef. Fl. Bor. p. 75.**

**Auf der Curischen Näherung in pago Lattenwald.**

## TORMENTILLA.

*Linn. Gen. Pl. no. 488. Gouan. H. R. M. p. 249.*

1100.

**Tormentilla caule erecto. Linn. Sp. Pl. p. 500.**

**Tormentilla sylvestris. C. B. P. p. 326. Tourn. Inst. p. 298.**

**Tormentill. Loef. Fl. Bor. p. 270.**

**In umbrosis et muscosis passim.**

COMA-

## ROSACEAE.

241

### COMARVM.

*Linn. Gen. Pl. nr. 489.*

1101.

*Comarum.* Linn. Spec. Pl. p. 502.

*Quinquefolium palustre rubrum.* C. B. P. p. 325.

*Pentaphylloides palustre rubrum.* Tourn. Inst. p. 498.

*Roht Wasser: Fünffinger: Kraut.* Loef. Fl. Bor. p. 278.

*In pratis uliginosis.*

## POMIFERA E.

### PRUNVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 474. Gouan. H. R. M. p. 239.*

1102.

**P**runus floribus racemosis, foliis deciduis, basi subtus biglandulosis. Linn. Sp. Pl. p. 473.

*Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli.* C. B. P. p. 451.

*Cerasus atium racemosa.* Lob. Adv. p. 436.

*Hüner: Augen: Beeren.* Loef. Fl. Bor. p. 42.

*In der Hollengrund.*

1103.

*Prunus spinosa, foliis lanceolatis.* Linn. Sp. Pl. p. 475.

*Prunus sylvestris.* C. B. P. p. 207.

*Schlehdorn.* Loef. Fl. Bor. p. 207.

*In der Hollengrund.*

1104.

*Prunus pedunculis simplicibus, foliis ovato-lanceolatis, con-*  
*duplicatis.* Linn. Sp. Pl. p. 474.

*Cerasa fructu nigro, paruo, dulci.* Vogel: *Kirschen.* Helw.  
*Suppl. Fl. Bor. p. 11. nr.*

### CRATAEGVS.

*Linn. Gen. Pl. p. 477. Gouan H. R. M. p. 240.*

1105.

*Crataegus foliis obtusis, bitrifidis, ferratis.* Linn. S. P. p. 477.

Q

*Mespi-*

*Mespilus Apii folio, sylvestris spinosa, siue Oxyacantha.* C.

B. P. p. 454. Tourn. Inst. p. 642.

*Cynosbatus Theophrasti.* Seb. in Trag. p. 771.

*Hagedorn. Meelbaum.* Loef. Fl. Bor. p. 163.

In der Hollengrund.

### SORBUS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 478. Gouan. H. R. M. p. 241.*

1106.

*Sorbus foliis pinnatis, utrimque glabris.* Linn. Sp. Pl. p. 477.

*Sorbus sylvestris foliis domesticae similis.* C. B. P. p. 260.

*Quirsch. Baum.* Loef. Fl. Bor. p. 260.

In sylvis passim.

### PYRUS.

*Linn. Gen. Plant. nr. 481. Gouan. H. R. M. p. 242.*

1107.

*Pyrus foliis ferratis, foliis basi productis.* Linn. Sp. Pl. p. 479.

*Pyrus sylvestris.* C. B. P. p. 439.

*Holbbeeren. Kirschen.* Loef. Fl. Bor. p. 211.

1108.

*Pyrus foliis ferratis, pomis basi concavis.* Linn. Sp. Plant. p. 479.

*Malus sylvestris.* C. B. P. p. 433. Dod. Pempt. p. 790.

*Kleine Holzapfel. Hölsten.* Loef. Fl. Bor. p. 157.



## COLVMNIFERAE.

### MALVA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 676. Gouan. H. R. M. p. 347.*

1109.

**M**alva caule repente, foliis cordato-orbiculatis, obsolete quiquelobis. Linn. Sp. Pl. p. 689.

*Malva sylvestris folio subrotundo.* C. B. P. p. 314.

*Maasen; Pappeln.* Loef. Fl. Bor. p. 157.

Circa hortos, rudera, pagos.

1110.

1110.

*Malua caule erecto, herbaceo, foliis lobatis, obtusis, pedunculis petiolisque pilosis.* Linn. Sp. Pl. p. 689.

*Malua sylvestris folio sinuato.* C. B. P. p. 314.

Große, wilde Pappel. Loef. Fl. Bor. p. 156.

Hinter Fischhausen nach Lochstet zu.

1111.

*Malua caule erecto, foliis multipartitis, scabritusculis.* Linn. Sp. Pl. p. 689.

*Alcea vulgaris major.* C. B. P. p. 316.

Engelswurz. Loef. Fl. Bor. p. 7.

In der Hollengrund.

ALCEA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 679. Gouan H. R. M. p. 345.*

1112.

*Alcea foliis sinuato-angulosis.* Linn. Sp. Pl. p. 687.

*Malua rosea, folio subrotundo, flore dilutius rubente.* C. B. P. p. 315.

Rothe Stock-Rosen. Helw. Suppl. Flor. Boruss. p. 46. nr. 270.

Hortis rusticis inquilina.

1113.

*Malua rosea, folio subrotundo, flore albo.* Weiße Stock-Rosen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 47. nr. 271.

ALTHAEA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 680. Gouan. H. R. M. p. 345.*

1114.

*Athaea foliis simplicibus, tomentosis.* Linn. Spec. Plant. p. 686.

*Athaea Dioscoridis et Plinii.* C. B. P. p. 315. Tourt. Inst. p. 26.

Ibiscus Wigandi, de herbis Prussicis p. 61.

Eibisch. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 24.



# PAPILIONACEAE.

## GENISTA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 690. Göüan. H. R. M. p. 356.*

**G**enista foliis lanceolatis, racemis striatis, teretibus, erectis.  
Linn. Sp. Pl. p. 710.

Genista tinctoria Germanica. C. B. P. p. 395. Tourn. Inst.  
p. 643.

Genst oder Genster. Klein Farb-Pfrimmen. Loef. Fl. Bor.  
p. 101.

Ben Moßrungen copiose.

1115.

Genista tinctoria germanica, foliis angustioribus. C. B. P.  
p. 395.

Galeise. Klein Pfrimmen: Kraut. Helw. Suppl. Fl. Bor.  
p. 25. nr. 144.

Im Weissun bey Johannisburg.

## ONONIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 696. Göüan H. R. M. p. 358.*

1117.

Ononis floribus racemosis, geminatis, foliis ternatis, ramis  
spinosis. Linn. Sp. Pl. p. 716.

Anonis spinosa, flore purpureo: C. B. P. p. 389.

Braun Hauhechel. Loef. Fl. Bor. p. 17.

Zwischen Uderwangen und Weissenstein.

1118.

Ononis floribus subsessilibus, solitariis, lateralibus, ramis in-  
ermibus. Linn. Sp. Pl. p. 716.

Anonis spinis carens purpurea. C. B. P. p. 389.

Braune Hauhechel ohne Strahlen. Loef. Fl. Bor. p. 17.

Bey Elbing copiose.

1119.

Ononis seu Anonis spinosa flore albo. C. B. P. p.

Weisse

Weisse Hauhechel. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 3. nr. 13.  
 Ben Langheim.

1120.

Ononis seu Anonis spinis carens flore albo. Helw. Suppl.  
 Fl. Bor. p. 3. nr. 14.

ANTHYLLIS.

Linn. Gen. Pl. nro. 712. Gouan. H. R. M. p. 360.

1121.

Anthyllis herbacea, foliis pinnatis, inaequalibus, capitulo  
 duplicato. Linn. Sp. Pl. p. 719.

Loto affinis, Vulneraria pratensis. C. B. P. p. 332.

Geeler Haasen: Klee. Loef. Fl. Bor. p. 144.

Ben Lautenmühl in incultis.

ASTRAGALVS.

Linn. Gen. Pl. nr. 717. Gouan. H. R. M. p. 389.

1122.

Astragalus caulescens, prostratus, leguminibus subtriquetris,  
 arcuatis, foliis ovalibus, pedunculo longioribus. Linn.  
 Sp. Pl. p. 718.

Glyzorrhiza filiquosa vel Germanica. C. B. P. p. 106.

Lackerke. Loef. Fl. Bor. p. 106.

In der Hollengrund.

1123.

Astragalus, caulescens, diffusus, pedunculis spicatis, vexillis  
 flore duplo longioribus. Linn. Sp. Pl. p. 760.

Onobrychis floribus viciae, dilute coeruleis. C. B. Pin.  
 p. 351.

Hahnen: Kopf mit lichtblauen Wicken: Blümlein. Loef. Fl.  
 Bor. p. 179.

Ben St. Albrecht an der See. Zwischen dem Sand: und  
 Dümpel: Krüge.

1124.

Astragalus luteus perennis, siliqua gemella, rotunda, vesicam  
 referente. Tourn. Inst. p. 416.

Q3

Gelbe



Gesbe Peltfchen. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 4. nr. 15.  
 Ben Langheim auf den Wiesen.

## OROBVS.

*Linn. Gen. Plant. nro. 709. Gouan. H. R. M. p. 366.*

1125.

*Orob. foliis pinnatis, ouatis, stipulis semi sagittariis, integerrimis, caule simplici.* Linn. Sp. Pl. p. 728.

*Orob. sylvaticus purpureus vernus.* C. B. P. p. 351.

Braunrothe frühzeitige Wald: Kuchern. Loeß. Fl. Boruss.  
 p. 187.

Ben Bladau im Rosgarten.

1126.

*Orob. caule ramoso, foliis sexjugis, ouato-oblongis.* Linn.  
 Sp. Pl. p. 728.

*Orob. sylvaticus viciae foliis.* C. B. P. p. 382.

Würffelsaamigte Wald: Kuchern, mit Wicken-Blättern.  
 Loeß. Fl. Bor. p. 187.

In der Hollengrund.

1127.

*Orob. vernus colore rosaceo.* Rosenfarbe frühe Wald:  
 Kuchern. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 52. nr. 309.

Im Rehlischen Walde und in der Damerau.

1128.

*Orob. foliis pinnatis, lanceolatis, stipulis semi sagittatis, integerrimis, caule simplici.* Linn. Sp. Pl. p. 728.

*Astragalus sylvaticus, foliis oblongis, glabris.* C. B. P. p. 351.

*Lathyrus angustifolius radice ruberosa.* Loeß. Fl. Bor. p. 138.

Weym Alstädtschen Gerichte.

## LATHYRVS.

*Linn. Gen. Pl. nro. 707. Gouan. H. R. M. p. 367.*

1129.

*Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis: cirrhis simplicissimis.* Linn. Sp. Pl. p. 733.

*Lathyrus sylvestris luteus, foliis viciae.* C. B. P. p. 344.

Vicia.

Vicia. Tab. I. 2. p. 208.

Gele Wicken. Loef. Fl. Bor. p. 158.

In rubetis et dumetis passim.

1130.

Lathyrus sylvestris, luteus, foliis viciae minor, in frutices scandens. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 40. nr. 233.

Im Stulischschen Walde.

1131.

Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis, Linn. Spec. Pl.

p. 733.

Lathyrus latifolius. C. B. P. p. 344.

Wilde Rüchern. Loef. Fl. Bor. p. 138.

In der Hollengrund.

## CORONILLA.

Linn. Gen. Plant. nr. 712. Gouan H. R. M. p. 377.

1132.

Coronilla herbacea, leguminibus erectis, teretibus, torosis, numerosis, foliis glabris. Linn. Sp. Pl. p. 740.

Securidaca dumetorum, minor pallide coerulea. C. B. P. p. 349. Loef. Fl. Bor. p. 250.

Ben Holland copiose.

1133.

Coronilla herbacea, leguminibus erectis, teretibus, torosis, numerosis, foliis glabris. Linn. Sp. Pl. p. 743.

Securidaca dumetorum, major flore vario, siliquis articulatis. C. B. P. p. 349.

Coronilla herbacea flore vario. Tourn. Inst. p.

Duppurbraune Peltchen. Helw. Suppl. Fl. B. p. 16. nr. 79.

Im Johannisburgschen auf dem Werder Warschau geerntet, copiose.

## VICIA.

Linn. Gen. Pl. nr. 708. Gouan. H. R. M. p. 376.

1134.

Vicia pedunculis multifloris, foliolis reflexis, ovatis.

Q 4

mucro-

mucronatis, stipulis subdentatis. Linn. Spec. Plant.  
p. 734.

*Vicia maxima dumetorum.* C. B. P. p. 345.

*Vicia sylvatica multiflora maxima.* Helw. Suppl. Fl. Bor.  
p. 66. nr. 404.

*Vicia lathyroides purpureo-coeruleis et floribus rubeis.*  
Herm. Par. Bat. p. 242.

1135.

*Vicia leguminibus sessilibus, subbinatis, erectis, foliis re-*  
*tusis, stipulis notatis.* Linn. Sp. Pl. p. 736.

*Vicia sativa vulgaris semine nigro.* C. B. P. p. 344. Helw.  
Suppl. Fl. Bor. p. 66. nr. 401.

Inter segetes passim.

1136.

*Vicia leguminibus pedicellatis, subquaternis erectis, foliolis*  
*ovatis integerrimis: exterioribus decrescentibus.* Linn.  
Sp. Pl. p. 737.

*Vicia sepium, folio rotundiore acuto.* C. B. P. p. 345.

Große Wicken. Loef. Fl. Bor. p. 283.

In dumetis et frutetis passim.

## ERVUM.

Linn. Gen. Pl. nr. 714. Gouan. H. R. M. p. 737.

1137.

*Ervum pedunculis, unifloris.* Linn. Sp. Pl. p. 738.

*Vicia segetum, cum siliquis plurimis, hirsutis.* C. B. P.  
p. 345.

Kleine wilde Wicken. Loef. Fl. Bor. p. 284.

Inter segetes passim.

## TRIFOLIUM:

Linn. Gen. Pl. nr. 713. Gouan. H. R. M. p. 387.

1138.

*Trifolium leguminibus racemosis, nudis dispermis, caule*  
*erecto.* Linn. Sp. Pl. p. 765.

*Melilotus Officinarum Germaniae.* C. B. P. p. 331.

Trifo-

*Trifolium odoratum*, siue *Melilotus*. Dod. Pempt. p. 567.

*Meliloten*. Loef. Fl. Bor. p. 161.

Zwischen Almannshausen und Stockheim, copiose.

1139.

*Trifolium* seu

*Melilotus Officinarum Germanicae* flore albo. C. B. P. p.

Tourn. Inst. p. 407.

*Lotus sylvestris* flore albo. Tab. I. p.

Weißer *Meliloten*.

Passim in collibus lutosus.

1140.

*Trifolium capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis,*  
caule repente. Linn. Sp. Pl. p. 767.

*Trifolium pratense album*. C. B. P. p. 327.

Weißer Wiesen; Klee. Loef. Fl. Bor. p. 272.

In pratis passim editioribus.

1141.

*Trifolium phaeum, fuscum, luxurians, quaternis, quinis et*  
senis foliis. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 64. nr. 392.

*Lotus quadrifolia*. IV. Tab. I. 2. p. 212.

*Quadrifolium pratense album*. C. B. P. p. 327.

Passim.

1142.

*Trifolium spicis villosis, longis, corollis monopetalis, caule*  
erecto, foliis ferrulatis. Linn. Sp. Pl. p. 768.

*Trifolium montanum spica longissima rubente*. C. B. P.  
p. 328.

*Lagopus major alter*. Dod. Pempt. p. 578.

Großer Weiß; Klee. Loef. Fl. Bor. p. 273.

Am Berge bey der Bartenischen Mühle.

1143.

*Trifolium spicis subvillosis, tinctis stipulis oppositis mem-*  
branaceis, corollis monopetalis. Linn. Sp. Pl. p. 768.

*Trifolium pratense purpureum*. C. B. P. p. 327.

Braun Wiesen; Klee. Loef. Fl. Bor. p. 272.

In pratis passim.

Q5

1144.

1144.

*Trifolium spicis villosis, ovalibus, dentibus calycinis, setaceis, aequalibus.* Linn. Spec. Pl. p. 769.

*Trifolium aruense humile, spicatum, siue Lagopus.* C. B. P. p. 274.

Haasen: Klee. Raken: Klee. Loef. Fl. Bor. p. 274.  
Inter segetes passim.

1145.

*Trifolium capitulis terminalibus, corollarum vexillis subulatis, caule erecto, foliolis lanceolatis, ferratis.* Linn. Sp. Plant. p. 770.

*Trifolium montanum album.* C. B. P. p. 328.

*Trifolium pratense album.* Fuchf. H. p. 818.

Weiß spitziger Berg: Klee. Loef. Fl. Bor. p. 273.  
Hinter Quednau.

1146.

*Trifolium montanum, purpureum majus.* C. B. P. p. 328.

*Trifolium majus.* H. Clusf. H. l. 6. p. 245. Loef. Fl. Bor. p. 273.

In montosis passim.

1147.

*Trifolium spicis ovalibus, imbricatis, vexillis deflexis, persistentibus, calycibus nudis, caule erecto.* Linn. Sp. Pl. p. 772.

*Trifolium pratense luteum, capitulo lupuli vel Agrarium.* C. B. P. p. 328. Vaill. Bot. Par. Tab. XXII. Fig. 3.

Raken: Klee. Haasen: Psötlein. Loef. Fl. Bor. p. 273.  
Ad limites agrorum passim.

## M E D I C A G O.

*Linn. Gen. Pl. nr. 725. Gouan. H. R. M. p. 399.*

1148.

*Medicago pedunculis racemosis, leguminibus innatis, caule prostrato.* Linn. Sp. Pl. p. 779.

*Trifolium sylvestre luteum, siliqua cornuta.* C. B. P. p. 330.

*Medica flava flore.* Clusf. H. l. 2. p. 243.

Großer

Großer Steinklee. Loef. Fl. Bor. p. 274.

Bei Lautenmühl.

1149.

Medicago seu Medica sylvestris, floribus croceis foliis tetraphyllis. Großer, gelber, vierblättriger Steinklee. Helw.

Suppl. Fl. Bor. p. 47. nr. 273.

In coemiterio Angerburgico.

1150.

Eadem pentaphylla. Menz. Pug. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 47. nr. 274.

1151.

Eadem foliis maculatis. Menz. Pug. Helw. Suppl. Fl. Bor. p. 47. nr. 275.


1152.

Medicago spicis ovalibus, leguminibus reniformibus, monospermis, caule procumbente. Linn. Sp. Pl. p. 779.

Trifolium pratense luteum, capitulo brevior. Pin. p. 328.

Feldklee mit gelben kleinen Köpfchen. Loef. Fl. Bor. p. 272.

In pratis aridioribus et siccis.



## L V P V L I N A E.

### V L M V S.

Linn. Gen. Pl. nr. 239. Gössan H. R. M. p. 127.

1153.

Vlmus foliis duplicato-ferratis, basi inaequalibus. Linn. Sp. Pl. p. 225.

Vlmus campestris et Theophrasti. C. B. P. p. 232, Tourn. Inst. p. 601.

Vlmus. Röstern. Loef. Fl. Bor. p. 289.

In sylvis passim.

1154.

Vlmus aut ei similis, cum folliculis, quam alii pro Tilia mare offerunt. Dod. Pempt. p. 838.

Stein

Steinlinden. Wicken. Loef. Fl. Bor. p. 260.

In sylvis passim;

### VERTICA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 833. Gouan. H. R. M. p. 484.*

1155.

Vrtica foliis oppositis, cordatis, racemis geminis. Linn. Sp. Pl. p. 984.

Vrtica urens maxima. C. B. P. p. 232.

Große Brenn-Nessel. Loef. Fl. Bor. p. 291.

Passim.

1156.

Vrtica foliis oppositis, ovalibus. Linn. Sp. Pl. p. 984.

Vrtica urens minor. C. B. P. p. 232.

Heiter-Nessel. Loef. Fl. Bor. p. 292.

Circa loca habitalia passim.

### CANNABIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 901. Gouan. H. R. M. p. 504.*

1157.

Cannabis. Linn. Sp. Pl. p. 1027.

Cannabis erratica. C. B. P. p. 320.

Wilder Hanf. Loef. Fl. Bor. p. 33.

Am Kneiphöfischen Walle.

### HUMULYS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 902. Gouan. H. R. M. p. 504.*

1158.

Humulus. Linn. Sp. Pl. p. 1028.

Lupulus mas. C. B. P. p. 298.

Fruchtbarer Hopfen. Loef. Fl. Bor. p. 146.

In sylvis passim.

1159.

Humulus seu

Lupulus foemina. C. B. P. p. 147.

Unfruchtbarer Hopfen. Loef. Fl. Bor. p. 147.

Inter fruticeta passim.

AMEN-

# A M E N T A C E A E.

## S A L I X.

*Linn. Gen. Pl. n. 802. Gouan. H. R. M. p. 500.*

1160.

**S**alix foliis ferratis, ouatis, acutis, glabris: ferraturis cartilagineis, petiolis calloso punctatis. Linn. Sp. Pl. p. 1016.

Salix sativa lutea, folio crenato. C. B. P. p. 473.

Salix sylvestris angustifolia. Tab. l. 3. p. 129.

Gelbe Haarweiden. Loef. Fl. Bor. p. 238.

In der Hollengrund.

1161.

Salix foliis ferratis, glabris, ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis. Linn. Sp. Pl. p. 1017.

Salix fragilis. C. B. P. p. 474.

Salix fragilis latifolia. Bruchweide mit schmalen, langen Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 238.

Auf dem Damm nach der Neuenbrück.

1162.

Salix fragilis tenuifolia. Bruchweide mit langen, schmalen Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 238.

Zur Kobbelbude in Truchßen Walde am Ufer des Frischings.

1163.

Salix subferratis, oblongo-ouatis; subtus subuillofis, stipulis dimidiato-cordatis. Linn. Sp. Pl. p. 1021.

Salix pumila, breui angustoque folio incano. C. B. Pin. p. 474.

Salix pumila, angustifolia, altera. Clus. H. l. 1. p. 86.

Kleine schmalblättrige, kurze Haarweide. Loef. Fl. Boruss. p. 239.

Im Gebüsch bey Lautenmühl.

1164.

Salix foliis lanceolatis, acuminatis, ferratis, utrinque pubescentibus; ferraturis infimis glandulosis, Linn. Spec. Pl. p. 1021.

Salix



*Salix vulgaris*, alba arborescens. C. B. P. p. 473.

*Salix prima* vel *procera*. Dod. Pempt. p. 842.

Große Salbenblättrige Kampweide. Loef. Flor. Boruss.  
p. 235.

In pagis passim.

1165.

*Salix foliis ovatis rugosis*; subtus tomentosis, undatis, superne denticulatis. Linn. Sp. Pl. p. 1020.

*Salix latifolia* rotunda. C. B. P. p. 474.

*Salix capraea* rotundifolia. Tab. l. 3. p. 126.

Salweiden. Loef. Fl. Bor. p. 236.

In saltibus nemorosis.

1166.

*Salix vulgaris* rubens. C. B. P. p. 473.

*Salix Sabina* seu *Americana*. Thal. p. 112.

Bandweiden und rothe Weiden. Loef. Fl. Bor. p. 236.

Ben Lautenmühle.

1167.

*Salix foliis ovatis rugosis*; subtus tomentosis, undatis, superne denticulatis. Linn. Sp. Pl. p. 1020.

*Salix folio exrotunditate acuminato*. C. B. P. p. 474.

*Salix capraea* latifolia. Tab. l. 3. p. 129.

Breitblättrige gespitzte Seilweide. Loef. Fl. Bor. p. 237.

In sylvis hinc inde.

1168.

*Salix foliis subintegerrimis*, lanceolato-linearibus, longissimis acutis, subtus sericeis, ramis virgatis. Linn. Sp. Pl. p. 1021.

*Salix sylvestris* latifolia. Tab. l. 3. p. 128.

*Salix*. Bauh. in Matth. p. 175.

Breite Seilweide. Loef. Fl. Bor. p. 237.

In riguis in der Hollengrund.

1169.

*Salix foliis integerrimis*, lanceolato-linearibus, strictis, sessilibus, subtus tomentosis. Linn. Sp. Pl. p. 1020.

*Salix humilis* angustifolia. C. B. P. p. 474.

*Salix*

*Salix humilis*, angustiore, oblongo folio. Haarweide mit  
schmalen, länglichten Blättern. Loef. Fl. Bor. p. 239.  
In der Sarkau. Auf den Löwenhagenschen Wiesen.

1170.

*Salix foliis integerrimis, ovatis; subtus villosis, nitidis.* Linn.  
Sp. Pl. p. 1020.

*Salix oblongo Salviae folio.* Loef. Fl. Bor. p. 239.  
Passim.

1171.

*Salix foliis integerrimis, glabris, ovatis, obtusis.* Linn. Sp.  
Plant. p. 1018.

*Salix rubra obtuso, latiore folio.* Loef. Fl. Bor. p. 239.  
In riguis in der Hollengrund.

POPULVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 909. Gouan. H. R. M. p. 306.*

1172.

*Populus foliis subrotundis, dentato-angulatis, subtus tomen-*  
*tosis.* Linn. Sp. Pl. p. 1034.

*Populus alba, majoribus foliis.* C. B. P. p. 429.

*Populus alba.* Matth. deutsch. p. 40.

Weisse Pappeln. Wulff. Spec. Inaug. p. 16.

Germinat circa sepem copiose et quidem sine cultura in pago  
Lewiten im Uderwangischen Kirchspiel.

1173.

*Populus foliis subrotundis, dentato-angulatis, utrimque gla-*  
*bris.* Linn. Sp. Pl. p. 1034.

*Populus tremula.* C. B. P. p. 429.

Aspen oder Espen. Loef. Fl. Bor. p. 205.

In sylvis passim.

1174.

*Populus foliis deltoidibus, acuminatis, serratis.* Linn. Spec.  
Pl. p. 1034.

*Populus nigra.* C. B. P. p. 429.

Schwarzer Pappelbaum. Loef. Fl. Bor. p. 204.

In pagis passim.

QUERCYS.

## Q U E R C U S.

*Linn. Gen. Pl. nr. 872. Gouan H. R. M. p. 490.*

1175.

*Quercus* foliis deciduis, oblongis, superne latioribus; sinu-  
bus acutioribus; angulis obrufis. *Linn. Sp. Pl. p. 996.*

*Quercus* cum longo pediculo. *C. B. P. p. 420.*

*Quercus*. *Kyp. in Trag. p. 1102.*

Eichenbaum. *Loef. Fl. Bor. p. 211.*

In sylvis.

## F A G U S.

*Linn. Gen. Pl. nr. 874. Gouan H. R. M. p. 492.*

1176.

*Fagus* foliis ovatis, obsolete serratis. *Linn. Sp. Pl. p. 998*

*Fagus*. *C. B. P. p. 419.*

Büche. Nothor Büchenbaum. *Loef. Fl. Bor. p. 72.*

Im Oberlande copiose.

1177.

*Fagus* foliis lanceolatis, acuminato-serratis, subtus nudis.

*Linn. Sp. Pl. p. 997.*

*Castanea sylvestris*. *C. B. P. p. 419.*

*Castanea equina*. *Cam. Ep. p. 118. Kram, El. Veg. Austr.*

*p. 276.*

Roß-Castanien.

Habitat ad sepes hortorum et ambulacra.

## C A R P I N U S.

*Linn. Gen. Plant. nr. 876. Gouan H. R. M. p. 492.*

1178.

*Carpinus* squamis strobilorum planis. *Linn. Spec. Plant.*

*p. 998.*

*Ostrya ulmo* similis fructu in umbilicis foliaceis. *C. B. P.*

*p. 427.*

Häubüchen. Hännbüchen. *Loef. Fl. Bor. p. 188.*

Copiose in sylvis.

CORYLVS.

CORYLVUS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 875. Gouan H. R. M. p. 493.*

1179.

*Corylus stipulis ovatis obtusis. Linn. Sp. Pl. p. 998.*

*Corylus sylvestris. C. B. P. p. 418.*

*Haselstrauch. Loef. Fl. Bor. p. 55.*

In sylvis fere ubique imprimis montosis.

BETULA.

*Linn. Gen. Pl. nr. 856. Gouan. H. R. M. p. 423.*

1180.

*Betula foliis ovatis, acuminatis, ferratis. Linn. Sp. Plant. p. 982.*

*Betula. C. B. P. p. 427.*

*Gemeine Birke. Loef. Fl. Bor. p. 25.*

Passim.

1181.

*Betula pendulis virgulis. Hangelbirch. Loef. Fl. Bor. p. 26.*  
Zu Gladau auf dem Berge.

1182.

*Betula Pumila. Ioh. Loefel. Kleine niedrige Birke. Loef. Fl. Bor. p. 27.*

*Im Gebrüch bey Lautenmühl.*

*Betula foliis orbiculatis crenatis. Linn. Amoen. Acad. p. 1. Tab. 1.*

*Gmel. Sibir. 1. p. 170.*

*Linn. Fl. Suec. nr. 777.*

1183.

*Betula pedunculis ramosis. Linn. Sp. Pl. p. 983.*

*Alnus rotundifolia, glutinosa, viridis. C. B. P. p. 428.*

*Ehrenbaum. Loef. Fl. Bor. p. 10.*

In sylvis uliginosis.

1184.

*Betula seu*

*Alnus folio incano. C. B. P. p. 428.*

R

Weisse

Weisse Erlen. Wulff. Spec. Inaug. p. 6.  
Inter Tilsam et Piktupoenen in uliginosis.

# TRICOCCAE.

## EUPHORBIA.

*Linn. Gen. Pl. no. 517. Gouan H. R. M. p. 230.*

**E**uphorbia umbella quinquefida; trifida: dichotoma, involucellis obouatis, foliis cunei formibus, ferratis. Linn. Spec. Pl. p. 459.

Tithymalus helioscopius. C. B. P. p. 291.

Wolfs-Milch. Loef. Fl. Bor. p. 269.

In agris stercoratis passim.

## MERCVRIALIS.

*Linn. Gen. Pl. no. 916. Gouan. H. R. M. p. 506.*

1186.

Mercurialis caule brachiato, foliis glabris. Linn. Sp. Plant. p. 1035.

Mercurialis montana spicata. C. B. P. p. 122.

Cynocrambe foemina. Bauh. in Matth. p. 111.

Wild Bingel-Kraut, Weiblein. Loef. Fl. Bor. p. 163.

Im Sarlauschen Gebirge in opacis copiose.

1187.

Mercurialis caule brachiato, foliis glabris. Linn. Sp. Plant. p. 1035.

Mercurialis spicata siue foemina. C. B. P. p. 162. Dod. Pempt. p. 658.

Mercurius-Kraut. Kuh-Kraut oder Scheiß-Kraut. Loef. Fl. Bor. p. 162.

Ad hortorum sepes.

CONIFE-



## C O N I F E R A E.

## T A X U S.

*Linn. Gen. Pl. nr. 918. Gouan. H. R. M. p. 510.*

1188.

**T**axus foliis approximatis. Linn. Sp. Plant. p. 1040.  
Taxus. C. B. Pin. p. 505. Tourn. Inst. p. 589. Matth.  
deutsch. p. 474.  
Eichenbaum. Loef. Fl. Bor. p. 266.  
In sylvis passim.

## I U N I P E R V S.

*Linn. Gen. Pl. nr. 617. Gouan. H. R. M. p. 509.*

1189.

Iuniperus foliis ternis, patentibus, mucronatis. Linn. Spec.  
Plant. p. 1040.  
Iuniperus vulgaris fruticosa. C. B. P. p. 488.  
Wacholder oder Kattich; Baum. Loef. Fl. Bor. p. 131.  
Passim.

1190.

Iuniperus vulgaris arbor, C. B. P. p. 488.  
Loef. Fl. Bor. p. 132.  
In districtu Insterburgensi im Cumetschen.

## P I N U S.

*Linn. Gen. Pl. nr. 829. Gouan. H. R. M. p. 494.*

1191.

Pinus foliis geminis, primordialibus, solitariis, glabris. Linn.  
Spec. Pl. p. 1000.  
Pinus sylvestris. C. B. P. p. 491. Tourn. Inst. p. 584.  
Fichtenbaum. Loef. Fl. Bor. p. 196.  
Totae sylvae passim.

1192.

Pinus foliis subulatis, mucronatis, laeuibus, bifariam versis.  
Linn. Sp. Pl. p. 1002.

R 2

Abies

*Abies alba* seu *foemina*. C. B. P. p. 505.

Tanne. Loef. Fl. Bor. p. 1.

Totae sylvae.

1193.

*Pinus foliis fasciculatis, obtusis.* Linnaei. Spec. Plant.  
p. 1001.

*Abies folijs fasciculatis, latis obtusis.* Gmel. Sibir. Tom. 1.  
p. 176.

*Larix.* C. B. P. p. 493. Dod. Pempt. p. 688. Cam. Ep.  
p. 45. 46.

Leichen-Baum. Matth. deutsch. p.

Haec Alpina arbor in horto famigeratissimi, dum viveret, Hortulani Dn. Krottendorffi, lacte crescit, simulac semina, conis inclusa, matura profert. Hinc non dubito, hanc Exoticam arborem, si statione silvis in nostris transplantetur colereturque, tractu temporis omnino inquilinam fieri posse.



## A D D E N D A.

### C A R D U V S.

Linn. Gen. Pl. nr. 763. Gouan. H. R. M. p. 471.

1194.

Add. post nr. 481.

**C**arduus foliis amplexicaulibus, hastato-pinnatifidis, spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis, duplicato spinosis. Linn. Spec. Pl. p. 823.

*Carduus albis maculis notatus vulgaris.* C. B. P. p. 261.

*Carduus Mariae.* Tragi. Seb. in Trag. p.

Behe: Distel. Marien: Distel. Helw. Fl. Quasim. p. 28.

Ad sepes hortorum.

CARTHA-



Caulis cum siliquis se-  
 minibus repens Filicis  
 Angio-spermae seu Po-  
 lypodii fronde bipinnatae.  
 ad Nr. 260.



J. L. Kersel ad viv. depinxit 1761.





CARTHAMVS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 765. Gouan. H. R. M. p. 427.*

1195.

*Add. post nr. 503.*

*Carthamus foliis ouatis, integris, ferrato-aculeatis. Linn.*

*Sp. Pl. p. 830.*

*Cnicus satiuus, seu Carthamus Officinarum. C. B. P. p. 378.*

*Cnicus vulgaris. Clus. H. R. l. 2. p. 152.*

*Helw. Fl. Quasim. p. 29.*

*Wilber Safran.*

*In hortis rusticis.*

ASTER.

*Linn. Gen. Plant. nr. 787. Gouan. H. R. M. p. 441.*

1196.

*Add. post nr. 523.*

*Aster foliis lanceolatis, obtusis, scabris, trineruis, integris, pedunculis nudiusculis, corymbosis; squamis calycinis obtusis. Linn. Sp. Pl. p. 873.*

*Aster Atticus coeruleus vulgaris. C. B. P. p. 267.*

*Aster Atticus. Dod. Pempt. p. 266.*

*Amellus. Linn. Ger. Fl. Gallo-Prov. p. 199.*

*Aster VIII. Itolorum Fuchsi. Clus. Hist. Rar. l. 2. p. 16.*

*Blau Stern-Kraut. Helw. Fl. Quasim. p. 25.*

*Copiose in monte Grodzisko.*

1197.

*Add. post nr. 561.*

*Artemisia rubra maritima. Mentz. Pug. Rar. Plant. Helw.*

*Fl. Quasim. p. 24.*

*Ad littora maris Baltici.*

CALENDULA.

*Linn. Gen. Pl. p. 807. Gouan. H. R. M. p. 462.*

1198.

*Add. post nr. 562.*

*Calendula seminibus radii cymbriiformibus echinatis: disci-*  
*bicor-*

bicornibus. Linn. Spec. Plant. p. 921: Ejusd. Fl. Suec.  
nr. 712.

*Caltha vulgaris*. C. B. P. p. 275.

*Calendula*. Dod. Pempt. p.

*Ringelblumen*. Giffen. Nostratibus Helw. Fl. Quasimod.  
p. 27.

In hortis rusticis spontanea fatione.

1199.

*Add. post. nr. 615.*

*Phellandrium* seu

*Cicutaria Cassubica*, *Thysselini foliis*. Breyn. Prodr. 1.

Helw. Fl. Quasim. p. 29.

In pratis am *Stulisch*en Seechen bey *Ungerburg*.

1200.

*Add. post. nr. 643.*

*Thymus floribus capitatis*, *caulibus repentibus foliis planis*, *obtusis*, *basi ciliatis*. Linn. Sp. Pl. p. 591.

*Serpillum foliis citri odore*. C. B. P. p. 220.

*Serpillum alterum citratum*. Matth. deutsch. p.

Nach Citronen riechender Feld: Kummel. Helw. Fl. Quasimod.  
p. 46.

In arenosis.

## MELITTIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 575. Gouan. H. R. M. p. 293.*

1201.

*Add. post. nr. 652.*

*Melittis*. Linn. Sp. Pl. p. 597.

*Lamium montanum melissae folio*. C. B. P. p. 231.

*Melissa*. Fuchf. Cam. Hort. p. 199.

*Lamium Pannonicum*. I. Clusf. H. R. Lib. 1. p. 37.

*Melissophyllum*. Fuchf. Hist. p.

*Melissa humilis latifolia maximo flore versicolore*. Niedrige  
breitblät:

breitblättrige Melisse. Helw. Suppl. Fl. Boruss. p. 47.  
nro. 277.

Prope Iohannisburgum im Weiffen.

1202.

Add. post nr. 684.

Teucrium seu

Chamaedrys spuria, minor, latifolia. C. B. P. p. 249.

Chamaedrys flore laete incarnato. Roth blühend Susanne  
fen: Kraut. Helw. Fl. Quasim. p. 29.

In monte Grodzisko.

1203.

Add. post nr. 683.

Polygala minor, foliis circa radicem rotundiusculis. Helw.  
Fl. Quasim. p. 40. Ibi Planta figura naturali et nitide  
expressa est.

Auf dem Schloßberge Grodzisko.

## NICOTIANA.

Linn. Gen. Pl. nr. 179. Götting. H. R. M. p. 107.

1204.

Add. post. nr. 775.

Nicotiana foliis lanceolatis. Linn. Sp. Pl. p. 180.

Nicotiana major latifolia. C. B. P. p. 169.

Hyoscyamus Peruvianus. Dod. Pempt. p.

Nicotiana major, seu Tabacum majus. I. B. H. Helw. Fl.  
Quasim. p. 38.

Toti campi praesertim Litwaniae Borussiae luxuriant hac  
Planta.

1205.

Nicotiana foliis ovatis. Linn. Sp. Pl. p. 180.

Nicotiana minor. C. B. P. p. 170.

Pryapeia quibusdam, Nicotiana minor. I. B. H. Helw. Fl.  
Quasim. p. 38.

Spontanea satione planta pullulat.

R 4

ISATIS.

## ADDENDA.

## ISATIS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 668. Gouan. H. R. M. p. 335.*

1206.

*Add. ante nr. 816.*

*Isatis foliis radicalibus crenatis; caulinis sagittatis, filiculis oblongis. Linn. Spec. Plant. p. 670.*

*Ej. Fl. Suec. nr. 543.*

*Isatis fatiua vel latifolia. C. B. P. p. 113.*

*Isatis domestica seu Glastum. Matth. deutsch. p.*

*Wend. Helw. Fl. Quasim. p. 35.*

*In agris prope Memelam.*

## BUNIAS.

*Linn. Gen. Pl. nr. 655. Gouan. H. R. M. p. 334.*

1207.

*Bunias filiculis ouatis, laeuibus, ancipitibus. Linn. Sp. Pl. p. 670.*

*Eruca maritima Italica filiqua hastae cuspidi simili. C. B. P. p. 99.*

*Raphanus filiquis ouatis, angulatis, monospermis. Linn. Fl. Suec. nr. 569.*

*Cakile Serapionis. Cam. Hort. p. 32.*

*Tourn. Inst. p. 212. Ej. Coroll. p. 49.*

*Meer: Kresse. Loef. Fl. Bor. p. 68.*

*Ad littus maris passim, in specie bey Kunzen.*

1208.

*Add. post nr. 891.*

*Caltha palustris, flore pleno. Linn. Sp. Pl. p. 558. C. B. P. p. 276.*

*Wolfe Gold: Wiesen: oder Kuh: Blumen. Helw. Fl. Quas. p. 27.*

*In pratis der Damerau.*

1209.

*Add. post. nr. 919.*

*Cistus suffruticosus extipulatus procumbens, foliis oppositis,*

posiis, villosis, subrus tomentosis. Linn. Spec. Plant.  
p. 525.

Chamaecistus foliis mirti minoris incanis, C. B. P. p. 466.

Helianthemum. I. Tab. Lib. III. p. 151.

Chamaecistus. III. Clus. H. R. L. 1. p. 74.

Helianthemum caulibus et foliis incanis, oblongis, floribus  
albis. Helw. Fl. Quasim. p. 34.

Auf dem Schloß: Berge Grodzisko.

1210.

*Add. post nr. 1006.*

Erica vulgaris, glabra, flore albo. C. B. P. p. 485.

Weißblühendes Heide: Kraut. Helw. Fl. Quasim. p. 31.

In ericetis.

1211.

Erica vulgaris glabra, flore incarnato. Helw. Fl. Quasim.

p. 31.

In der Ogonschen Heide.

1212.

Erica tenuifolia, nunquam florens. Helw. Fl. Quasim. p. 31.

In der Ogonschen Heide.

1213.

*Add. post nr. 1022.*

Rumex seu

Acetosa palustris flore et caule ruberrimo. Ganz rother

Bruch: Sauramp. Helw. Fl. Quasim. p. 1.

Im rothen Bruch bey Angerburg. In pratis turfosis passim.

An Acetosa minima tota rubra? Mentz. Pug. Rar.

1214.

*Add. post nr. 1058.*

Polemonium calycibus corolla rubo longioribus. Linn. Sp.

Plant. p. 162. Ejusd. Fl. Suec. nr. 162.

Valeriana Graeca flore albo. Eystettenf. C. B. P. p. 164.

Weißer griechischer Baldrian. Helw. Fl. Quasim. p. 48.

Am Stadt: Walde zu Angerburg.

R 5

1215.

1215.

*Add. post. nr. 1083.***Rubus idaeus fructu albo.** Linn. Sp. Pl. p. 493.**Rubus idaeus fructu albo.** C. B. P. p. 499.**Weisse Hind-Beeren.** Helw. Fl. Quasim. p. 45.**In sylva Regia Angerburgensi.**

1216.

*Add. post. nr. 1131.***Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ouatis, compressis, dorso bimarginatis.** Linn. Sp. Pl. p. 730.**Lathyrus sativus, flore fructuque albo.** C. B. P. p. 343.**Pisum graecorum sativum.** Tragi. Seb. in Tragi. p.**Weisse Kichern, oder Vogels Wicken.** Helw. Fl. Quasim. p. 35.**Italienische Erbsen, quibusdam.****Im Trampischen Kirchspiel bey Romaren inter arenam crescit, lento pinguique agro.**

1217.

*Add. post. nr. 1114.***Astragalus perennis, spicatus, floribus pallidis, nigris radiis notatis Morisonii.** Helw. Fl. Quasim. p. 25.**Onobrychis spicata, floribus pallidis, nigris radiis notatis.** C. B. P. p. 352.**Onobrychis.** III. Clus. H. R. p. 239,**Ben Eckersberg im Reinschen Amte in monte Grodzisko copiose.**

1218.

*Add. post. nr. 1137.***Ervum (Lens) seminibus compressis, conuexis.** Linn. Sp. Pl. p. 738.**Lens vulgaris.** C. B. P. p. 346.**Lens.** Dod. Pempr. p. 526.**Gemeine Linsen.** Helw. Fl. Quasim. p. 36.**In agris passim seritur.**

1219.

1219.

*Add. post nr. 1111.*

Malua foliis angulatis, crispis, floribus axillaribus, glomera-  
tis. Linn. Spec. Pl. p. 689.

Malua foliis crispis. C. B. P. p. 315.

Malua crispa. Dod. Pempt. p. 653.

Helw. Fl. Quasim. p. 36.

Ad Sepes hortorum im Ungerburgschen zu Paulswalde.

FINIS.



INDEX.



# INDEX

non paginas sed numeros Plan-  
tarum indicat.

## A

<b>A</b> bies.	1192.	923-928. 934. 961-963.
Abrotanum.	557.	1068. 1069.
Abinthium.	559.	1114.
Acanthium.	482.	824.
Acer.	1015.	658.
Acetosa.	1213. 1021. 1022.	Amanita.
Acetofella.	987. 1021.	55. 108. 111.
Achillaea.	504-506.	Diui Georgii.
Aconitum.	854. 914-916.	115.
Acorus.	430. 433.	minima muscosa.
Actaea.	854.	97.
Adiantum.	241.	Amaranthus.
Adoxa.	889.	813. 814.
Aegopodium.	631.	Ambrosia.
Aethusa.	614.	557.
Agaracus.	16.	Amellus.
Agaricus.	30. 54. et seqq.	1196.
Agrimonia.	1075. 1076.	Amourettes tremblantes.
Agrostemma.	919.	303.
Agrostis.	284-286.	Anacampseros.
Aira.	294. 295.	958.
Arjuga.	677-680.	Anagallis.
Album olus.	565.	758. 784. 788.
Alcea.	1111. 1112.	aquatica.
Alchymillae.	1074.	1057.
Alectorolophus.	689.	palustris.
Alga.	142. 383.	916.
Alisma.	418. 419.	Anchusa.
Alliaria.	840.	726-729.
Allium.	437-440.	Androsaces.
Alnus.	1183. 1184.	442.
nigra baccifera.	1073.	Anemone.
Alœ palustris.	918.	872-888.
Alopecurus.	277-279.	Anethum.
Alsinē.	754. 791-793. 794.	624.
		Angelica.
		611-613. 631.
		Anisum.
		638.
		Anonis.
		1117. 1118.
		Anthemis.
		537-540.
		Anthericum.
		441.
		Anthoxanthum.
		274. 275.
		Anthyllis.
		707-711.
		Aparine.
		595. 597. 599. 740.
		Apium.
		506. 605.
		Anisum.
		630.
		Aquilegia.
		917.
		Arabis.
		845.
		Archangelica.
		611.
		Arctium.
		477. 478.
		Arenaria.
		923-928.
		Aristolochia.
		713.
		Aron.
		382.
		Artemisia.
		508. 557-561. 1197.
		Arundo.

# INDEX.

Arundo.	335-337.	Buglossum.	727-729. 740.
Asarum.	409.	Bugala.	677-680.
Asclepias.	796.	Bulbus agrestis.	436.
Asparagus.	1217. 410.	Bunias.	1207.
Asperugo.	740.	Buphthalmum.	532. 546.
Asperula.	593.	Bursa pastoris.	799. 818. 1169.
Aster atticus.	1196. 529.	Butomus.	420.
luteus.	527.	Byssus.	4. 6 9-16.
montanus.	526.		
palustris.	525.		
Astragalus.	1122-1124.		
Astrantia.	622.		
Athamantia.	605.		
Atriplex.	798-801.		
Auena.	315-319.		
Auricula muris.	461.		

## B

Ballota.	652.	Cakile.	1207.
Balsamina.	716.	Calamagrostis.	420.
Barba caprae.	1078.	Calamintha.	667.
Bardana Officinarum.	471.	Calceolus Mariae.	407.
Batata.	485.	Calendula.	1198.
Bellis.	530-535.	Calla.	382.
Sylvestris.	524.	Callitriche.	369. 370.
Berberis.	857.	Caltha.	890. 891. 1198. 1208.
Berula.	784.	Camomilla.	537.
Betonica.	668-671.	Campanula.	701. 1032-1050.
Betula.	1180.	Sylvestris.	700.
Bidens.	541. 542.	Cannabina.	541. 542.
Bifolium.	397.	Cannabis.	1157.
Bistorta.	999. 1023.	Caput monachi.	450.
Blattaria.	767.	Cardamine.	827. 828.
Blitum.	802. 813.	Cardiaca.	650.
Boletus.	37. 45.	Carduus.	479-481. 1194.
Bonus Henricus.	797.	fullonum.	584.
Brassica.	846. 847.	Carex.	339-354.
Bromus.	310-314.	Carlina.	483. 484.
Briza.	303-306.	Carui.	614.
Brunella.	606.	Carum.	626.
Bryonia.	417.	Carthamus.	1195.
Bryum.	225.	Carpinus.	1178.
		Caryophyllata.	971. 977.
		Caryophyllus.	814. 929. 930.
		933. 935. 936-938. 944. 950.	
		Cassida palustris.	638.
		Castanea.	1177.
		Cataria.	673.
		Centaurea.	486-503.
		Centaureum.	756. 758.
		Centun-	

# INDEX.

<i>Centunculus.</i>	792. 934.	<i>Consolida.</i>	676. 677-739. 913.
<i>Cerastium.</i>	929-933.	<i>Conuoluulus.</i>	775. 776. 1038.
<i>Cerasus</i>	1102. 1104.	<i>Conuallaria.</i>	411-416.
<i>Ceratophyllum.</i>	266.	<i>Conyza.</i>	525. 529. 542. 563.
<i>Chamaecerasus.</i>	591.	<i>Coralloides.</i>	170.
<i>Chamaecistus.</i>	1209. 664.	<i>Coriandrum.</i>	616.
	919.	<i>Cornus.</i>	587.
<i>Chamaecyparissus.</i>	249.	<i>Coronilla.</i>	1132. 1133.
<i>Chamaedrys.</i>	1202. 681. 789.	<i>Corylus.</i>	1172.
<i>Chamaeleon.</i>	483.	<i>Cotula.</i>	538. 539.
<i>Chamaelinum.</i>	966.	<i>Crataegus.</i>	1105.
<i>Chamaemelum.</i>	537-539.	<i>Crepis.</i>	470. 471.
<i>Chamaenerion.</i>	1036. 1042.	<i>Crista galli.</i>	694.
<i>Chamaemorus.</i>	1086.	<i>Crucianella.</i>	599.
<i>Chamaepyris.</i>	644. 671. 1173.	<i>Cruciata.</i>	595. 598.
<i>Chamaerubus.</i>	1085. 1086.	<i>Crus galli.</i>	876.
<i>Chaerophyllum.</i>	619-621.	<i>Cucubalus.</i>	946. 947.
<i>Champignon.</i>	111-114.	<i>Cuscuta.</i>	442.
<i>Chara.</i>	164.	<i>Cyanus.</i>	488. 493.
<i>Cheiranthus.</i>	842.	<i>Cymbalaria.</i>	711.
<i>Chelidonia.</i>	99. 713. 831.	<i>Cynocrambe.</i>	1186.
<i>Chenopodium.</i>	797-803.	<i>Cynoglossum.</i>	730-733.
<i>Christophoriana.</i>	854.	minus.	721.
<i>Chrysanthemum.</i>	532-535.	<i>Cynosbatus.</i>	334.
<i>Chrysosplenium.</i>	970.	<i>Cyperus.</i>	348-353. 360. 361.
<i>Cichorium.</i>	475. 476.	<i>Cypripedium.</i>	407.
<i>Cicuta.</i>	604.		
minor.	614.		
<i>Cicutaria.</i>	615. 618. 619. 621.		
	1199.		
<i>Circaea.</i>	1059. 1060.	<b>D</b>	
<i>Cirsim.</i>	480. 481.	<i>Dactylis.</i>	306.
<i>Cistus.</i>	919. 1209.	<i>Daphne.</i>	1016.
Ledon.	1013. 1014.	<i>Daphnoides.</i>	1016.
<i>Clathrus.</i>	37.	<i>Datura.</i>	770.
<i>Clauaria.</i>	30-36.	<i>Daucus.</i>	602. 603.
<i>Clematis.</i>	795.	<i>Delphinium.</i>	913. 914.
<i>Clinopodium.</i>	648. 649.	<i>Dens Leonis.</i>	450-453.
<i>Cnicus.</i>	484. 1195.	<i>Dentaria.</i>	826.
<i>Cochlearia.</i>	822. 823.	<i>Dianthus.</i>	938-944.
<i>Comarum.</i>	1101.	<i>Digitalis.</i>	700.
<i>Conferua.</i>	142.	<i>Diplacus.</i>	584.
<i>Conium.</i>	604.	<i>Draba.</i>	818.
<i>Connina.</i>	782.	<i>Dracocephalum.</i>	614.
		<i>Dracunculus.</i>	388.
			Drofe.

# INDEX.

Drosera.  
Dulcamara.

768. 769.  
772.

## E

**E**chium. 717-720. 741-745.  
Elaphoboscum. 623.  
Elichrysium. 544 553.  
Elleborine. 398.  
Eluella. 29. 38. 148.  
Elymus. 312.  
Enula Campana. 524.  
Epilobium. 1061-1067.  
Equisetum. 265. 266.  
foetidum. 194.  
granulosum. 195.

Erica. 1211. 1212. 1006.  
Ericoides. 696.  
Erigerum. 529.  
Erinaceus. 43.  
Eriophorum. 355. 356.  
Eruca. 830. 831. 834. 835. 839.  
1207.

Ervum. 1218. 1137.  
Eryngium. 600.  
Erysimum. 830-838. 811. 1029.  
1075.

Eupatorium. 511. 512.  
Euonymus. 1070. 1071.  
Euphorbia. 1185.  
Euphrasia. 698. 699.

## F

**F**agopyrum. 1029.  
Fagus. 1150. 1176. 1177.  
Festuca. 307-310. 313.  
Filago. 555. 556.  
Filicula. 255. 256.  
Filipendia. 1077.  
Filipendula. 1077.  
Filix. 255-257.  
angio sperma. 261.

Flammula. 870.  
Flos cuculli. 926.  
Trinitatis. 839.  
Foeniculum aquaticum. 712.  
Officinatum. 625.  
Fontinalis. 243.  
Fragaria. 1098. 1099.  
Fraxinus. 778.  
Frumentum faracenicum. 1029.  
Fucus. 149. 150.  
Fumaria. 713-715.  
Fumus terrae. 715.  
Fungus. 18. 20. 22. 24. 25.  
30-37.  
Fungoides. 26. 27. 29-31.

## G

**G**alium. 594-597.  
Gallium. 586.  
Galeopsis. 654. 658-663.  
Genista. 1115. 1116.  
Gentiana. 337. 755-762.  
Geranium. 985. 1000.  
Geum. 971-977.  
Gladiolus. 420. 432.  
Glaux. 794. 1068.  
Glecoma. 664. 1043.  
Glyzorrhiza. 1122.  
Gnaphalium. 543-556.  
Gramen alopecuroides. 275.  
aquaticum. 295. 289.  
arundinaceum. 294-296.  
397.  
aenaceum. 296. 297.  
310-313.  
bulbosum aquaticum. 272.  
caninum. 286. 322. 325.  
326.  
caryophyllatum. 342.  
cristatum. 309. 330.  
cyperinum. 348.  
cyperoides. 339-341. 353.  
Gramen

# INDEX.

<b>Gramen dactylon.</b>	287.	<b>Hepatica.</b>	872.
fluviatile album.	276.	alba.	986.
hordeaceum.	333.	arborea.	193.
juncum.	380. 381. 423.	palustris.	178.
	426.	saxatilis.	178.
leporinum.	303. 320. 321.	<b>Hepatioides.</b>	183.
lioliaceum.	303. 322.	<b>Heraclea.</b>	641.
minimum.	274. 303.	<b>Heracleum.</b>	610. 654.
<b>Mannae.</b>	291.	<b>Herba Gerardi.</b>	631.
<b>Mariae.</b>	338.	St. Iacobi.	517.
marinum.	326.	Paris.	422.
miliaceum.	287.	Trinitatis.	863.
montanum.	274. 297.	<b>Herbula muscosa.</b>	14.
Officinarum.	325.	<b>Herniaria.</b>	812.
palustre.	295.	<b>Hesperis.</b>	843.
paniceum.	286. 291.	<b>Hieracium.</b>	460 464. 470-474.
paniculatum.	279. 281.	<b>Hippophae.</b>	1031.
	305. 338.	<b>Hippuris.</b>	265.
<b>Parnassi.</b>	986.	<b>Hirundinaria.</b>	796.
pratense.	299-302.	<b>Holcus.</b>	333-338.
secalinum.	333.	<b>Holosteum.</b>	929.
segetale paniculatum.	284.	<b>Hordeum.</b>	331. 333.
sparteum juncifolium.	276.	<b>Horminum.</b>	634. 635.
spicatum aruense.	334.	<b>Hottonia.</b>	243.
	336.	<b>Humulus.</b>	1158. 1159.
sylvaticum.	287. 427.	<b>Hydnum.</b>	43.
tremulum.	303-305.	<b>Hydropiper.</b>	1024.
typhoides.	277. 279. 283.	<b>Hyoscyamus.</b>	772. 1204. 1205.
<b>Grossularia.</b>	987-981.	<b>Hypericum.</b>	920. 921.
<b>Gypsophylla.</b>	396. 397.	<b>Hypnum.</b>	210.
		<b>Hypochaeris.</b>	472-474.
		<b>Hyssopus.</b>	644. 674-676. 919.

## H

<b>Halimus.</b>	591.
<b>Hedera.</b>	1012.
helix.	988.
terrestris.	664.
<b>Hederula palustris.</b>	363.
<b>Helenium.</b>	524.
<b>Helianthemum.</b>	895. 1178.
<b>Helianthus.</b>	485. 919.
<b>Helleborine.</b>	401-406. 407.
<b>Helleborus.</b>	910.

## I

<b>Iacea.</b>	486. 487. 496-502.
<b>Iacobaea.</b>	517-521.
<b>Iasione.</b>	1052-1056.
<b>Iberis.</b>	825.
<b>Ibiscus.</b>	1114.
<b>Illecebra.</b>	983.
<b>Impatiens.</b>	716.
<b>Imperatoria.</b>	611. 612. 622.
<b>Impia.</b>	

# INDEX.

Impia Plinii. 555.  
 Inula. 524-527.  
 Intabus. 469.  
 Ioolithus. 14.  
 Iris. 429-431.  
 Isatis. 1206.  
 Ischaemum. 289.  
 Isopyrum. 912.  
 Iuncago. 380.  
 Iuncellus. 357. 358.  
 Iuncus. 358. 359. 387. 420.  
 λυχνανθημος. 294.  
 Iungermannia. 183.  
 Iuniperus. 1189. 1190.

## K

Kali. 803. 804.  
 Kofzelarke. 45.

## L

Lagopodium. 777.  
 Lagopus. 543. 1142.  
 Lamium. 654-657. 659. 660.  
 1201.  
 Lampfana. 447. 848.  
 Lapathum. 797. 1017-1020.  
 Lappa. 477. 478. 562.  
 Lapis violaceus. 14.  
 Lapsana. 453.  
 Larix. 1193.  
 Laserpitium. 606-609.  
 Lathraea. 704.  
 Lathyrus. 1129-1131. 1216.  
 Laureola. 1016.  
 Ledum. 1013. 1014.  
 Lemma. 367. 368.  
 Lens. 1218.  
 Lens palustris. 367. 368.  
 Lenticula. 367. 368. 370.

Leonida Herba. 702.  
 Leontodon. 455-459.  
 Leonurus. 650.  
 Lepidium. 825.  
 Levcanthemum. 534.  
 Levcojum. 842.  
 Libanotis. 606.  
 Lichen. 151.  
 petraeus. 193.  
 pyxidatus. 164.  
 Lichenoides. 161. 162.  
 Ligusticum. 609.  
 Ligustrum. 779.  
 Lilium. 434. 435.  
 conuallium. 411-413.  
 Saracenicum. 428.  
 Lihosella. 754.  
 Linagrostis. 356.  
 Linaria. 797-810.  
 Linnaea. 701.  
 Linum. 964. 966.  
 Lithospermum. 717. 723-726.  
 Lolium. 320. 321.  
 Lonicea. 591.  
 Lora affinis. 777. 1121.  
 Vulneraria pratensis. 1095.  
 Lotus. 1139. 1141.  
 Lunaria. 252. 821.  
 Lupulus. 1158. 1159.  
 Luteola herba. 864.  
 Lychmis. 945-960.  
 Lycoperdon. 18. 24.  
 Lycopodium. 245-249.  
 Lycopus. 632. 633.  
 Lythmachia. 636. 656. 752.  
 1061-1069.  
 Lythrum. 1069.

## M

Magistrantia. 622.  
 Malua. 1109-1113. 1219.  
 Malus. 1108.  
 Marchantia. 179.  
 S. Marru.

# INDEX.

Marrubiastrum. 652.  
 Murrubium. 632. 633. 650-652.  
 Matricaria. 536.  
 Matrisylva. 593.  
 Medica. 1148.  
 Medicago. 1148-1151.  
 Melampyrum. 695-697.  
 Melanthium. 911.  
 Melica. 296. 297.  
 Melilotus. 1138. 1139.  
 Melissa. 650. 1201.  
 Melittis. 1201.  
 Melyssophyllum. 1201.  
 Mentha. 510. 665. 667. 668. 673.  
 Menyanthes. 748. 749.  
 Mercurialis. 1186. 1187.  
 Mespilus. 1105.  
 Millefolium. 267. 505. 506.  
     aquaticum. 265. 712. 884.  
 Millegrana. 966.  
 Milium. 287.  
 Mnium. 237.  
 Mollugo. 597.  
 Monophyllum. 412.  
 Monorchis. 395.  
 Morchella. 40.  
 Morfus diaboli. 568.  
 Mouceron. 102-107.  
 Mucedo. 1.  
 Mucor. 1-8.  
 Muscus. 17.  
     aquaticus. 243.  
     cupressiformis. 172.  
     fugax. 145.  
     pyxioides pilosus. 156.  
 Myagrum. 814. 815. 841.  
 Mylium sylvaticum. 696.  
 Myriophyllum. 266. 267.  
 Myrrhis. 619. 620.  
 Myosotis. 717-724. 929.  
 Myosurus. 892.

## N

Napellus. 892.  
 Nardus. 276.  
 Nasturtium. 827-829. 836.  
 Nepeta. 613.  
 Nicotiana. 1204. 1205.  
 Nidus auium. 396.  
 Nigella. 911.  
 Noli me tangere. 701.  
 Nostoc. 145.  
 Nummularia. 752.  
 Nymphaea. 748. 749. 855. 856.

## O

Oculus bouis. 532.  
 Ocymastrum. 705.  
 Odontides. 696.  
 Onobrychis. 1123. 1217.  
 Ononis. 1117-1120.  
 Onopordum. 476. 482.  
 Ophioglossum. 250. 251.  
 Ophris. 398. 399.  
 Opulus. 585.  
 Orchis. 384. 393. 391. 395. 396. 400.  
 Oreoselinum. 605.  
 Origanum. 645. 646.  
 Ornithogalum. 430.  
 Orobanche. 702-704.  
 Orobus. 1125-1128.  
 Osmunda. 252. 254.  
     regalis. 260.  
 Ostreaulmo similis. 1178.  
 Ostryis. 707.  
 Othonna. 563.  
 Oxalis. 987. 1021. 1022.  
 Oxys. 987.

## P

Palma Christi. 389.  
 Pani.

## INDEX.

**S 2**



# INDEX.

Ribes.	798-981.	Sedum.	982-985.
Riccia.	178.	Selago.	247.
Rorella.	769.	Selinum.	603.
Rosa.	1079-1081.	Sempervivum.	983-985.
Rosmarinum.	1014.	Senecio.	516-523.
Ros Solis.	768. 769.	Serapias.	401-406.
Rubia.	598.	Serpillum.	639-643. 1200.
Rubus.	1082-1086. 1215.	Serratula.	479-481.
Rumex.	1017-1022. 1213.	Seseli.	606.
Ruta Lunaria.	252.	Sideritis.	632. 658. 661. 668.
pratensis.	866. 868.		669.

## S

Sagitta aquatica.	269-272.	Sigillum Salomonis.	415.
Sagittaria.	269-272.	Silene.	448.
Salicaria.	1069.	Siler.	609.
Salix.	1166-1171.	Sinapis.	848. 849.
Saliflora.	769.	Sisymbrium.	829-837. 839. 1177.
Salsofa.	803.	Sium.	507.
Salvia.	624. 635.	Solanifolia.	1054. 1059. 1060.
Sambucus.	588. 589.	Solanum.	772-774.
aquatica.	585. 586.	quadrifolium.	428.
Samolus.	1057.	Solidago.	522. 528.
Sanguiflora.	592.	Soncho affinis Lamprolana.	453.
Sanicula.	601.	Sonchus.	446-452. 454.
Saponaria.	945.	Sophia.	836.
Satureja.	672.	Sorbus.	1106.
Satyrion.	389. 394. 395.	Sparganium.	364-366.
Sabina fyluestris.	249.	Spartum.	274.
Saxifraga.	616. 967-969.	Sphagnum.	244.
Scabiosa.	494. 495. 568. 583.	Spergula.	754. 962. 963. 965.
Scandix.	617. 618.	Spina alba tomentosa.	482.
Scheuchzeria.	381.	Spiraea.	1077. 1078.
Scirpus.	357-359.	Spondillium.	610.
Scleara.	634. 635.	Spongia.	17.
Scordium.	647.	Squamaria.	690.
Scorzonera.	445.	Stachys.	653.
Scrophularia.	705. 706.	Statice.	815.
Scutellaria.	638.	Stellaria aquatica.	365. 935.
Secale.	328-330.	Stramonium.	770.
Securidaca dumetorum.	1132.	Stratiotes.	505. 918.
	1133.	Succisa.	568-570.
		Swertia.	755.
		Symphytum.	677. 754-781.
		maculosum.	719.

## T

# INDEX.

## T

<b>T</b> amus.	417.
Tanacetum.	504. 506.
Taraxacum.	450.
Tatula.	770.
Taxus.	1188.
Telephium.	982.
Tertianaria.	638.
Testiculus muscarius.	388.
vulpinus.	384.
Tetrahit.	668. 669.
Teucrium.	647. 681-684. 783.
	2002.
Thalictrum.	866-871. 912.
Thlaspi.	819. 824. 826.
Thymus.	639-643. 1200.
Tilia.	1001.
Tithymalus.	1185.
Tormentilla.	1100.
Tota bona.	797.
Tragopogon.	443. 444.
Tragoselinum.	627-629.
Tragum.	804.
Trapa.	590.
Tremella.	145.
Tribulus aquaticus.	590.
Tridentalis.	408.
Trifolium.	1138-1148. 1152.
acetosum.	987.
epaticum.	872.
palustre.	749.
Triglochin.	380.
Triticum.	323-327.
Vaccinum.	695.
Trollius.	910.
Turritis.	846.
Tussilago.	513-515.
Typha.	362. 363.

## U V

<b>V</b> accinium.	1003-1005.
Valeriana.	564-567. 1058.
graeca.	1033. 1214.
Verbascum.	746. 763-767.
Verbena.	685. 815.
Veronica.	780-793.
Viburnum.	585.
Vicia.	1129. 1134-1136. 1137.
Victorialis.	432.
Vinca.	775.
Vincetoxicum.	796.
Viola.	858-863.
matronalis.	843.
Virga aurea.	520. 522. 523. 528.
Sanguinea.	587.
Viscum.	204.
Vitis idaea.	1002-1005. 1014.
Ulmus.	1153. 1154.
Volubilis.	775.
Unifolium.	412.
Urtica.	655. 1155. 1156.
Usnea.	173.
Ustilago.	313.
Utricularia.	712.
Uua crispa.	981.
Vulvaria.	801.

## X

<b>X</b> anthium.	562.
Xilosteum.	591.
Xiphion.	432.

## Z

<b>Z</b> ostera.	383.
------------------	------

# Deutsches Register.

## A

Abbiß, Teufels.	568
Acker, Graß.	302. 309. 311
wohlriechendes.	274. 275
Ägglein.	929. 935
	941
Afriemen.	864
Winde.	775
Wur.	433
	917
Agelen.	1015
Alhorn.	524
Alantwur.	432
Allermannharnisch.	910
Alphaneufuß.	704
Anblat.	632. 633. 651. 652
Andorn.	880
Anemonen: Mößlein.	611. 613
Angelick.	630
Aniß.	624. 1061
St. Antonii Kraut.	885
Aprillenblumen.	485
Artschocken.	1173
Aspen.	588
Attich.	698. 699
Augen-Trost.	911
Graß.	

## B

Bachungen.	784. 1057
Baldrian.	564. 566. 1000
	1214
Bartsch.	610
Baum-Epheu.	988
Schwamm.	8. 119. 127
Bauren, Senf.	819
Becher, Schwamm.	25. 29
Beerlap.	248

Bein-Holz.	391. 779
Welle.	72. 722
Benedikten wurzel.	971. 974
Berberissen.	857
Bertram wilder.	504
Berg, Graß.	309
wohlriechendes.	272
Klee.	1145
Lilien.	434
Mosß.	212
Peterlein.	605
Rittersporn.	914
Schnabel-Kraut.	1000
Besem-Kraut.	825
Betonien.	670. 671
Beyfuß.	560. 561
Bibenel.	592. 627. 629
Biber-Klee.	749
Biesent-Kraut.	889
Bilsen-Kraut.	771
Bingel-Kraut.	1186
Binjen.	353. 355. 421
Graß.	350. 381. 418
Binzen.	356. 359
Schwertel.	420
Birke.	1180
Birkling.	87
Reiske.	87
Schwamm.	45
Bitterling.	81
Bladlos.	983
Blätter-Schwamm.	54
Blaubeeren.	1002.
Blau-Wurzel.	627
Blut-Graß.	289
Röselein.	1000
Bod.	31. 62
Bodß, Bart.	31. 443
Beeren.	980
Peterlein.	628
Brackenhaupt.	707
Bratling.	93
Brat.	

# Deutsches Register.

Brat, Pilske.	47
Braunelle.	636
Braunwurz.	705
Brenn, Kraut.	900
Reifel.	1155
Brombeeren.	1082
Bruch, Andorn.	620
Weiden.	1161
Wurzel.	1135, 1136
Brunnschken.	1085
Brunnenkreß.	829
Buche	1175
Büchsenformiger Stein: Moos.	166
Buchweizen.	1029
Winde.	1030

## C

Calmus.	433
Canarien, Gras.	282
Castanien.	1165
braunes Gras.	285
Chamillen Blum.	537
St. Christoffels, Kraut.	834
Corallen, Moß.	170
Schwamm.	31, 36
Coriander, schwarzer.	616, 911
Corinthen, wilde.	278
Cornelbaum.	587
Crenk, Beeren.	1072
Blum.	314
Kraut.	516
wollichtes.	513
Wurz.	761
Cypergras.	339, 341, 346, 348, 352, 360, 361

## D

Degen, Kraut.	364
Deitel, Kolben.	362
Dille.	624

Distel, Haber.	479, 480
weiße Weg.	482
Wiesen.	481
Dorn: Schwamm.	102
Dosten.	645, 646
Dorten.	321
Drespe.	321
Dresblatt.	749
Dreysaltigkeit, Kraut.	863
Durchwachs.	847
Dürrwurz.	525
blaue.	529
Wasser.	541, 542, 563

## E

Eberwurz.	483
Edelleber, Kraut.	872, 876
Ehrenpreis.	781, 782, 789
Eibenbaum.	1188
Eibisch.	1114
Eiche, oder Eichenbaum.	1175
Eichen: Fliegen: Schwamm.	58
Lungen, Kraut.	157
Eichel, Gras.	272
Einblat.	399, 412
Einhöleinwurz.	400
Eisenhart.	685
Eisenhüttlein.	916
Eisen, Kraut.	685, 838
Elen.	1183, 1184
Engelthier: Rosen.	1080
Engelsfuß.	258
Endtenfloß.	368
Engian.	759, 762
Ephen, Baum.	1012
Eppich, Wasser.	500
Erbfen, Italienische.	1216
Erd, Artischoden.	485
Beeren: Kraut.	1098
Moß.	244
Nüsse.	200, 436
Ranch.	714, 715
Erd.	

# Deutsches Register.

Erd- Spinnen- Kraut. 441  
 Erlen. 1183. 1184  
 Ervewürger. 702  
 Eichenbaum. 778  
 Eisen. 1173  
 Eper- Schwamm. 61

## F

Färbe- Kraut. 1089  
 Falten- Schwamm. 38  
 Farren- Kraut. 255. 257  
 Faulbaum. 1073  
 Federmos. 216  
 Feld- Rlee. 1152  
 Kummel. 639. 1200  
 Rosen. 1079  
 Safran. 484  
 Schwamm. 66. 71. 128

Fenchel. 625  
 Fenchgras. 66. 71. 228. 288.  
 289  
 Fichtenbaum. 1191. 1193  
 Fieber- Kraut. 638  
 Filz- Kraut. 442  
 Fingerhut, geeler. 700  
 Flach. 964

Dotter-  
 Kraut. 816  
 707  
 Flederhrehen. 148  
 Fliegen- Blumen. 384  
 Schwamm. 54. 58  
 Stendelwurf. 385. 388

Flöh- Kraut. 1024. 1026  
 Fluß- Hähnlein. 907  
 Frauen- Münz. 510  
 Frisch- Lattich. 374  
 Pfeffer. 897  
 Fuchs- Hddlein. 384  
 Schwanz- Gras. 277  
 281. 283. 290

Fünffinger- Kraut. 1090. 1096

## G

Gänseblum. 532. 535  
 Fuß. 798. 799  
 Galeise. 1090  
 Gauchheil. 753  
 Geiß- Bart. 1078  
 Fuß. 631  
 Rlee. 1142

Genferich. 1087  
 Genst. 1115  
 Fenster 1115  
 Gerste. 331. 333  
 Gesselblumen. 895  
 Gestirntes Leberkraut. 182  
 Gicht- Schwamm. 39  
 Giersch. 631  
 Gilken. 1198  
 Glied- Kraut. 594. 661. 669.  
 946

Glockenblum. 1035. 1036  
 Goldwurf. 435  
 Goldknöpflein. 767  
 Gras, gemeines. 299  
 Grindwurf. 1017. 1020  
 Grünling. 93  
 Guckucks- Blum. 926. 927  
 Gilden, Gänsef. 677. 680  
 Steinbrech. 970  
 Wund- Kraut. 528  
 Guadelreb. 664

## H

Haar- Schimmel. 1. 6. 9. 10.  
 12. 16

Weiden. 1160. 1169  
 Haasen, Gras, bitterades. 300.  
 301

Rlee. 777. 1121. 1144  
 Robl. 446. 452  
 Pappel. 1083  
 Haasen=

# Deutsches Register.

Haafen, Pfölein. 545. 548. 549.  
    1147  
 Haber. 315. 316  
     Brand. 317  
     Distel. 479. 480  
 Habichts, Kraut. 463. 470.  
    474  
 Häubuchen. 1178  
 Händleinwur. 384. 385. 388.  
    389  
 Händling. 31  
 Hahnbutten, 1079  
 Hahnen, Fuß. 893. 907  
     Kopf. 1123  
 Hagendorn. 1105  
 Hals, Kraut. 1032. 1034  
 Hanff. 1157  
 Harn, Kraut. 812  
 Hartheu. 922  
 Hartriegel. 587. 779  
 Hasel, Fliegen-Schwamm. 58  
     Pappel. 1109  
     Strauch. 1179  
     Wurz. 409. 824. 825  
 Hauhechel. 1117. 1119  
 Haufwur. 413. 985  
 Häubüchen. 1178  
 Hederich, Wasser. 833. 848.  
    849  
 Heide. 1006  
     Pflücken. 52  
     Stein-Pflücken. 46  
     Schwamm. 62. 65. 68.  
    70. 76. 78. 79  
     Wop. 920  
 Heidelbeer. 1003  
 Heiden-Nägelein. 910  
     Wop. 919  
 Heidnisch Wundkraut. 522. 523  
 Herbstling. 82  
 Herzgespan. 650  
 Heyblatt. 866  
 Hindbeeren. 1083. 1215  
 Hirsegras. 291. 292

Hirsen, rother 814  
 Hirsch-Brunst. 22. 23  
     Wurz. 603. 606.  
 Hirk, Pastinack. 623  
     Peterlein. 603  
 Hölzken. 1108  
 Hollunder. 588. 589  
     Schwamm. 148  
     Wasser. 585  
 Holzwurz. 713  
 Holz-Nepfel. 1107  
     Schwamm. 46  
 Hopfen. 1158. 1159  
 Huff-Pattich. 513  
 Hünerdarm. 791. 792. 931  
     Augen. 1102  
 Hund, Aug. 539  
     Gras. 284. 322  
     Peterlein. 614  
     Reben. 614  
     Romey. 538  
     Zungen. 730



St. Jacobs, Kraut. 517  
 Je länger je lieber. 772  
 Igels, Knospen. 365. 366  
     Läuse. 554  
 Johannis, Beeren. 979. 980  
     Kraut. 920  
 Wop. 674  
 Judas, Schwamm. 148  
 Jungfer, Gras. 812  
     Tritt. 1000  
 Jungfrau, Haar. 241  
     Tritt. 1027  
     verfluchte 1027



Raps, Schwamm. 81  
 Rälber.

# Deutsches Register.

**M**äuse, Gerst. 333. 868  
Mäuse.

# Deutsches Register.

Mäuse, Oehrlein.	460. 462	Motten-Blum.	544. 767.
Zagel.	717. 722. 893	Mücken-Schwamm.	54
Mapen, Blümlein.	411	Münze. Korn.	667
Blätter.	1180	Krause,	652
Marien, Distel.	1194	wilde.	666
Gras.	334	Mürseman.	247
Münz.	510	Mumlen.	855. 856
Nessel.	673	Mutter, Kraut.	356
Nößlein.	952. 957.		
	959. 960		

## Schulein.

Moglieben.	407
Mater.	530
Meedesüß.	536
Meelbaum.	1078
Meer, Eich mit Blasen.	1105
Gras.	149
	150. 336. 814.
	1181

Hirsen.	725
Kresse.	1207
Manns, Irene.	600
Nägelein.	814
Nettig.	823
Stachel, Kraut.	803. 804

Meistertwurz.	622
Meliloten.	5138. 1139
Meisse, wilde.	668. 1201
Mercurius, Kraut.	1187
Meyer, Kraut.	589
rother.	753
wilber.	801
Milch, Blume.	686. 687
Glöcklein.	1022

Mispel.	204
Miß-Schwamm.	67. 99. 122
Modelgeer.	759
Möhren, Esels,	602. 613
wilde.	602. 622

Mohn.	852. 853
Kraute.	252. 253
Morcheln.	40. 42
Mos, Beeren.	1005
Flechten.	179
Schwamm.	102

## N

Nachschatten.	773
Näglein-Gras.	342. 920
Narden-Saamen.	911
Narren-Kap.	916
Kolben.	362
Natter-Milch.	445
Burz.	1023
Zünglein.	250. 251
Nessel.	1135. 1136
taube oder todte.	655. 657
Nestformiger Wasser-Mos.	143
Nießwurz.	401. 406

## O

Ochsen-Zunge, gemeine.	727
rothe.	726
Wald.	729
wilde.	741
Obermennie.	1075
Ohren-Löfflein-Kraut.	947
Schwamm.	48
Orant.	708

## P

Padden-Stuhl.	122
Pappeln.	1109. 1110. 1172
Bäume.	1174
Pantken-Beeren.	1086
Perlgruß.	



# Deutsches Register.

Peltſchen.	1124.	1133	Ringelblumen.	1198
Perlgrüß.		814	Rittersporn.	913. 914
Pestilenzwurz.	514.	515	Röbte, wilde.	589
Pfaffen - Blat.		450	Rößtern.	1153
Kraut.		659	Roggen.	328. 329
Pfannkuchen - Kraut.		510	Rohr.	335
Pfeffer - Kraut.		672	Gräß.	295. 337
ling.		54	Rohrköpfchen.	50
Schwamm.	84.	85	Rosen. Engelthier.	1054
Pfeil - Kraut.	269.	270	Feld.	1053
Pfennig - Kraut.		752	Zucker - rothe.	1055
Pfifferling.	91.	92	Roscastanien.	1177
Pflaum - Nägelein.		944	Rosmarin, wilber.	989. 990
Pflocken - Blum.	487.	496	Rosſchwanz.	265.
Primmen - Kraut.	1115.	1116	Rubr - Kraut, großes.	554
Pizer.		799	Ruprechts - Kraut.	992
Posist.	18.	19. 21		
Poggen - Aug.		20		
Gräß.		420		
Pollen, wilde.		667		
Porſch.	1013.	1014		

Q

<b>N</b> ecken, Graf.	325	Salbey.	1623
Nendel.	640	Samlod.	605
Neiß, Graf.	798	Sanickel.	601
Nvitschenbaum.	1106	Sandisfel.	449 = 452. 1021.

St

<b>N</b> aden.		949	<b>S</b> chaaß. Barb.	505.	506
Rapunzel.	1037.	1049	Saurampß.		1022
Rauden, spanischer.		857	Scheer.		498
Raute. Wiesen =	868.	869	Thou, kleines.		196
Rein. Blumen.		546	stinkendes.		194
Rarn.	508.	509	Schachtelhalm.		203
Reißler.		86	Scham. Kraut.		801
Reitig, runder.		850	Scharlach.		635
wilder.	832.	833	Schweiß. Kraut.		1187
Riech. Kraut.		464	Milde.		800
					<b>S</b> chelz

# Deutsches Register.

Schel-Kraut, kleines.	895. 896
Scheltwurz.	852
Schimmel-Haar =	1. 4. 6.
Schirling.	604
Wasser,	615. 621
Schlangen = Neuglein.	740
Mord.	445
Wurz.	1023
Schlehdorn.	1003
Schlüsselblumen.	746
Schneel.	294
Schnabel-Kraut.	976
Schneeballen.	586
Schuppwurz.	704. 826
Schwaden.	291
Schwalben-Kraut.	851. 992
Wurz.	796
Schwalben-Zagel.	781
Schwamm-Baum,	8
Staub =	11. 18
Schwarzwurz.	722
Schwertel = Riedt.	365
See-Eich mit Blasen.	149
Gras.	322
Rannen.	748. 749. 855. 856
Moss.	144
Seidelbast.	1016
Seiffen-Kraut.	945
Seil-Weide.	1166. 1168
Senf.	831. 837
Sesel.	607
Siegwurz.	432
Sommerwurz.	702
Sonchen-Kraut.	453. 454
Sonnenthau.	768. 769
Sophien-Kraut.	836
Spanisch Gras.	281
Spargen.	410
Spindelbaum.	1176
Spring-Kraut.	716
Stabwurz.	557
Stachel-Beeren.	981
Schwamm.	11. 18

Stech-Aepffel.	770
Dorn.	1031
Stein-Brech.	968. 969
rother.	1077
Farn.	257
Klee.	1148
Leber-Kraut.	179
Linden.	1154
Pülge.	89. 90
Saamen.	725
Vogel-Kraut.	962
Sendelwurz.	385
St. Stephans-Kraut.	527. 534
Stern-Kraut.	527. 534. 1196
Leber-Kraut.	593
Schneuk.	145
Stindende Hure.	801
Stockrosen.	1112. 1113
Stolzer Heinrich.	797
Storchens-Schnabel.	988. 993
Strauß-Gras.	284. 298
Streich-Kraut.	864
Stuppars.	541
Ensanaken-Kraut.	681. 2002
Süßling.	60
Spygmarthwurz.	1111



Zanne.	1192
Wedel.	197
Zarant.	755
Zartuffeln.	774
Zaubensuß.	998
Zausend-Gülden-Kraut.	756
Korn.	966
Schön.	530. 820. 845
Zeschel-Kraut.	818
Zetiebeeren.	1086
Zeusels-Abbiß.	568
Kirschen.	417
Zhier-Nägelein.	939
Zormentil.	1100
Zraut	

# Deutsches Register.

Traut Babbichen sieh mich an. 252  
 Triffel. 23. 24  
 Troblum. 910

## U B

**U**beram. 664  
 Verfluchte Jungfrau. 475  
 Vergiß mein nicht. 717  
 Viole, geel. 842  
     Hunds. 861. 862  
     Merz. 858  
     Wald. 888  
 Unser Frauen Mantel. 1074  
     Weg. Stroh. 594  
 Untermast. 23  
 Vogel. Kirschen. 1104  
     Meier. Kraut. 793  
     Nest. 602  
     Wicken. 1216

## W

**W**acholder. 1189. 1190  
 Wald. Farn. Männlein. 259  
     Fenchel. 884  
     Glöcklein. 700  
     Hirse, braune. 695  
     Küchern. 1125. 1128  
     Mäuß. Dehrlein. 707.  
         708  
     Meister. 593  
     Messel. 654. 660  
     Polley. 734  
     Rinde. 591  
     Sichel. 894  
     Stechel. Gras. 427  
     Viole, gelbe. 864  
     Vogel. Kraut. 904  
     Weyderich. 904

Wallstrob. 589. 597  
 Wallstrob. 721  
 Wasser. Maron. 381  
     Andorn. 632. 633  
     Angelica. 613  
     Binsen. 415. 416  
     Dost. 511. 512  
     Eppich. 367  
     Fenchel. 908  
     Garb. 268. 273. 712  
     Gras. 295  
     Grindmurt. 1018. 1019  
     Knoblauch. Kraut. 647  
     Linsen. 368  
     Mos. 17. 142  
     Nüße. 590  
     Perlen. 964  
     Polley. 752  
     Schlangen. Kraut. 381  
     Sichel. 918  
     Viole. 273  
     Vogel. Kraut. 928  
     Wegerich. 418. 419  
         615. 621  
         825. 811  
 Wedendunk. 1027. 1028  
 Wegerich. 475  
 Wegtritt. 1194  
 Wegwart. 1160. 1171  
 Wehe. Distel. 414. 415  
 Weiden. 323. 324  
 Weißmurt. 559  
 Weizen. 750. 751. 1042  
 Wermuth. 1062. 1065. 1069  
 Weyderich. 1206  
 Weydt. 1129. 1136. 1137  
 Wicken. 428  
 Wieden. Baum. 960  
 Wiedersioß. 241. 242  
 Wiedertodt. 1140. 1143  
 Wiesen. Klee. 624  
     Kümmel. 63. 64  
     Schwamm. 72. 75. 77  
 Winde. 775. 776. 1030  
 Winter:

# Deutsches Register.

Winter-Blumen.	544
Grün. 408. 795.	1108.
	1011
Kreß.	839
Lattich.	440
Mirbel-Dost.	649
Wolferley.	526
Wolfs-Bast.	1016
Beer.	428
Bohnen.	982
Milch.	1185
Burr.	914. 915
Wohlgemucht.	645. 646. 648
Wüterich.	604
Wul-Kraut.	763. 766. 748
Wund-Kraut. Heidenisch.	522.
	523

3

Zäunling.	591
Zauber-Butter.	147
Zaun-Glöcklein.	770
Zeiß-Kraut.	669
Ziegen-Bärtchen.	31
Zart.	54
Zauch.	436
Zülzken.	51
Zucker-Rosen.	1081
Zunder-Schwamm.	45
Zweyblatt.	347. 398
Zwickholz.	1070. 1071

Y

Y sop.

661. 662. 920









